

PLEDOARIE PENTRU VIAȚĂ LUNGĂ:



SANATATE PRIN SEMINȚE, LEGUME SI FRUCTE



OVIDIU BOJOR - DOCTOR ÎN FARMACIE, Membru al Academiei de Științe Medicale

CATRINEL PERIANU - MEDIC GENERALIST

Editia aIII-a

Motto:

"Și a zis Dumnezeu: «Iată vă dau vouă toate ierburile care au sămânță în ele, de pe toată fața pământului și toți pomii care au roade cu sămânță în ele. Acestea să fie hrana voastră.»"

(Facerea 1, 29)

Aranjată, corectată și repaginată pentru uz personal – Liviu Tudorache, 2011

CUPRINS

CUPRINS.....	2
CUVÂNT ÎNAINTE.....	25
PREFAȚĂ	27
CAP.1 COMPONENTELE DE BAZA ALE ALIMENTELOR	30
GLUCIDELE (ZAHARIDELE).....	31
PROTIDELE (PROTEINELE)	31
LIPIDELE (GRĂSIMILE)	34
VITAMINELE.....	35
ALTE SUBSTANȚE ACTIVE TERAPEUTIC.....	36
ENZIMELE	36
SĂRURILE MINERALE	37
CAP.2 SISTEME DE DIETĂ TRADIȚIONALE.....	38
DIETA ÎN CONCEPȚIA TRADIȚIONALĂ INDIANĂ.....	39
Dieta în hiperaciditate și ulcer gastric.....	42
Dieta în alcoolism	42
Dieta în alergii	43
Dieta în artrită	43
Dieta recomandată în hepatită	43
Dieta în cancer.....	43
DIETA ÎN CONCEPȚIA TRADIȚIONALĂ CHINEZĂ.....	44
Dieta în hipertensiune.....	48
Dieta în guturai și gripă	48
CAP.3 RECOMANDARI PENTRU OBTINEREA UNOR PREPARATE DIN FRUCTE, LEGUME ȘI SEMINTE	48
MACERATUL LA RECE.....	49
INFUZIA.....	49
DECOCTUL	49
SIROPUL	49
CIDRUL DIN FRUCTE.....	50
TINCTURA	50
APLICAȚII EXTERNE	50
PREPARAREA SUCURILOR.....	50
CONSERVAREA SUCURILOR	51
FRUCTELE ȘI LEGUMELE USCATE	52
ALTE METODE DE CONSERVARE.....	52
CÂTEVA PREPARATE RECI DIN FRUCTE ȘI LEGUME	52
OBSERVAȚII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE	54

CAP.4 PRINCIPALELE FRUCTE DIN ALIMENTATIE.....	55
GRUPA FRUCTELOR SĂMÂNŢOASE	55
MĂRUL.....	55
PRINCIPALII CONSTITUENŢI.....	56
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	56
Extern	57
Cosmetică	57
MOD DE ÎNTREBUINŢARE.....	57
Oţetul de mere şi miere	57
PĂRUL.....	58
PRINCIPALII CONSTITUENŢI.....	58
MOD DE ÎNTREBUINŢARE.....	58
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	58
GUTUIUL.....	59
PRINCIPALII CONSTITUENŢI.....	59
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	59
MOD DE ÎNTREBUINŢARE.....	60
MOŞMONUL	60
PRINCIPALII CONSTITUENŢI.....	60
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	60
MOD DE ÎNTREBUINŢARE.....	61
GRUPA FRUCTELOR SÂMBUROASE	61
PRUNUL	61
PRINCIPALII CONSTITUENŢI.....	61
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	62
MOD DE ÎNTREBUINŢARE.....	62
CIREŞUL, VIŞINUL.....	62
PRINCIPALII CONSTITUENŢI.....	63
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	63
MOD DE ÎNTREBUINŢARE	63
MIGDALUL	63
PRINCIPALII CONSTITUENŢI.....	64
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	65
Cosmetică	66
MOD DE ÎNTREBUINŢARE	66
CAISUL	66
PRINCIPALII CONSTITUENŢI.....	66
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	66
MOD DE ÎNTREBUINŢARE	67
PIERSICUL	67
PRINCIPALII CONSTITUENŢI.....	67
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	67

MOD DE ÎNTREBUINȚARE	67
GRUPA ARBUȘTILOR ȘI PLANTELOR IERBOASE FRUCTIFERE	68
COACĂZUL NEGRU.....	68
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	68
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	69
MOD DE ÎNTREBUINȚARE.....	69
AGRIȘUL ȘI COACĂZUL ROȘU	70
PRINCIPALII CONSTTUENȚI.....	70
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	70
MOD DE ÎNTREBUINȚARE.....	70
CĂTINA ALBĂ	71
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	71
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	71
MOD DE INTREBUINȚARE.....	72
MĂCEȘUL.....	72
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	72
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	73
MOD DE ÎNTREBUINȚARE.....	73
PORUMBARUL	74
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	74
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	74
MOO DE ÎNTREBUINȚARE.....	74
ZMEURUL.....	74
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	75
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	75
MOD DE ÎNTREBUINȚARE.....	75
MURUL	75
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	76
MOD DE ÎNTREBUINȚARE.....	76
FRAGUL ȘI CĂPȘUNUL	76
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	76
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	76
MOD DE ÎNTREBUINȚARE.....	77
AFINUL.....	77
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	78
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	78
MOD DE INTREBUINȚARE.....	79
SOCUL.....	79
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	79
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	79
MOD DE ÎNTREBUINȚARE.....	80

GRUPA FRUCTELOR USCATE.....	80
ALUNUL	80
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	80
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	80
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	81
CASTANUL DE CULTURĂ (comestibil).....	81
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	81
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	81
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	82
NUCUL	82
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	82
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	82
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	83
GRUPA FRUCTELOR EXOTICE.....	83
LĂMÂIUL.....	83
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	83
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	84
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	85
PORTOCALUL.....	86
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	86
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	86
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	87
MANDARINUL.....	87
GRAPE-FRUITUL.....	87
ALTE FRUCTE ȘI SEMINȚE EXOTICE.....	87
ANANASUL.....	87
BANANIERUL.....	89
MANGO	90
RODIA	91
SMOCHINUL	92
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	92
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	92
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	92
CURMALUL	93
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	93
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	93
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	93
MĂSLINUL.....	94
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	94
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	94
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	94
ARAHIDELE	95

PRINCIPALII CONSTITUENȚI	95
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	95
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	95
SUSANUL	95
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	95
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	96
VIȚA DE VIE	96
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	97
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	97
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	97
CAP.5 PRINCIPALELE LEGUME, SEMINȚE ȘI CEREALE DIN ALIMENTAȚIE	98
GRUPA LEGUMELOR DE LA CARE SE CONSUMĂ RĂDĂCINILE TUBERIZATE	98
HREANUL	99
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	99
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	100
MORCOVUL	101
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	101
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	101
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	102
NAPII	103
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	103
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	103
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	103
PĂTRUNJELUL	104
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	104
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	104
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	104
PĂSTÂRNACUL	104
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	105
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	105
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	105
ȚELINA	105
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	105
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	105
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	106
RIDICHILE	106
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	107
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	107
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	107
SFECLA ROȘIE	108
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	108

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	108
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	108
GRUPA CEPEI	108
CEAPA	109
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	109
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	109
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	110
USTUROIUL	110
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	112
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	112
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	113
PRAZUL	114
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	114
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	114
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	115
GRUPA LEGUMELOR DIN FAMILIA SOLANACEELOR	115
CARTOFUL	115
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	116
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	116
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	117
TOMATELE	117
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	117
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	117
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	118
ARDEIUL	118
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	118
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	119
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	119
PĂTLĂGELELE VINETE	119
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	120
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	120
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	120
GRUPA VERZEI	120
VARZA	120
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	120
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	121
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	122
CONOPIDA	122
GULIA	123
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	123
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	123

MOD DE ÎNTREBUINȚARE	123
GRUPA LEGUMELOR DE LA CARE SE CONSUMĂ FRUNZELE	123
URZICA.....	124
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	124
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	125
SPANACUL	125
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	126
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	126
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	126
LOBODA DE GRĂDINĂ	126
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	127
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	127
MACRIȘUL, ȘTEVIA.....	127
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	127
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	127
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	127
UNTIȘORUL.....	128
NĂȘTURELUL.....	128
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	128
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	128
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	128
PĂPĂDIA	129
ANDIVELE.....	130
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	130
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	130
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	130
SALATA VERDE.....	130
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	130
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	131
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	131
GRUPA LEGUMELOR DE LA CARE SE CONSUMĂ PĂSTĂILE, CAPSULELE ȘI SEMINȚELE	131
FASOLEA	131
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	132
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	132
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	132
SOIA	133
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	133
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE.....	134
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	134
MAZĂREA	134
PRINCIPALII CONSTITUENȚI.....	134

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	134
BOBUL.....	135
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	135
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	135
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	135
INUL	135
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	136
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	136
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	136
CONTRAINDIȚĂȚII ȘI EFECTE SECUNDARE.....	137
LINTEA	137
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	137
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	137
MOD DE ÎNTREBUINȚARE.....	137
BAMELE	138
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	138
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	138
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	138
NĂUTUL	138
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	138
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	138
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	138
GRÂUL.....	138
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	139
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	139
GRUPA LEGUMELOR DIN FAMILIA CUCURBITACEELOR	139
CASTRAVETELE	140
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	140
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	140
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	140
DOVLECELUL.....	141
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	141
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	142
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	142
DOVLEACUL TURCESC.....	142
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	142
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	142
PEPENELE VERDE	143
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	143
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	143
PEPENELE GALBEN.....	143

PRINCIPALII CONSTITUENȚI	143
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	144
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	144
GRUPA LEGUMELOR CU PROPRIETĂȚI CONDIMENTARE	144
MĂRARUL	144
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	144
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	145
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	145
PĂTRUNJELUL	145
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	145
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	145
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	146
LEUȘTEANUL	146
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	146
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	146
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	147
ASMĂȚUIUL	147
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	147
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	147
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	148
TARHONUL	148
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	148
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	148
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	148
ALTE LEGUME PERENE	149
REVENTUL	149
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	149
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	149
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	149
SPARANGHELUL	150
PRINCIPALII CONSTITUENȚI	150
RECOMANDĂRI TERAPEUTICE	150
MOD DE ÎNTREBUINȚARE	151
CAP.6 ROLUL ȘI UTILIZAREA PRODUSELOR VEGETALE PE GRUPE DE AFECȚIUNI	151
BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR	152
Sparanghelul	152
Salata	153
Leușteanul	153
Usturoiul	153
Ateromatoza și ateroscleroza	153
Afinele	153

Fragii	153
Lămâile	154
Prunele	154
Strugurii	154
Ceapa	154
Soia	154
Sparanghelul.....	154
Tomatele.....	154
Usturoiul.....	154
Grâul	154
Angina pectorală	154
Hreanul	155
Cătina.....	155
Hipertensiunea arterială	155
Hreanul	156
Leușteanul	156
Sfecla roșie	156
Cireșele și visinele.....	156
Merele	156
Strugurii	156
Lămâile	156
Fragii	156
Insuficiența cardiacă.....	156
Cătina.....	157
Lămâia	157
Cartoful.....	157
Fasolea verde.....	157
Hreanul	157
Morcovul	157
Spanacul	157
Sparanghelul.....	157
Usturoiul.....	157
Edemele de stază cardiacă	158
Cătina.....	158
Mărul	158
Pepenele verde.....	158
Pepenele galben	158
Cartoful.....	158
Ceapa.....	158
Gulia.....	158
Pătrunjelul	158
Sparanghelul.....	158
Țelina	158
Usturoiul.....	159
Varza	159
Afecțiunile vasculare: hemoragiile, varicele, flebita superficială, fragilitățile capilare, arteriale, hemoroizii	159

Afinele	159
Cătina	159
Gutuile	160
Lămăile	160
Portocalele	160
Nucile.....	160
Porumbele	160
Morcovul	160
Urzica.....	160
Usturoiul.....	160
Afinele	161
Castanele.....	161
Coacăzele negre	161
Măceșele	161
Cătina	161
Lămăile	161
Portocalele	162
Pătrunjelul.....	162
Tomatele	162
Usturoiul.....	162
Varza.....	162
Afinele	162
Gutuile.....	162
Socul	162
Asmățuiul	162
Cartofii.....	163
Dovleceii	163
Pătlăgelele vinete	163
Usturoiul.....	163
Varza.....	163
BOLILE APARATULUI DIGESTIV. SEGMENTUL BUCOFARINGIAN	163
ABCESUL DENTAR.....	163
Smochinele	163
Hreanul	163
Pătrunjelul	163
Ceapa.....	163
AFTELE	164
Lămâia	164
Ceapa.....	164
Usturoiul.....	164
AMIGDALITELE.....	164
Gutuile	164
Lămâia	164
GINGIVITELE	164
Lămâia	164
Portocaele	164

Măslinile	164
Smochinele	164
Hreanul	164
PARADONTOZA.....	165
Hreanul	165
Măslinile	165
STOMATITELE	165
Gutuile	165
Lămâia	165
Portocalele	165
Smochinele	165
Ceapa.....	165
BOLILE APARATULUI DIGESTIV. SEGMENTUL GASTROINTESTINAL.....	165
ANOREXIA.....	165
Ardeiul iute	165
Hreanul	165
Leușteanul	166
Pătrunjelul	166
Reventul.....	166
Ridichile	166
Tarhonul	166
Țelina	166
TONICE APERITIVE	166
VOMA	167
Gutuile	167
Pepenele galben	167
Mărarul.....	167
Varza.....	167
GASTRITELE HIPERACIDE ȘI ULCERUL.....	167
Migdalele dulci	167
Cartoful.....	168
Varza.....	168
SINDROAMELE DISPEPTICE.....	168
Ardeiul iute.....	168
Lămăile, portocalele	168
Strugurii	168
Hreanul	168
Leușteanul	168
Tarhonul	168
Tomatele.....	169
Usturoiul.....	169
Castanele	169
Coacăzele negre, Coacăzele roșii, Agrișele.....	169
Merele	169

Porumbele	169
Strugurii	169
Asmățuiul.....	169
Ceapa.....	169
Hreanul	169
Mărarul.....	169
Pătrunjelul	169
Reventul.....	169
Spanacul	170
Tarhonul	170
Usturoiul.....	170
Varza.....	170
METEORISMUL (BALONĂRILE)	170
Lămâile, portocalele	170
Ceapa	170
Leușteanul	170
Mărarul.....	170
Morcovul	170
Pătrunjelul	170
Usturoiul.....	170
DIAREEA.....	171
Afinele	171
Arahidele	171
Caisele	171
Castanele	171
Gutuile	171
Cătina.....	171
Merele	171
Moșmoanele.....	171
Porumbele	172
Ceapa.....	172
Guliile.....	172
Hreanul	172
Morcovul	172
Urzica.....	172
Usturoiul.....	172
Varza.....	172
ENTEROCOLITELE.....	172
Afinele	172
Castanele	173
Măceșele	173
Migdalele dulci	173
Porumbele	173
Napii	173
Usturoiul.....	173
COLICILE.....	173

Sparanghelul.....	173
Mărarul și Chimionul	173
Usturoiul.....	173
HELMINTIAZELE	174
Afinele	174
Alunele.....	174
Fragile, căpșunile.....	174
Lămâile	174
Măceșele	174
Măslinile	174
Piersicul	174
Dovleacul	174
Hreanul	174
Morcovul	175
Pătrunjelul	175
Prazul.....	175
Usturoiul.....	175
Varza.....	175
CONSTIPAȚIA	175
Caisele	175
Ciresele, vișinele.....	175
Coacăzele roșii, agrișele	175
Fragile, căpșunile.....	175
Merele	176
Măslinile	176
Migdalele.....	176
Perele.....	176
Pepenele verde, Pepenele galben	176
Piersicile.....	176
Portocalele	176
Prunele	176
Smochinul.....	176
Socul	176
Strugurii	176
Asmățuiul.....	177
Castravetele.....	177
Ceapa.....	177
Dovleacul	177
Grâul	177
Leușteanul	177
Mazărea.....	177
Măcrișul, Ștevia	177
Prazul.....	177
Reventul.....	177
Salata verde.....	177
Spanacul	177
Sparanghelul.....	178
Tomatele.....	178

Varza.....	178
Inul.....	178
GLANDELE DIGESTIVE ANEXE (FICATUL ȘI PANCREASUL)	178
HEPATITELE.....	178
Agrışele.....	178
Cireșele, vișinele.....	178
Fragile, căpșunile.....	178
Gutuile.....	179
Lămâile.....	179
Măceșele.....	179
Măslinile.....	179
Prunele.....	179
Strugurii.....	179
Fasolea verde.....	179
Morcovul.....	179
Pătlăgelele vinete.....	179
Reventul.....	179
Ridichile.....	179
Salata verde.....	180
CALCULOZA (LITIAZA) BILIARĂ.....	180
Cireșele.....	180
Măslinile.....	180
Cartoful.....	180
Ceapa.....	180
Năsturelul.....	180
Ridichea.....	180
COLICILE HEPATO-BILIARE.....	180
Lămâia.....	180
Măslinile.....	181
Pătrunjelul.....	181
DISCHINEZIA BILIARĂ.....	181
Măslinile.....	181
Portocalele.....	181
Porumbele.....	181
Strugurii.....	181
Asmățuiul.....	181
Pătrunjelul.....	181
Ridichile.....	182
Usturoiul.....	182
INSUFICIENȚA PANCREATICĂ.....	182
Fasolea verde.....	182
Pătlăgelele vinete.....	182
Spanacul.....	182
Tomatele.....	182
Urzicile.....	182

Salată de urzici tinere	182
Castravetele amar (Momordica charantia).....	182
BOLILE APARATULUI GENITAL	183
APARATUL GENITAL FEMININ. DISMENOREELE	183
Smochinul	183
Leușteanul	183
Mârarul.....	183
Păstârnacul.....	183
Pătrunjelul	183
Salata verde.....	183
APARATUL GENITAL FEMININ. LEUCOREEA	183
Nucul.....	183
Pătrunjelul	183
APARATUL GENITAL MASCULIN. PROSTATITELE	184
Părul.....	184
Ceapa.....	184
Dovleacul	184
Varza albă	184
BOLILE APARATULUI RESPIRATOR.....	184
TUSEA	184
Coacăzele negre	184
Gutuile	185
Strugurii	185
Cartofii.....	185
Ceapa.....	185
Napii	185
Prazul.....	185
Ridichile negre.....	185
Țelina	185
TUSEA SPASTICĂ ȘI CONVULSIVĂ.....	185
Migdalele.....	185
Piersicul	185
Salata verde.....	185
Usturoiul.....	186
LARINGITELE ȘI FARINGITELE.....	186
Coacăzele negre	186
Gutuile	186
Merele	186
Smochinele	186
Murele	186
Ardeiul iute.....	186
Bamele.....	186
Ceapa.....	186
Gulia.....	187

Prazul	187
Varza	187
BRONȘITELE	187
Curmalele	187
Gutuile	187
Merele	187
Smochinele	187
Socul	187
Asmățuiul.....	187
Bamele.....	187
Ceapa	188
Dovleacul	188
Gulia.....	188
Hreanul	188
Leușteanul	188
Morcovul	188
Napii	188
Năsturelul	188
Ridichile	188
Sparanghelul.....	188
Tarhonul	188
Usturoiul.....	189
Varza.....	189
PNEUMONIILE	189
Smochinele	189
Hreanul	189
Ridichile negre.....	189
ASTMUL BHONȘIC	189
Hreanul	189
Morcovul	189
Ridichea	190
Salata verde.....	190
Usturoiul.....	190
Varza.....	190
BOLILE ALE APARATULUI URINAR.....	190
LITIAZA ȘI COLICA RENALĂ	190
Părul.....	190
Năutul.....	190
Pătrunjelul	190
Varza	190
Agrișele.....	191
Alunele.....	191
Cireșele.....	191
Coacăzele negre, coacăzele roșii	191
Fragii, căpșunile.....	191
Lămâile, portocalele	191

Măceșele	191
Merele, perele	191
Migdalul	191
Moșmoanele	191
Pepenele verde	192
Asmățuiul	192
Cartofii	192
Castravetele	192
Ceapa	192
Fasolea verde	192
Hreanul	192
Morcovii	192
Napii	192
Năsturelul	192
Prazul	193
Ridichile negre	193
Salata verde	193
Sfecla roșie	193
Sparanghelul	193
Tomatele	193
Usturoiul	193
Varza	193
AFEȚIUNI INFLAMATORII ALE RINICHILOR ȘI CĂILOR URINARE	193
Agrışele	193
Părul	193
Dovleacul	194
CISTITELE	194
Părul	194
Napii	194
Sparanghelul	194
Afinele	194
Părul	194
ENUREZISUL	194
Nucul	194
SINDROMUL DE RETENȚIE AZOTATĂ (AZOTEMIE, UREMIE)	195
Bobul	195
Ceapa	195
Tomatele	195
DIURETICELE	195
Afinele	195
Agrışele	196
Coacăzele negre	196
Fragile, căpșunile	196
Măceșele	196
Merele	196

Moșmoanele.....	196
Perele.....	196
Pepenele verde, Pepenele galben.....	196
Piersicile.....	196
Prunele.....	196
Smochinele.....	196
Strugurii.....	196
Zmeura.....	197
Asmățuiul.....	197
Bobul.....	197
Cartoful.....	197
Castravetele.....	197
Ceapa.....	197
Dovleacul.....	197
Fasolea verde.....	197
Guliile.....	197
Hreanul.....	197
Leușteanul.....	197
Măcrișul, Ștevia.....	197
Morcovul.....	198
Năutul.....	198
Pătlăgelele vinete.....	198
Păstărnacul.....	198
Pătrunjelul.....	198
Prazul.....	198
Sfecla roșie.....	198
Sparanghelul.....	198
Tarhonul.....	198
Tomatele.....	198
Țelina.....	198
Urzicile.....	198
Usturoiul.....	199
Varza.....	199
AFECȚIUNI DERMATOLOGICE.....	199
ACNEEA.....	199
Fasolea verde.....	199
Napii.....	199
Prazul.....	199
Tomatele.....	199
Varza.....	199
CONTUZIILE.....	200
Cartofii.....	200
Pătrunjelul.....	200
Varza.....	200
Inul.....	200
ARSURILE.....	200
Măslinile.....	200

Migdalele dulci	200
Pepenele galben	200
Socul	201
Cartofii	201
Dovlecelul	201
Pătlăgelele vinete	201
Varza	201
DEGERĂTURILE	201
Castanele comestibile	201
Lămâile	201
Ceapa	202
Hreanul	202
Morcovii	202
Napii	202
Salata verde	202
Țelina	202
Varza	202
PANARIȚIUL	202
Cartofii	202
Fasolea	202
Lintea	202
Salata verde	202
Varza	202
RĂNILE (PLĂGILE).....	203
Lămâile	203
Usturoiul	203
Măslinile	203
Asmățuiul.....	203
Morcovii.....	203
Năsturelul	203
Urzica	203
Varza	203
Ceapa.....	203
Leușteanul	203
Morcovul	204
Prazul	204
Spanacul	204
Usturoiul	204
BOLI DE NUTRIȚIE ȘI METABOLISM	204
DIABETUL ZAHARAT	204
Afinul	205
Alunele.....	205
Fragile, căpșunile	205
Lămâile	205
Merele	205
Perele.....	205

Cartofii.....	205
Ceapa.....	205
Fasolea.....	205
Morcovii.....	206
Năsturelul.....	206
Soia.....	206
Țelina.....	206
Urzicile.....	206
Varza.....	206
GUTA.....	206
Agrişele.....	206
Cireşele, vişinele.....	206
Coacăzele negre, coacăzelele roşii.....	206
Fragile, căpşunile.....	207
Lămâile, portocalele.....	207
Merele, perele.....	207
Moşmoanele.....	207
Pepenele verde.....	207
Porumbele.....	207
Strugurii.....	207
Zmeura.....	207
Ceapa.....	207
Dovlecelul.....	207
Fasolea verde.....	207
Hreanul.....	207
Napii.....	207
Pătrunjelul.....	207
Țelina.....	208
Prazul.....	208
Salata verde.....	208
Soia.....	208
Urzica.....	208
Usturoiul.....	208
Varza.....	208
OBEZITATEA.....	208
Cireşele, vişinele.....	209
Merele.....	209
Socul.....	209
Strugurii.....	209
Cartofii.....	209
Tomatele.....	209
Țelina.....	209
AFECȚIUNILE REUMATISMALE.....	209
Agrişele.....	210
Cătina.....	210
Cireşele, vişinele.....	210
Coacăzul negru.....	210

Lămâile	210
Merele, perele	210
Strugurii	210
Ardeiul iute	210
Ceapa	210
Dovleceii	210
Fasolea verde	211
Hreanul	211
Năsturelul	211
Păstărnacul	211
Pătrunjelul	211
Salata verde	211
Soia	211
Tarhonul	211
Țelina	211
Urzicile	211
Usturoiul	211
Varza	211
RESTABILIREA UNOR FUNCȚII GLANDULARE	212
STIMULAREA SECREȚIEI GLANDULARE MAMARE (EFECT GALACTOGOG)	212
Socul	212
Asmățuiul	212
Lintea	212
Morcovul	212
Anasonul	212
STIMULAREA FUNCȚIEI GLANDELOR SUPRARENALE	212
Țelina	213
AFECȚIUNILE SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC ȘI CENTRAL	213
NEUROTROFICE	214
Arahidele	214
Caisele	214
Coacăzele negre	214
Migdalele	214
Prunele	214
Pătrunjelul	214
Soia	214
Grâul	214
SEDATIVE NERVOASE GENERALE	214
Cireșele	214
Mandarinele	214
Merele	214
Piersicul	214
Porumbarul	215
Prunele	215
Mărarul	215

Pătăgelele vinete	215
Salata verde	215
Varza	215
AFRODIZIACE	215
Usturoiul	215
Sparanghelul	215
Avocado și Bananele	216
Porumbul	216
ANAFRODIZIACE (CALMANTE ALE HIPEREXCITAȚIEI SEXUALE)	216
Salata verde	216
HIPNOTICE	216
Caisele	216
Merele	216
Ceapa	216
Mărarul	216
Salata verde	216
BOALA CANCEROASĂ	216
FRUCTELE, LEGUMELE ȘI SEMINȚELE UTILIZATE IN COSMETICĂ	223
COSMETICA FEȚEI	223
TENURILE GRASE	224
TENURILE USCATE	225
TENURILE RIDATE	225
CUPEROZA	225
PISTRUII	226
COSMETICA ȘI IGIENA OCULARĂ	226
COSMETICA MÂINILOR	227
COSMETICA PĂRULUI ȘI TONICELE CAPILARE	227
TONIFIEREA GENERALĂ A ȚESUTURILOR	228
TERAPIA CU ALGE	228
CAP.7 SAPTE ELEMENTE CARE SCURTEAZA VIATA	229
1. INVIDIA	229
2. LUPTA NELOIALĂ PENTRU EXISTENȚĂ	230
3. FUGA DUPĂ BANI ȘI ACUMULĂRI MATERIALE CU ORICE PREȚ ȘI CU ORICE MIJLOACE	230
4. SCHIMBAREA BRUSCĂ A MODULUI DE VIAȚĂ	230
5. SUPRAPOLUAREA	231
6. ÎNDEPĂRTAREA DIN CE ÎN CE MAI ACCENTUATĂ DE NATURĂ	231
7. SUB ASPECT MORAL, ETIC ȘI RELIGIOS, FACEM MARI GREȘELI	231
CAP.8 SAPTE ELEMENTE CARE PRELUNGESC VIAȚA	232
1. ALIMENTAȚIA	233
2. MENTALUL	233
3. TIMPUL DE ODIHNA	233

4. EVITAREA SEDENTARISMULUI	234
5. CULTIVAREA OPTIMISMULUI.....	234
6. PREVENIREA POLUARII	234
7. SUPREMA PORUNCĂ	234
CAP.9 TINERETE FĂRĂ BĂTRÂNETE ȘI VIATĂ FĂRĂ DE MOARTE.....	235
TIMPUL OPTIM DE ADMINISTRARE A PREPARATELOR FITOTERAPEUTICE	239

CUVÂNT ÎNAINTE

Oamenii au fost preocupați dintotdeauna de ideea unei vieți cât mai lungi.

Și nu a unei vieți lungi de orice fel, ci a unei vieți lungi normale: o viață lucidă și activă, care să-i dea individului posibilitatea de a lucra rodnic și de a trăi cu intensitate bucuriile care i-au fost date de Dumnezeu și la cele mai înaintate vârste.

Dacă n-au găsit secretul vieții veșnice, mai toate civilizațiile care s-au perindat pe pământ de-a lungul istoriei au găsit secretul vieții lungi și sănătoase.

Redescoperit pe cont propriu sau descoperit pe urmele predecesorilor, acest secret l-a condus pe om spre miezul Naturii.

În inima Naturii se află și substanțele care pot favoriza viața sau care, dimpotrivă, o pot distruge.

Între aceste substanțe pot distinge numai inițiații și numai ei cunosc modul de utilizare a celor dintâi.

Unul dintre inițiații în tehnicile de prelungire a vieții prin valorificarea darurilor naturii este Doctorul în Farmacie **Ovidiu Bojor**, membru al Academiei de Științe Medicale, patriarhul fitoterapiei române, om de știință în toată puterea cuvântului, recunoscut ca atare nu numai de mediile noastre științifice, ci și de mediile științifice internaționale.

Dedicând zeci de ani cercetării virtuților terapeutice ale plantelor din arealul românesc, ca și din alte importante zone ale lumii, și studiind totodată marile sisteme de medicină tradițională, Domnia Sa a avut îndreptățirea științifică și etică de a elabora o convingătoare **Pledoarie pentru viață lungă** (prima ediție a apărut în 1998, iar a doua în 2002).

Pledoaria sa se bazează pe o atentă și permanentă cântărire a rezultatelor pe care le-a înregistrat cea mai avansată cercetare în domeniu, astfel încât fiecare din propozițiile ei este pătrunsă de cea mai severă responsabilitate.

Tocmai de aceea, pentru actualizarea sistematicii și terminologiei proprii medicinei alopate, începând cu ediția a II-a, dl. **Ovidiu Bojor** și-a ales un coautor în tânăra medic **Catrinel Perianu**.

Pledoaria pentru viață lungă a d-lui **Ovidiu Bojor** (secondat, începând cu ediția a II-a, de **Catrinel Perianu**) începe cu începutul: cu povestea celui mai complex și celui mai minunat laborator care se află la baza vieții, anume celula vegetală.

Iar dacă celula vegetală se află la baza vieții, la baza alimentației omului se află rezultatul biosintezei vegetale, indiferent că este vorba de glicide, protide, grăsimi sau vitamine.

În consens cu marile sisteme de medicină tradițională, în **Pledoarie pentru viață lungă** se consideră că primele medicamente sunt (sau ar trebui să fie) alimentele.

Dintre marile reperi universale ne sunt prezentate, în cuprinzătoare capitole, dieta în concepția indiană și, respectiv, chineză, amândouă ilustrative sub aspectul păstrării sănătății și prelungirii vieții într-un stil cumpătat de alimentație.

Sistemul care ne este propus în **Pledoarie pentru viață lungă** are în vedere oferta de produse naturale a continentului european, dar, datorită fenomenului de globalizare, mai vechi decât s-ar crede, această ofertă are, de fapt, dimensiuni universale, pentru că, mai mult decât locuitorii altor continente, europenii n-au ezitat să profite de toate roadele pământului, indiferent de proveniența lor.

Fructificând o cunoaștere aprofundată a lumii vegetale, **Pledoarie pentru viață lungă** prezintă, cam în jumătate din „durata” ei, într-un mod clar și sintetic, principalele fructe, legume și semințe cu rol benefic în sănătate.

Se perindă prin fața privirilor curioase și fascinate ale cititorului zeci și zeci de plante, unele cultivate, altele crescând de bunăvoie în natură, toate orânduite riguros în grupe (câteva exemple: grupa fructelor sămânțoase, grupa fructelor sămburoase, grupa fructelor uscate, grupa fructelor exotice etc, grupa legumelor de la care se consumă rădăcinile tuberizate, grupa legumelor din familia solanaceelor, grupa legumelor din familia cucurbitaceelor, grupa legumelor cu proprietăți condimentare etc). Modul de prezentare e de factură monografică și este respectat cu deplină consecvență în toate cazurile: un „portret” concis al plantei, principalii constituenți, recomandări terapeutice (intern și/sau extern), mod de întrebuințare.

Acest tip de compoziție e caracteristic autorilor care își stăpânesc temeinic materia pe care o tratează. Nu pe toți cititorii îi interesează neapărat principalii constituenți, dar valențele terapeutice sunt o consecință a lor.

Așa se explică de ce principalii constituenți nu lipsesc din nici o micromonografie a fructelor, legumelor și semințelor.

Modul în care recomandarea terapeutică decurge din analizarea plantei dă încredere chiar și cititorului interesat exclusiv de ceea ce-i poate fi de folos pentru a-și trata o suferință sau pentru a-și păstra cât mai multă vreme atuurile tinereții.

Deși această tratare monografică a circa o sută de plante (fructe, semințe și legume) face cât o carte, autorul rețopește (secondat de coautorul său) întreaga materie într-o a doua mare parte, care echivalează, și aceasta, cu o carte: recomandări pentru utilizarea fructelor, legumelor și semințelor pe grupe de afecțiuni.

Toate aparatele corpului omenesc (digestiv, cardio-vascular, respirator, urinar, genital etc.) sunt prezente aici cu afecțiunile lor, după cum au parte de întinse capitole și bolile de nutriție, afecțiunile dermatologice, afecțiunile reumatismale, afecțiunile sistemului nervos.

Începând cu ediția a II-a, cartea se ocupă într-un capitol special de fructele, legumele și semintele recomandate în boala canceroasă și extinde capitolul despre fructele, legumele și semințele utilizate în cosmetică.

Și de această dată, modul de prezentare e clar și eficient: pentru ca posibilul utilizator al lucrării să știe de ce trebuie să se apere sau ce îl doare, este descrisă pe înțelesul tuturor afecțiunea, apoi sunt citate, una câte una, fructele, legumele și semințele care pot contribui la ameliorarea (ori la vindecarea) ei, în legătură cu fiecare precizându-se și modul de întrebuințare.

Cam orice boală de care poate suferi un om își găsește în această carte o recomandare terapeutică, uneori suficientă sieși, de foarte multe ori în complementaritate cu soluțiile medicinei alopate sau cu intervențiile chirurgicale.

Dar dacă recomandările terapeutice pe bază de fructe, legume și semințe nu pot vindeca întotdeauna singure (și e firesc să fie așa), consumul sistematic de fructe, legume și semințe, la care autorii fac trimitere în permanență, poate preîntâmpina degradarea sănătății, poate contribui la menținerea stării de vitalitate specifice tinereții și, ca o consecință logică, poate prelungi viața.

De fapt, în viziunea d-lui Ovidiu Bojor, prin consumul sistematic de fructe, legume și semințe, de produse vegetale în general, omul se reinserează în Natură, o regăsește și se regăsește în spiritul ei.

Nu întâmplător, încă de la prima ediție, Domnia Sa zăbovește, în capitole separate, asupra factorilor de altă natură decât dieta, favorabili sau, din contra, nefavorabili sănătății și longevității, asupra elementelor negative etice, morale și spirituale care scurtează viața, ca și asupra elementelor pozitive etice, morale și spirituale care o prelungesc.

Pledoarie pentru viață lungă este cea mai frumoasă și mai verosimilă versiune contemporană, scrisă cu instrumentele științei, a basmului Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.

Cine și-o face carte de căpătâi, citind-o cu atenție și urmându-i consecvent recomandările, de la dietă la atitudinea etică și spirituală, va avea șansa de a înțelege pe cont propriu ce înseamnă tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte.

Prof. dr. GHEORGHE MENCINICOPSKI

Membru al Acadcmiei de Științe Agricole și Silvice, Director al Institutului de Cercetări Alimentare

PREFAȚĂ

De ce „**Pledoarie pentru viață lungă**”?

Pentru că de mulți ani am înțeles cu toții că trăim un moment de cumpănă al omenirii, al pătrunderii tot mai violente a „mașinii” în viața noastră.

Pentru că, până la urmă, viitorul nostru are ca nume supraviețuirea omului ca specie biologică.

Dar această supraviețuire nu se poate face oricum, ci numai în condiții de sănătate fizică și psihică.

A trăi mult, trebuie să însemne și a trăi demn și frumos.

Cartea aceasta este scrisă sub semnul speranței. De aceea, vă propune soluții.

Vrem să vă explicăm în termeni cât mai accesibili cum puteți deveni mai sănătoși, mai frumoși, mai puternici, încredințându-vă că toate aceste atribute nu sunt doar niște simple cuvinte, părăsite de mult de sens.

Rămâne însă ca dvs. să chibzuiți și să decideți.

Vorbele facute celebre de către **Juvenal**: „**Mens sana in corpore sano**” au devenit, de foarte multă vreme, un truism, un adevăr evident.

Însă câți dintre noi vrem să înțelegem semnificația profundă a acestui dicton, anume că omul cu adevărat sănătos este cel care are și sufletul și corpul sănătos?

Nu e destul să îndeplinim niște simple condiții igienico-dietetice pentru a ne asigura bunăstarea fizică. Lucrul cel mai important îi constituie, fără îndoială, disciplina spirituală, care trebuie să ne călăuzească pașii în fiecare clipă.

Tot mai numeroase studii temeinice arată că cele mai multe boli sunt declanșate de către „etajele superioare” ale cortexului (creierului), însă aceleași „instanțe” pot transmite informații și ordine pozitive subconștientului.

Stă în puterea gândului nostru de a trimite aceste „comenzi” subconștientului, care le va retransmite conștientului și, implicit, întregului organism.

În mod curent, din păcate, nu știm să valorificăm decât 30% din capacitatea pe care o deține creierul nostru.

Toate cărțile mari ale omenirii, Biblia, Coranul, Vedele, conțin învățăminte și pilde în acest sens.

Pornind de la această sursă-tezaur, a fost elaborată o adevărată pleiadă de lucrări, menite să ne jaloneze modul de gândire.

Cărțile lui Joseph Murphy sunt un bun exemplu în această privință.

Vom pleda, așadar, pentru o mai bună „împăcare” (armonizare) a corpului cu sufletul nostru.

Ne vom da seama, astfel, că toate actele noastre trebuie spiritualizate.

Bunăoară, aparent banalul act al mâncării va trebui să fie reconsiderat, fie și numai sub aspectul ideii de viață.

Se cuvine, prin urmare, să avem o dietă echilibrată, bazată cu preponderență pe fructe, legume și semințe, adică pe alimente care conțin VIAȚĂ și nu MOARTE.

Vom alătura acestor produse vegetale produsele lactate, ouăle și mierea, în vederea asigurării necesarului binecunoscut de protide (proteine), de acizi grași esențiali, de glucide și mai ales de vitamine, enzime, săruri minerale, microelemente și așa mai departe.

Pentru a ne confirma recomandarea, este suficient să ne gândim numai la longevitatea populațiilor caucaziene în care se întâlnesc persoane ce depășesc frecvent 100 de ani și se hrănesc de preferință numai cu produsele pe care le-am pomenit mai înainte.

Marea problemă care se pune astăzi o constituie însă proveniența și calitatea produselor vegetale, a laptelui și a derivatelor sale, cu atât mai mult cu cât hormonii de creștere, fertilizanzii artificiali sau insecticidele au căpătat un rol din ce în ce mai mare în obținerea „recoltelor record” și nicidecum a recoltelor sănătoase.

Trăim într-o lume din ce în ce mai agresivă, în care, din nefericire, poluarea mediului se transmite până la bobul de grâu al pâinii noastre „cea de toate zilele”.

Nu vă repeziți la prima tarabă din piață unde vedeți morcovi enormi, cartofi „supradimensionați” sau fructe perfecte ca prezentare, fără nici o urmă de vierme în întreg lotul.

Toată această aparență „lucitoare” nu e decât semnul unor culturi chimizate și comerciale.

Odată procurate din sursă sigură produsele vegetale autentice, este necesar să cunoaștem și anumite procedee sau rețete de utilizare a acestora, pentru a le valorifica la maximum întregul potențial. În

paginile acestei cărți veți găsi și astfel de recomandări de preparare în cazul celor mai cunoscute legume, fructe și semințe.

Deși în alimentația noastră zilnică intră un mare număr din aceste produse, multe din ele își pierd, prin prelucrarea în „mica industrie casnică”, o bună parte din proprietățile terapeutice.

Din comoditate sau din necunoaștere, folosim din ce în ce mai puține crudități care, comparativ cu fructele și legumele prelucrate, au o valoare nutritivă și terapeutică mult mai mare.

O gamă întregă de vitamine, enzime, fitohormoni și alte substanțe active se inactivează prin fierbere. Tot prin fierberea legumelor direct în apă, o mare parte din sărurile minerale și microelementele utile organismului sunt extrase și îndepărtate.

De aceea, este preferabilă prepararea acestora prin procedeul fierberii în abur (prezentat în capitolul al IV-lea).

De multe ori, uităm sau neglijăm și întrebuițarea părții celulozice din legume sau fructe, pe care, de obicei, o îndepărtăm, fără a cunoaște faptul că și celuloza are valoare în menținerea sănătății.

Deși organismul uman nu poate metaboliza celuloza, ea are acțiune laxativă și constituie partea de fibre necesare bunei funcționări a organismului.

Prin această acțiune, celuloza este unul din factorii ce contribuie indirect la prevenirea cancerului de colon.

Dacă de la fructe și legume îndepărtăm coaja, din grâul măcinat aruncăm tărâța, uitând de faptul că exact sub coaja bobului de grâu sunt sintetizate prețioase vitamine, cum ar fi, de pildă, vitaminele din complexul B.

Multe dintre produsele vegetale au un conținut ridicat în substanțe active terapeutice, ceea ce le conferă și calitatea de a fi bază de materii prime în industria de medicamente.

Astfel, Usturoiul* se utilizează în compoziția unor medicaente hipotensive, iar fructele de Afin sunt valorificate prin producerea Difebiomului (indicat în fragilitățile capilare).

Unele umbelifere condimentare (grupă de legume cu proprietăți condimentare, din care fac parte, printre altele, Mărarul, Pătrunjelul și Leușteanu!) servesc la obținerea uleiurilor volatile, folosite în aromaterapie. Actualmente, se studiază posibilitatea utilizării tomatelor în vederea obținerii tomatidinei, precursor în semi-sinteza hormonilor steroizi.

Acestea sunt doar câteva exemplificări care — sperăm — vor atrage atenția cititorului asupra importanței pe care o reprezintă pentru sănătate produsele naturale de origine vegetală cât mai puțin prelucrate, cât mai aproape de structura lor primară.**

Cui se adresează această carte?

Oricărui om, cu cele mai diferite preocupări sau activități.

Omului sănătos, care dorește în continuare să fie sănătos, dar și omului bolnav care dorește să-și restabilească sănătatea fără nici un „risc terapeutic”.

Fără a avea pretenția de a recomanda vindecarea unor afecțiuni grave exclusiv prin valorificarea produselor vegetale, am voit totuși să semnalăm (sau să reamintim) cât de importante sunt aceste roade ale pământului.

Nădăjduim din toată inima ca și prin această apropiere de Natură să ne aflăm sau să ne păstrăm echilibrul, să ne regăsim, cu alte cuvinte, pe noi înșine.

AUTORII

* Conform ortografiei din monumentală lucrare Flora României (12 volume, Ed. Academiei) și din Dicționarul etno-botanic (Ed. Academiei) de Alexandru Borza, numele plantelor sunt considerate nume proprii și, ca atare, se scriu cu inițială majusculă.

** Atenție!

Nu trebuie totuși să credem că tot ceea ce este natural este și inofensiv.

De multe ori am atras atenția asupra consumului de Tătăneasă sau de Mărul lupului cu efecte nocive dovedite asupra organismului.

CAP.1 COMPONENTELE DE BAZA ALE ALIMENTELOR

Celulei vegetale înseși îi datorăm existența și supraviețuirea noastră pe această planetă.

Ne-am născut fitofagi fiindcă nu am fost înzestrați cu clorofilă („adevăratul Prometeu, care fură focul din ceruri” — K. A. Timirișev), cu anumiți pigmenți cu echipament enzimatic sau alte organite celulare capabile să transforme substanțele minerale, apa, aerul, razele solare în elemente vitale.

Fenomenele moleculare caracteristice primului semnal al vieții, prima biosinteză care a determinat mișcarea biologică, prima verigă în lanțul reacțiilor specifice vieții s-au născut în celula vegetală.

Mai întâi, am beneficiat, împreună cu ierbivorele, de rezultatul biosintezei vegetale.

Apoi, din comoditate, din curiozitate, din capriciu poate, am început să gustăm proteinele animale.

Mai mult decât atât, se pare că am fost chiar în exclusivitate carnivori, în anumite perioade ale existenței noastre.

Numai când aveam dureri de stomac, indigestii sau cine știe ce alte suferințe fizice, ne aduceam aminte de fructe, de rădăcini, de plante cu care ne alinam durerile, aiudoma animalelor care, și astăzi, știu să caute anumite ierburi atunci când nu se simt bine.

Dar alimentația noastră s-a schimbat radical în neolitic, când am început să ne stabilim pe un teritoriu, să ne durăm un lăcaș, să ocupăm un spațiu permanent al existenței noastre.

Atunci ne-am „transformat” din vânători nomazi în agricultori și crescători de animale.

Am devenit astfel omnivori, așa cum suntem și astăzi.

Hrana omului se diversifică, incluzând, pe lângă cereale, fructe sau legume, și produse lactate, ouă și carne.

Protidele (proteinele) de origine animală se consumau însă ocazional, în anumite perioade ale anului, la sărbători, festivaluri sau ceremonii.

De-a lungul istoriei sale, alimentația omenirii a fost foarte diferită, în funcție de mediul geografic, de obiceiuri sau credințe, de relațiile sociale și economice din cadrul comunităților.

Astăzi, la baza nutriției umane stă tot biosinteza celulei vegetale, care reușește să transforme substanțele anorganice în substanțe organice — glucide, protide sau lipide (grăsimi).

În stadiu de laborator sau chiar semi-industrial se încearcă obținerea proteinelor — aceste substanțe complexe indispensabile vieții — fie prin biosinteză, cu ajutorul culturilor de alge monocelulare, fie cu ajutorul chimiei macromoleculare, a polimerilor, care va permite sinteza aminoacizilor și deci și a proteinelor, a grăsimilor, din elementele de bază: hidrogen, oxigen, azot, carbon, sulf etc.

Deoarece procesul de adaptare a omenirii la noul tip de alimente și de alimentație va fi un proces îndelungat, vom rămâne deocamdată la stadiul actual de observații făcute în legătură cu alimentația naturală.

Înainte de a realiza o rapidă trecere în revistă a tuturor constituenților nutritivi, trebuie să facem câteva precizări de terminologie biochimică.

Componentele de bază ale alimentelor sunt nuinite substanțe nutritive sau factori nutritivi.

Alte substanțe în cantități mici, dar absolut necesare organismului, cum sunt vitaminele, microelementele, enzimele, au fost numite biocatalizatori.

Principalele grupe de constituenți nutriționali sunt, în ordinea cantitativă în care intră în alimentație:

GLUCIDELE (ZAHARIDELE)

Sunt substanțe chimice cu structură simplă, formată din carbon, hidrogen și oxigen.

Materiile din care organismul își fabrică singur sau din care preia glucidele necesare intră în proporție de 60-80% în alimentația zilnică.

Acestea sunt reprezentate de cartofi, banane verzi, porumb, lapte, legume și fructe.

Necesarul de glucide al organismului se stabilește în funcție de efortul fizic depus individual.

În stare aproape pură, glucidele sub formă de mono sau dizaharide se găsesc în miere (glucoză, fructoză, zaharoză).

Zaharoza este dizaharida cea mai răspândită în natură; ea se găsește ca atare în tulpina trestiei de zahăr, în rădăcina sfeclei de zahăr, în morcovi, în pepeni, în foile și cocenii de porumb, în nectarul florilor.

În secolul trecut s-a dezvoltat vertiginos industria zahărului rafinat, obținut fie din suc de trestie de zahăr (al cărui conținut este de circa 18%) sau în sfecla de zahăr (cu 8-10% zahăr), cu toate avantajele și mai ales dezavantajele sale asupra organismului.

Aceste glucide, obținute prin diferite procedee ale industriei alimentare (bomboane, înghețată, siropuri, gemuri, prăjituri), sunt incluse în grupa factorilor nefavorabili sănătății și longevității.

Este indicat ca toate aceste dulciuri să fie înlocuite cu fructe sau cu cel mai sănătos edulcorant, anume mierea de albine.

Alte glucide cu moleculă complexă, cum sunt celuloza și hemicelulozele, nu sunt prelucrate de organismul uman, dar au un rol important pentru buna funcționare a organismului, facilitând tranzitul intestinal prin stimularea peristaltismului.

O altă funcție biochimică notabilă a glucideilor constă în favorizarea metabolizării proteinelor și a lipidelor.

PROTIDELE (PROTEINELE)

Sunt substanțe cu structură chimică complexă, formate din aminoacizi.

În organismul uman se găsesc aproximativ 22 aminoacizi, dintre care 8-10 sunt considerați aminoacizi esențiali, care nu pot fi sintetizați de organismul nostru și trebuie obținuți din alimente. Rolul proteinelor în alimentație este deosebit, deoarece acestea intră în însăși structura celulei, contribuind la creșterea și refacerea acesteia.

Totodată, proteinele intră și în structura hormonilor, participă la procesul de imunitate microbiană și la sinteza unor enzime absolut necesare organismului.

Proteinele pot fi de origine animală sau vegetală.

Aici trebuie să atragem atenția asupra abuzului de proteine animale.

Statistic, s-a demonstrat că, față de secolul al XIX-lea, în secolul al XX-lea consumul de carne s-a dublat.

Sursa principală a acestor proteine animale este asigurată de carnea de mamifere, de păsări, pește și alte vietăți marine, carne care conține între 16-22% proteine.

Acestea deteriorează starea generală de sănătate (inclusiv din cauza toxinelor animalelor sacrificate, a numeroaselor microorganisme nocive dezvoltate în uima conservării sau a conservării deficitare a cămii), astfel încât este recomandabil să renunțăm, pe cât se poate, la aceste tipuri de alimente, oricât de gustoase ar fi.

A doua sursă de proteine animale o constituie laptele și produsele lactate.

Laptele este considerat aliment complet nu numai datorită conținutului în proteine, dar și pentru că este o sursă importantă de calciu, microelemente și vitamine.

A treia sursă de proteine sunt ouăle de găină, cel mai ușor digerabile și asimilabile (cele de rață, gâscă, curcan, bibilică pot fi infestate cu ușurință cu Salmonella sau protozoare).

Un singur ou poate asigura 2-4% din nevoile energetice zilnice, 10% din necesarul de aminoacizi, 25% din nevoile de fier, 15% din nevoile de zinc și 10% din necesarul de alte oligoelemente și de vitamine.

Valoarea cea mai mare energetică o au ouăle fierte moi, ochiurile, omleta, maionezele.

Cea mai mică valoare nutritivă o au ouăle fierte tari, care se elimină aproape ca atare, fiind recomandate de aceea în curele de slăbire fără să dăuneze ficatului.

Acizii grași polinesaturați, cu 16-22% atomi de carbon și 2-6 duble legături în structura lor chimică, separate de un singur grup — CH₂ — au primit denumirea de acizi grași esențiali (AGE).

Se numesc astfel, deoarece, după cum aminoacizii care nu pot fi sintetizați de către organism se numesc esențiali, tot așa în grăsimi există acizii grași esențiali, absolut necesari organismului sănătos, având și remarcabile efecte terapeutice.

Vegetalele sintetizează toți AGE în cantități foarte mari (în special semințele). Organismul uman și animalele nu pot sintetiza AGE, fiind tributare regnului vegetal care intră în alimentația lor normală.

Cei mai importanți AGE sunt acizii linoleic, linolenic și arahidonic sau acizii grași care derivă din aceștia în cursul proceselor metabolice.

Cantitatea necesară în AGE a fost apreciată între 6-15 g/zi, dar după cum vom vedea, unul dintre cei mai importanți AGE, acidul gama-linolenic, este suficient într-o doză mult mai mică, respectiv 1 g/zi, aproape cât necesarul zilnic de vitamine.

Acest acid gras esențial este absolut necesar în dietă, deficitul său în organism ducând la diferite tulburări patologice: eczeme, încetinirea cicatrizării și vindecării rănilor, iritabilitate, creșterea consumului de calorii ingerate ș.a.m.d. în organismul uman, dimerul AGL (acidul di-gamma linolenic) se metabolizează în favoarea compușilor din seria prostaglandinelor (PG). Prostaglandinele au atât proprietăți benefice, cât și nocive.

Prima serie (E) de PG (PGE) are, în general, efecte pozitive, derivând din AGL. PGE₁ activează formarea ciclului monofosfatic al adenozei (AMPc), inhibă agresiunile interne, are acțiune vasodilatatorie, inhibă reacțiile inflamatorii și activează formarea limfocitelor T.

Cea mai mare cantitate de AGL se găsește în laptele de mamă (spre deosebire de laptele provenind de la animale).

AGL se mai găsește în uleiul semințelor din unele plante, cum ar fi: Luminița (*Oenothera biennis*) din familia Onagraceae, Nonnea macrosperma și Borago officinalis (Limba mielului) din fam. Boraginaceae și Scrophularia marilandica din familia Scrophulariaceae.

În aceste specii, AGL se găsește în cantități cuprinse între 5-9% din uleiul total gras extras din semințe.

Dar cea mai bogată sursă în AGL (19% din greutatea semințelor) o constituie semințele de Coacăz negru (*Ribes nigrum*), care aparține familiei Laxifragoriceelor.

Cercetări recente susțin ca s-ar găsi și în uleiul extras din semințele strugurilor.

Având în vedere importanța AGL, cercetătorii japonezi au reușit să obțină acest important produs prin cultură fermentativă a unei ciuperci numite *Mortierella*, cu un randament de 50-90%.

Se preconizează că AGL are acțiune benefică în tratarea aterosclerozei, hipertensiunii arteriale.

S-a demonstrat chiar că o cantitate redusă de ulei extras din semințele de Luminiță acționează favorabil tocmai datorită prezenței AGL pentru vindecarea bolilor menționate mai sus și chiar a sindromului Raynaud (caracterizat printr-o contracție brutală a micilor artere de la nivelul degetelor de la mâini și de la picioare).

S-a mai constatat că diabetul este însoțit de diminuarea concentrației unei enzime din cauza deficienței în AGL a prostaglandinelor din seria 1, care au o activitate similară insulinei, amplificând în același timp efectele acesteia.

Creșterea nivelului de prostaglandine din seria E scade necesarul de insulină administrată zilnic diabeticilor.

Testările clinice prin folosirea uleiurilor bogate în AGL și a uleiurilor bogate în acizi grași esențiali sunt încurajatoare în tratamentul diabetului zaharat.

În altă ordine de idei, se știe că procesele inflamatorii sunt însoțite de un nivel ridicat de acid arahidonic liber și al metaboliților acestuia, care constau în prostaglandine (a II-a serie) și leucotriene.

Medicamentele antiinflamatorii obișnuite acționează prin interferență cu eliberarea acestor compuși.

Chiar și prima serie de prostaglandine poate avea acțiune antiinflamatoare, deoarece prin mărirea nivelului AMPc se inhibă eliminarea de amino-acizi din rezerve, ceea ce activează limfocitele T. Creșterea nivelului PGE prin consumarea de AGL în exces reduce procesele inflamatorii, fenomen atestat atât prin experiențe pe animale, cât și clinic.

Eczelele atipice par a fi asociate cu un nivel scăzut de acizi grași, esențiali în dietă.

Cercetările au demonstrat utilitatea uleiului din Luminiță, care a fost inclus ca medicament în Anglia.

Bazele teoretice ale utilității acestuia se referă la acțiunea PGE ca stimulent al limfocitelor T, celule care sunt deficitare în cazurile eczemelor atipice.

În scleroza multiplă, există o legătură între incidența bolii și a consumului ridicat de grăsimi saturate.

Unele experimentări au recomandat utilizarea unor uleiuri cu un nivel ridicat de AG nesaturați, de exemplu uleiul de Floarea-soareii, dar cu rezultate neconvingătoare.

Considerații recente asupra rolului PGE și a limfocitelor T au condus la ipoteza că uleiurile bogate în AGL sunt mai utile în tratamentul sclerozei multiple.

În tulburările ciclului menstrual și în unele afecțiuni ale sânelui, studiile epidemiologice stabilesc o legătură între consumul de grăsimi saturate și aceste tulburări.

Este posibil ca acestea să fie cauzate de inhibarea delta-G-desaturazei prin AG saturați, având ca urmare durerea, sensibilitatea și fragilitatea sânelor, nodulii care se dezvoltă în sindroamele premenstruale.

Uleiul de Luminiță bogat în AGL este în prezent recomandat și în sindromul premenstrual.

O altă aplicabilitate a AGL este în tratamentul alcoolismului cronic.

Alcoolul stimulează formarea de PGE din DAGL (dimerul acidului gamma linolenic), astfel încât epuizează rezervele acestuia.

Etapa următoare a consumării alcoolului are ca urmare reducerea considerabilă atât a PGE, cât și a rezervelor de AGL.

Mai mult, alcoolul blochează delta-6-desaturaza (enzimă), având ca urmare scăderea nivelului de prostaglandine din seria 1.

Utilizarea terapiei cu AGL contracarează efectele consumului excesiv de alcool prin insuficiența de PGE.

Protidele se găsesc nu numai în carne, ouă, lapte, ci și într-un mare număr de cereale, fructe și legume, care constituie o sursă de proteine, pentru care noi pledăm în ideea unei vieți mai bune, mai lungi și mai sănătoase.

Ele se găsesc în proporție de 10-20% în Grâul bogat în gluten, (Triticum durum, Triticale — Secară + Grâu — hibrid), în semințele de Floarea-soarelui, în nuci, în Hrișcă, Meî (15-20%), alune, arahide, migdale etc.

Cantitatea cea mai mare de protide se găsește în Soia.

Astfel, în 100 g făină de Soia integrală se găsesc 37 protide, 21 g grăsimi, 26 g glucide care, însumate, reprezintă sub raport energetic 469 kilocalorii.

Rația zilnică de protome pentru un adult este de 60-100 g, cantitate optimă.

Supra-alimentația și sub-alimentația sunt deopotrivă dăunătoare pentru organism.

LIPIDELE (GRĂSIMILE)

Toate grăsimile sunt gliceride ale acizilor grași saturați sau nesaturați.

Sursele principale de grăsimi se găsesc atât în produsele de origine animală, cât și în cele de origine vegetală, diferența dintre ele fiind de ordin calitativ.

Grăsimile vegetale, în care predomină acizii grași nesaturați, mult mai ușor asimilabili de organismul uman, sunt superioare grăsimilor animale în care acizii grași saturați sunt majoritari.

Excesul acestora din urmă poate duce la ateroscleroză, hipertensiune arterială, infarct miocardic etc, adică, până la urrnă, la scurtarea vieții.

Utilizarea celor două tipuri de grăsimi animale și vegetale diferă foarte mult în funcție de zona geografică în care trăiește omul.

În regiunile ecuatoriale, tropicale și mediteraneene se folosesc în exclusivitate grăsimile vegetale (uleiurile), în zona temperată, ambele feluri de grăsimi, iar în regiunile arctice sunt utilizate în exclusivitate grăsimile de origine animală.

Pentru zona noastră geografică, se recomandă consumul echilibrat atât de grăsimi vegetale, cât și animale: ulei de Soia sau de Floarea-soarelui, unt, margarină, slănină, untură sau semințe oleaginoase, brânzeturi, smântână, nuci, alune etc.

În anotimpul cald, se preferă grăsimile vegetale, iar iarna, cele animale.

Prin metabolizarea unui gram de grăsime rezultă 8-10 kilocalorii.

Un adult, în zona temperată, are nevoie de 50-100 g lipide pe zi.

Pe lângă principalul rol energetic, grăsimile alimentare solubilizează și facilitează absorbția vitaminelor hiposolubile și stimulează contracția căilor biliare.

Revenind la acizii grași saturați și nesaturați, menționăm că grăsimile lichide (uleiurile) conțin cantități foarte mici de acizi grași saturați.

Aceste grăsimi lichide sunt mult mai ușor descompuse prin hidroliză cu ajutorul sucurilor digestive.

În schimb, grăsimile solide (untura, untul, margarina) sunt mult mai greu de descompus și de asimilat prin hidroliză.

Pentru zonele ecuatoriale, tropicale și temperate, se recomandă uleiurile vegetale cât mai puțin rafinate, mai ales obținute prin presarea la rece.

Prin rafinare (la fel ca și în cazul zahărului), uleiurile vegetale își pierd proprietățile specifice unui produs natural.

În urma consumului de uleiuri rafinate și ultrarafinate apar sau se accentuează numeroase afecțiuni gastrice, intestinale, hepato-biliare, circulatorii și dermatologice.

De aceea, pledăm pentru uleiurile grase nepurificate chimic, care au avantajul că își conservă valoarea calorică și, în plus, sunt surse de provitamine A, D, de vitamina E și F, lecitină și microelemente, care sunt distruse sau înlăturate prin procedeele industriale de purificare.

Cum spuneam, uleiurile obținute din semințele plantelor sunt amestecuri de trigliceride, compuși conținând esteri gliceridici cu lanț lung de acizi alifatici.

Toți acești acizi sunt cunoscuți în mod curent sub denumirea de acizi grași, diferind în funcție de lungimea lanțului, de prezența și poziția dublelor legături din formula chimică.

De reținut că, în regnul vegetal, aproape toți compușii de acest tip conțin în majoritate acizi grași nesaturați.

VITAMINELE

Deși în cantități mici, ele au un rol important în alimentație atât pentru creștere și dezvoltare, cât și pentru menținerea stării de sănătate a organismului.

Lipsa lor provoacă tulburări metabolice grave, ducând la apariția unor boli carentiale denumite hipovitaminoze.

Majoritatea vitaminelor sunt sintetizate de plante și numai în mică măsură de organismul animal.

Din punct de vedere chimic, ele sunt molecule cu structuri foarte heterogene.

După solubilitatea lor în grăsimi sau în apă, vitaminele au fost clasificate în liposolubile (vitaminele A1, A2, D, D2... D7, E, K și F) și hidrosolubile (complexul de vitamine B, PP, C, P, vitamina V sau factorul anti-ulceros).

Dacă vitaminele hidrosolubile se găsesc aproape în exclusivitate în regnul vegetal, o bună parte dintre vitaminele liposolubile pot fi întâlnite tot în legume, fructe și semințe, dar ca provitamine sub formă de carotenoizi (vitamina A) sau sub formă de steroli (vitamina D).

Vitaminele E și K se găsesc în exclusivitate în plante sau în unele microorganisme.

În ceea ce privește funcția vitaminelor în organism, ele au acțiuni de coenzime sau de activatori enzimatici, fiind numite și biocatalizatori.

Acest rol se manifestă la nivel celular, unde se petrec fenomene de oxido-reducere absolut necesare proceselor metabolice ale glucidelor, proteinelor și grăsimilor.

Denumirea de vitamină s-a păstrat de la cel ce a evidențiat pentru prima dată o vitamină (B1) — C. Funk, în 1911, care a denumit-o „amină vitală” datorită azotului aminic pe care-1 conținea și care era considerat absolut indispensabil vieții.

În prezent, se cunosc multe vitamine care nu conțin în molecula lor azot aminic, dar denumirea inițială s-a păstrat.

ALTE SUBSTANȚE ACTIVE TERAPEUTIC

În 1936, Albert Szent-Gyorgyi a pus în evidență pentru prima dată proprietățile de vitamina P ale flavonoidelor (substanțe fenolice naturale de tip pigmenti sau copigmenți) extrase din sucul de lămâie. După această descoperire a clasei flavonoidale, acești pigmenți vegetali și-au dovedit importanța pentru biochimie, fiziologie și farmacodinamie.

Quercetina, rutina și hesperdina sunt tot glicozide flavonoidice, considerate a fi substanțe active terapeutice.

O altă grupă de pigmenți vegetali importanți pentru organism sunt carotenoidele, care se găsesc în numeroase fructe, legume, semințe, în frunze, tulpini, în polen.

Carotenoidele sunt importante pentru organism deoarece joacă rolul de provitamine A.

Tot pentru rolul însemnat pe care-l joacă pentru organism în reacțiile oxidoreductoare trebuie menționați pigmenții chinonici, mult răspândiți în regnul vegetal (ex.: naftochinonele, antracenozidele, naftodiantronele). Unii dintre pigmenții chinonici au și acțiune antibacteriană.

Taninurile, o altă grupă de flavonoide, considerate substanțe active terapeutice, sunt foarte răspândite în fructe și legume.

Au proprietatea de a precipita protidele, inclusiv bacteriile patogene din tractul gastro-intestinal, iar prin aceasta au rol antidiareic.

Fitohormonii (hormonii specifici plantelor) se găsesc în numeroase produse vegetale, fiind factori stimulatori sau reglatori ai creșterii.

Multe legume, fructe și semințe conțin uleiuri volatile care, pe lângă gustul și aroma pe care o imprimă produselor naturale vegetale, stimulând prin aceasta secrețiile gastro-intestinale, au și remarcabile proprietăți antibacteriene.

Pornind de la această acțiune, dar și de la altele, la fel de importante, în ultimele decenii s-a dezvoltat o nouă ramură a fitoterapiei: aromaterapia. O altă grupă de substanțe cu acțiune terapeutică sunt mucilagiile vegetale, glucide macromoleculare grupate în clasa poliozelor (polizaharidelor), în care intră și pectinele, prezente în unele fructe și legume.

ENZIMELE

Din punct de vedere structural, enzimele sunt macromolecule de natură proteică. Atât biosinteza cât și degradarea substanțelor din organismul uman ar fi imposibilă fără activitatea enzimatică. Toate semințele în stare germinativă conțin enzime, dar acestea se găsesc și în plantule, în frunze tinere, în fructe și diferite legume.

Întrucât în ultimele trei decenii s-a descoperit un număr foarte mare de enzime, s-a simțit nevoia clasificării lor pe baza acțiunii specifice asupra substratului pe care acționează.

Astfel, ele au fost numite oxidoreductaze, transferaze, hidrolaze, izomeraze etc. Apoi, datorită faptului că unele enzime acționează asupra mai multor substanțe, s-a adoptat un sistem zecimal de clasificare codificat pentru fiecare clasă mare de enzime.

Pentru cele mai multe dintre enzime, temperatura optimă de activitate este cuprinsă între 20-40°, iar majoritatea enzimelor se inactivează între 60-80°C. În stare deshidratată, enzimele rezistă la temperaturi apropiate de 100°C.

SĂRURILE MINERALE

În organism, alături de constituenții organici, elementele minerale îndeplinesc funcții primordiale. Apa este principala componentă a tuturor structurilor biologice, îndeplinind numeroase și variate roluri, datorate proprietăților ei specifice.

La om, cea mai mare parte a apei ingerate provine din lichide și apoi din cea aflată în alimentele solide. Pe lângă acest aport, o cantitate mult mai mică, dar care se formează zilnic, este cea rezultată din metabolizarea celor trei mari grupe de componente nutriționale.

1 g polizaharidă (glucid) generează 0,6 g apă, 1 g proteină 0,41 g apă și 1 g lipid furnizează 1,07 g apă metabolică.

Conform colectivului E. Cristea Popa, A. Popescu, E. Truția, V. Dinu, se consideră că un adult sănătos, care desfășoară o activitate moderată în clima temperată, are nevoie de 1500-2000 ml apă/zi. Pierderile de apă au loc în mod normal prin plămâni, piele, urină și tract gastro-intestinal.

Nevoile de apă cresc cu 500 ml/zi în caz de transpirație datorită climei calde sau activității intense și cu 500-1500 ml/zi în caz de febră, vomismente, diaree.

Aportul de apă trebuie respectat și împlinit cu strictețe.

În caz contrar, se produc modificări ale echilibrului hidric, iar variația lui cu numai 1-2% conduce, în mod inevitabil, la boli grave sau chiar la moarte.

Atunci când aportul de apă depășește capacitatea de excreție renală, în organism se creează condiții propice pentru acumularea apei în exces.

Cele mai importante săruri minerale sunt calciul, potasiul, sodiul, fosforul, magneziul (în cantități relativ mai mari) și unele microelemente sau oligoelemente (cum ar fi cobaltul, iodul, fluorul, cuprul, sulful, magneziul etc).

Sărurile minerale fac parte integrantă din conținutul citoplasmatic, intrând în compoziția unor enzime, vitamine sau hormoni.

În cazul magneziului, acesta intră în constituția de bază a clorofilei, fără de care biosinteza a numeroase substanțe active din fructe și legume ar fi imposibilă.

În toate produsele vegetale există săruri minerale, în cantități mici sau foarte mici.

Alături de calciu, fosfor, potasiu și magneziu, în fructe și legume se găsesc cantități apreciabile de clor și sodiu, care, sub formă de clorură de sodiu, asigură de multe ori organismului necesarul din acest tip de elemente absolut necesar vieții.

Cu cât sarea de bucătărie este mai pură, deci cu cât este mai concentrată în clorură de sodiu, cu atât este mai dăunătoare organismului uman.

Sarea pură, pentru a-și reconstitui formula originală, își întregeste elementele structurii de bază cu ajutorul altor săruri din organism.

De aceea, recomandăm în alimentație sarea gemă, sarea brută de mină sau așa-zisa sare grunjoasă sau sarea rezultată din desalinizarea apei de mare, care cuprind, pe lângă clorura de sodiu, și magneziu, fosfor, litiu, mangan, fier, iod, elemente absolut necesare organismului.

Considerăm necesar să atragem atenția consumatorilor că depășirea unei doze zilnice relativ mici de sare, respectiv de 5 g, poate produce efecte nedorite asupra sănătății: afecțiuni gastro-intestinale, gingivite, migrene, accentuarea inflamațiilor hemoroidale, hipertensiune arterială, creând în același timp un teren favorabil pentru tuberculoză și cancer.

Sunt boli în care sodiul, rezultat în urma scindării clorurii de sodiu, este reținut de organism care, la rândul său, reține o cantitate mai mare de apă decât cea necesară, ducând la apariția edemelor. În acest caz, se va elimina sarea de bucătărie din alimentație, se vor evita produsele vegetale bogate în sodiu și se vor folosi fructe și legume bogate în potasiu.

* * *

Ca o concluzie a acestui capitol, putem afirma că alimentul optim este acela în care proteinele, lipidele și glucidele sunt naturale și perfect echilibrate între ele.

Cu alte cuvinte, o dietă echilibrată trebuie să conțină, în proporții suficiente, elemente plastice pentru a reface țesuturile, elemente energetice, vitamine, substanțe minerale și enzime.

În orice caz, alimentația nu trebuie să fie uniformă, ci cât mai variată în fiecare zi.

Alimentele naturale îi redau omului liniștea și echilibrul psihic, în timp ce alimentele industrializate, prefabricate sau fabricate prin diferite procedee, cu toată senzația de sațietate, imprimă omului o stare de agitație, de neliniște.

Interesele comerciale susțin alimentele cu energie calorică mare, cum sunt zahărul, făina albă și pastele făinoase fabricate din făină bogată în amidon, uleiurile rafinate, margarina, sarea „extra-fină”, afumăturile, conservele etc, toate acestea nefiind decât „alimente moarte”, care trebuie cu necesitate completate, dacă nu chiar înlocuite, cu „alimente vii”, respectiv cu fructe proaspete, cu legume și semințe.

Susținem, de aceea, o alimentație zilnică bogată în aceste componente, alături de produse lactate și ouă.

CAP.2 SISTEME DE DIETĂ TRADIȚIONALE

O dietă* echilibrată este, desigur, conceptul de bază în cele mai multe, dacă nu în toate teoriile și sistemele de nutriție și sănătate. Practicile și conceptele medicale ale majorității popoarelor lumii continuă, de obicei, vechi tradiții. Ceea ce unifică însă toate aceste sisteme — de foarte multe ori extrem de diferite unul față de celălalt — sunt teoriile umorale, pentru prima dată apărute în texte medicale cu mii de ani în urmă. Cele mai ilustrative în acest sens sunt principiile tradiționale indiene, respectiv chineze. Din experiența personală a unuia dintre autorii acestei cărți, care a lucrat timp de peste 10 ani în diferite țări din trei continente, alimentația cea mai potrivită este cea a localnicilor din fiecare zonă geografică. De fiecare dată când a mâncat ceea ce mănâncă zilnic aceste popoare, bineînțeles cu puțin discernământ, s-a simțit foarte bine. În schimb, când a consumat peste hotare alimente specifice zonei în care s-a născut, majoritatea conservate, starea sănătății sale a fost de multe ori precară.

* Cuvântul dietă derivă din grecescul „diaita”, înțelegând prin aceasta o viață cumpătată printr-o alimentație echilibrată.

DIETA ÎN CONCEPȚIA TRADIȚIONALĂ INDIANĂ

Aflată neîndoiește în „descendența” directă a filosofiei hindu, medicina tradițională indiană devine cunoscută sub numele de „ayurveda”, adică „știința de a trăi cât mai mult”.

Termenul utilizat este semnificativ și analizat după cuvintele ce îl compun, de vreme ce „ayur” reunește sensul de „sănătate” cu cel de „longevitate”, iar „veda” este un termen cu conotații religioase, utilizat pentru cele mai importante texte ale hinduismului.

Prin urmare, este evidentă punerea în corelație directă a sănătății cu o datorie sacră, de primă importanță.

Medicina indiană era preocupată de maniera în care omul își trăia propria viață, cu scopul declarat de a o prelungi, de a-și păstra sănătatea și vitalitatea cât mai mult timp posibil.

Conceptul medical ca mijloc de prevenire, mai mult decât de vindecare, conduce în mod direct la accentuarea rolului dietei în menținerea sănătății.

Cele mai multe dintre teoriile vedice afirmă că nu există dietă perfectă pentru toți oamenii, fiind necesar ca alimentația să fie individualizată, în funcție de necesitățile și particularitățile fiecăruia.

Dezvoltând această idee, teoria ayurvedică consideră esențiali factori ca:

- orarul meselor;
- proporțiile dintre factorii nutritivi;
- schimbările climatice din anul indian;
- alimente complementare și antagoniste/contradictorii;
- specificul individual;
- necesitățile alimentare raportate la efortul depus.

Fundamentală rămâne însă combinarea adecvată a gusturilor, în număr de șase în concepția indiană:

- dulce,
- acru,
- sărat,
- amar,
- picant (iute)
- astringent

Fiind compuse din diferite combinații ale acestor gusturi, alimentele au, ca atare, proprietăți și efecte diferite.

Ca în toate marile sisteme medicale, la baza medicinei indiene se află o teorie umorală, care pleacă de la premisa că organismul uman este caracterizat prin cinci elemente fundamentale:

- **APĂ**
- **PĂMÂNT**
- **FOC**
- **VÂNT**
- **CER**

- APA include sângele, limfa, țesutul adipos, serozitățile, țesutul conjunctiv (mucoasele), toate secrețiile, bila și urina.
- PĂMÂNTUL este reprezentat de oase, dinți, unghii și păr (fanere), mușchi, tegumente, tendoane, nervi, materii fecale.

- FOCUL este căldura corporală.
- VÂNTUL este simbolizat de respirație (care este, la rândul ei, diferențiată în 5 clase).
- CERUL este simbolizat prin dimensiunile corporale.

Pentru a atinge echilibrul necesar menținerii sănătății și nutriției optime, aceste elemente trebuie bine „cumpănite” prin consumul de alimente adecvate.

Se consideră că **ALIMENTELE DULCI** mențin apa în organism, iar alimentele acre cuprind elementele foc și pământ, alimentele sărate rețin apa și focul, în timp ce alimentele picante înglobează vântul și cerul, alimentele astringente conțin vântul și pământul.

E interesant de observat că noțiunea de „gust dulce” are, în concepția indiană, un sens diferit — și cu mult mai profund decât cel din gândirea europeană.

Astfel, „ayurveda” stabilește că dulci sunt nu numai zahărul, mierea și fructoza din fructe, ci și glicogenul din carne, precum și glucidele din Fasole, Grâu, lapte și derivatele sale.

Alături de acestea, Orezul, Porumbul, Meiul, Ovăzul, Cartoful, ouăle sunt și ele considerate alimente dulci.

Ele joacă un rol major în menținerea componentelor sângelui, a sistemului muscular și a țesutului adipos, a spermei și a apei vitale (adică esența finală a procesului metabolic).

Tot alimentele dulci sunt cele care mențin integritatea funcției sistemului nervos și a aparatului circulator; de asemenea, ele asigură procesele trofice necesare tegumentelor, favorizând vindecarea ranilor și a altor leziuni ale țesuturilor.

Se mai susține că ar stimula creșterea în greutate, ar menține agilitatea și forța fizică, prelungind șansa de supraviețuire.

Se recomandă ca alimentele dulci să reprezinte 90% din volumul meselor zilnice.

ALIMENTELE CU GUST ACRU măresc apetitul, ajutând organismul în digestia alimentelor și reglând peristaltismul intestinal.

Ele sunt importante pentru stimularea proceselor metabolice și în special a activității cardiace.

Ajută la creșterea greutateii corporale și a forței fizice.

Sunt considerate alimente de un acru pur lămâile, lămâile dulci și tomatele.

Dulci-acrișoare sunt portocalele, ananasul, perele, prunele și piersicile.

Alimentele acre, sub orice formă, ar trebui să reprezinte 3,5% din dieta zilnică.

Gustul sărat al alimentelor provine din SARE.

Se cuvine aici să facem o remarcă: există diferite tipuri de sare: sarea pură (NaO); sarea gemă (de mină); sarea de argilă; sarea extrasă din fructe.

Cele mai recomandabile sunt sarea gemă (de mină) și sarea marină.

Sarea în organism este necesară deoarece mărește apetitul și favorizează digestia, fiind garantul unei bune funcționări a sistemului nervos.

Tot sarea asigură o bună circulație sangvină, stimulând astfel troficitatea tegumentară și înlăturând trombozele.

Atenție!

Conform nutriționiștilor din Extremul Orient, sarea nu trebuie să depășească o pătrime din 1% al cantității fiecărei mese.

CONDIMENTELE conferă gustul picant, care are tot un rol stimulator în creșterea apetitului.

De asemenea, alimentele iuți stopează creșterea anormală, transpirația excesivă, măbind capacitatea de eliminare a toxinelor.

Totodată, favorizează metabolismul grăsimilor și inhibă reacțiile alergice.

În grupa condimentelor sunt incluse: Ardeiul iute roșu, Piperul negru, Coriandrul, Usturoiul și Ghimbirul (Gingiber sau Ghimber, „Zingiber orientale”, foarte răspândit în Orient).

ALIMENTELE AMARE stimulează și ele pofta de mâncare, prin creșterea secreției glandelor salivare și se pare că au un rol favorizant și asupra secreției glandelor endocrine (cu secreție internă). Reglează temperatura corpului și mențin plasticitatea tegumentară. Sunt ingrediente importante ale dietei pentru accelerarea metabolismului grăsimilor și epurarea („purificarea”) sângelui. Active asupra paraziților intestinali, sunt indicate în combaterea îmbolnăvirilor parazitare.

În această grupă se pot include atât condimentele amare, cum sunt Tumericul, Schinduful, semințele de Chimion amar, Nucșoara, precum și alimente amare propriu-zise, ca Sparangheul, castraveții amari, Pătrunjelul, Menta.

Ponderea optimă a acestor produse în alimentație ar trebui să fie în jur de 1% din dieta zilnică.

ALIMENTELE ASTRINGENTE au un rol important în refacerea țesuturilor și în troficitatea capilarelor; ele au rol stimulator asupra formării hematiilor și a secreției biliare.

Gustul astringent este de regulă asociat cu alte gusturi: astringent-dulce, astringent-acru, astringent-amar etc.

De pildă, anumite soiuri și varietăți de Fasole, Linte, portocalele, Mazărea tânără, Soia, bananele sunt combinații de dulce-astringent, iar majoritatea fructelor necoapte sunt acre-astringente. Concepția ayurvedică recomandă ca alimentele astringente să reprezinte aproximativ 5% din dieta zilnică.

Din toate aceste exemplificări rezultă că o dietă echilibrată poate fi stabilită procentual după cele șase gusturi de bază.

Se asigură astfel și menținerea echilibrului natural al celor cinci elemente constitutive de bază ale corpului uman (apa, pământul, focul, vântul și cerul) și, ca atare, sunt îndeplinite condițiile de menținere a stării de sănătate și de prelungire a vieții.

În schimb, o dietă neechilibrată și în special abuzurile alimentare sunt factori cauzatori principali ai multor afecțiuni și chiar ai reducerii duratei de viață.

Excesul de alimente dulci conduce la obezitate, la pierderea poftei de mâncare, la dezvoltarea multor boli metabolice (dintre care cea mai reductabilă este diabetul) și endocrine. Crește susceptibilitatea la unele boli infecțioase (guturai, gripă) sau la anumite afecțiuni ale aparatului urinar.

Pe de altă parte, o alimentație săracă în glucide duce la pierderea greutateii corporale și la instalarea unei astenii permanente.

După cum am arătat la început, există o gamă largă de alimente dulci.

Ele trebuie însă proporționate în dietă, combinate cu celelalte alimente.

Exemple de combinații optime sunt: cereale — carne, cereale — produse lactate, lactate — vegetale.

Excesul de sare în alimentație provoacă tulburări circulatorii, stări febrile, hemoragii, scăderea potenței sexuale, albirea sau/și căderea părului, hiperaciditate, acumulare excesivă de toxine în organism.

Lipsa sării în organism determină tulburări digestive, boli ale sistemului nervos și circulator, dureri musculare.

Alimentele acre în exces (fructele acre, vegetalele fermentate, murăturile, oțetul) pot provoca afecțiuni circulatorii, hepato-biliare, tulburări de troficitate ale mucoaselor, gută, astenie, scăderea marcată a imunității.

Folosirea inadecvată, în cantități insuficiente, a alimentelor acre va avea ca urmare instalarea disfuncțiilor digestive, a tulburărilor cardiace sau nervoase.

Alimentele picante în exces pot provoca impotență sexuală, amețeli, stări subfebrile sau febrile, tulburări nervoase, în schimb, consumul redus al alimentelor picante determină pierderea poftei de mâncare, cu perturbări ale creșterii pondero-staturale, chiar rulburări circulatorii.

Abuzul de condimente amare are drept consecință instalarea unei astenii marcate, cu tulburări nervoase. Pe de altă parte, înlăturarea condimentelor amare din alimentație duce la scăderea imunității și, implicit, la creșterea receptivității la infecții microbiene și virale, la parazitoze, la afecțiuni cutanate. Se observă, de asemenea, și o scădere accentuată a tonusului muscular.

Ingerarea exagerată de alimente astringente determină constipație, suferințe nervoase sau musculare (cu paralizie sau impotență funcțională), afecțiuni cardiace.

Folosirea redusă a alimentelor astringente creează tulburări circulatorii și duce la scăderea timpului de coagulare a sângelui și la prelungirea duratei de vindecare a rănilor.

Teoria extrem-orientală a dietei echilibrate pe baza combinării adecvate a celor șase gusturi face mai clară înțelegerea fundamentală a relațiilor dintre corpul uman și dietă.

Pentru o mai bună clarificare a ideilor de mai sus, vom detalia câteva tipuri de dietă ayurvedică indicată în diverse afecțiuni.

Dieta în hiperaciditate și ulcer gastric

Alimente recomandate: Orez, Grâu, Orz, Fasole (de elecție!), Mazăre verde dulce, legume verzi fierte, portocale, lămâi, grape-fruit, lămâi dulci, mandarine, Pepene roșu, prune dulci, castraveți, struguri (în general, alimente foarte dulci sau ușor acrișoare).

La mijlocul mesei, se recomandă lapte, sucuri de fructe proaspete și apă.

Alimente interzise: carnea, băuturile alcoolice, alimentele fripte sau prăjite, Soia, mâncărurile grase, Conopida, Varza albă gătită, ridichile crude, oțetul, biscuiții, cojile de pâine, ceaiul, cafeaua, dulciurile, uleiul, picanteriile și murăturile.

Este foarte important ca mesele să fie respectate după un orar fix.

Dieta în alcoolism

Sunt indicate Grâul germinat și uscat, Orezul, carnea de berbec, peștele, alimentele dulci-acrișoare preparate în diferite moduri, incluzând legumele pregătite cu Piper, Ghimber și Coriandru;

se preferă legumele crude și proaspete, cu unt ca atare sau topit, fructele acre (portocale, ananas, mandarine, lămâi, grape-fruit, rodii) sau tomatele, produsele lactate, sucurile de fructe.

După mâncare, dieteticienii indieni preconizează o cantitate mică de vin sau bere.

Sunt excluse: zahărul, carnea de porc și de bivol, picanteriile, Porumbul, Meiul, Fasolea (boabe), ceaiul chinezesc, cafeaua sau alte băuturi tari, alimentele fripte sau coapte, fructele prea coapte, sarea în exces.

Dieta în alergii

În aceste afecțiuni se vor consuma de preferință Orezul, Hrișca, Meiul, Orzul, Ovăzul, legumele verzi fierte, Ghimberul și Piperul negru în toate preparatele culinare, rodiile, grape-fruit-ul, ceaiul sau alte băuturi tari, chiar alcoolice, Ardeiul iute, Usturoiul.

Nu sunt indicate: carnea de orice fel (inclusiv peștele), Fasolea (boabe), citricele, ouăle, cafeaua, fructele prea coapte, înghețata, ciupercile, Ceapa, iaurtul, brânzeturile, smântâna, alimentele acide, oțetul, băuturile reci, apa rece etc.

Dieta în artrită

În artrită, mesele ar trebui să conțină: Grâu, Orez, produse lactate, carne (cu excepția celei de oaie), mâncare grasă, toate fructele acre, ceai, cafea și alte băuturi tari; după mâncare, este permis consumul de băuturi alcoolice, dar în cantități moderate; totodată, se mai pot consuma și alimente preparate cu mirodenii caracteristice (Piper negru, Chimion, Ghimber, Nucșoară, frunze de Dafin), fructe uscate.

Nu se vor consuma: frunzele de zarzavaturi verzi (în special salata), fructele zemoase (Pepenele roșu, Dovleacul), cartofii și cartofii dulci, Gulia, Sfecla, ciupercile, lăstarii de Bambus și de Ferigă, Conopida, Varza, Fasolea, Meiul, Porumbul, înghețata și carnea de oaie.

Dieta recomandată în hepatită

Include Orezul, Grâul, Porumbul, Meiul, supa de fasole boabe, supa de ridichi uscate, supa de legume, ouă răcoapte, Papaya, dovleceii, Pepenele verde, castraveții, bananele, cantalupii, grape-fruit-ul, smochinele, cireșele, lămâile dulci sau alte fructe dulci, glucoza sau sucurile dulci de fructe.

Toate alimentele se vor prepara prin fierbere, de preferință în abur.

Sunt cu desăvârșire interzise mâncărurile grase (inclusiv laptele, untul, uleiul, iaurtul, cașcavalul), piersicile, băuturile alcoolice, ceaiul, cafeaua, băuturile fierbinți, Ardeiul iute, înghețata, nucile și arahidele.

Dieta în cancer

Există un regim ayurvedic chiar și pentru cancer, în care se recomandă să se consume: Orez, Grâu, Orz, Porumb, Fasole, Linte, portocale, Fasole pitică (oloagă), Mazăre dulce, Mazăre tânără, Lăptucă, Spanac, Creson, carote, dovlecei, Sparanghel, castraveți amari, Schinduf, toate produsele lactate (cu excepția iaurtului și a chefirului), carnea de iepure, de fazan și de păun, fructul de Papaya, Cantalupul, lămâile dulci, grape-fruit-ul, vișine, smochine, rodii, nuci de Anacardium occidentale, migdale, struguri, fistic, fructe dulci și miere de albine.

Sunt nerecomandate: carnea de vacă, de porc, de bivol, legumele cu frunze verzi, fasolea păstăi, Soia, semințele sau uleiul de Susan, tuberculii, ciupercile, oțetul, fructele acre, băuturile alcoolice, ceaiul, cafeaua (sau alte băuturi care conțin cofeină), sarea, fructele prea coapte sau fermentate, murăturile.

Desigur, dieteticienii noștri nu vor fi de acord cu o parte din alimentele recomandate sau prohibite. Aceste exemplificări au fost făcute numai pentru o înțelegere mai exactă a concepției și a atitudinii ayurvedice.

DIETA ÎN CONCEPȚIA TRADIȚIONALĂ CHINEZĂ

Bazat tot pe o teorie umorală, vastul sistem filosofic chinez a fost edificat pornind de la trei principii inițiale: tao (energia universală), yin și yang.

Acestora li s-au adăugat cele cinci elemente (ciclul celor 5 faze evolutive: WuShing) care alcătuiesc corpul uman și întregul univers: lemnul, focul, pământul, metalul și apa.

Termenii antagonici yin și yang se află într-o combinație bi-polară.

Dacă la început desemnau realități topografice — versantul însorit (yang), respectiv cel întunecat (yin) ai unui munte sau malul de miazăzi, respectiv cel de miazănoapte al unui râu — odată cu trecerea timpului, aceste noțiuni au fost adoptate pentru a denumi aspectele polare ale tuturor fenomenelor aflate în interdependență.

Prin urmare, yang este conotat ca tot ce e activ, expansiv, centrifug, dinamic și pozitiv, în vreme ce yin este asociat cu substanța, structura, centripetul, conservatorismul, negativul, pasivul. Yang înseamnă însorit, cald, uscat, acut, yin implică întuneric, frig, umed, cronic. Și organismul uman se află sub influența yin-yang: suprafața interioară a corpului aparține yang-ului, cea internă — yin-ului.

Dintre organele interne, cele cavitate aparțin yang-ului, iar cele parenchimotoase („piine”) — yin-ului. Yin și Yang sunt noțiuni relative, căci nu există yang absolut, după cum nu există nici yin absolut.

De exemplu, o persoană poate răci, cu febră ridicată și cefalee; în acest caz, ea se află în stare preponderentă yang.

În schimb, dacă un individ răcește fără simptome sau semne majore, cu excepția unei ușoare scăderi a poftei de mâncare, el se află cu certitudine în stare dominantă yin.

Important este ca balanța yin-yang să nu fie dezechilibrată, căci, în caz contrar, apare boala sau chiar moartea.

Alimentația joacă un rol important în cumpănirea acestei balanțe, medicina tradițională chineză recomandând **„hrana limpede” — așa-numita dietă „qingdan”**.

Aceasta are nu numai un rol nutritiv, ci și unul terapeutic.

De altfel, în concepția tradițională chineză se afirmă că **„primele cu adevărat medicamente sunt alimentele”**.

Se consideră că o hrană echilibrată se bazează cu preponderență pe fructe, legume și semințe, în proporție de 90%.

Acestora li se adaugă protide de origine animală, în special lapte și derivatele sale, ouă și **cât mai puțină carne**.

Există produse de Soia, de exemplu, care au un conținut mai ridicat în protide decât carnea și conțin majoritatea aminoacizilor esențiali.

În privința aportului de glucide, acesta poate fi asigurat de fructoza zaharurilor din fructe, din zahărul cât mai puțin rafinat, din miere și din extractul de malț.

Se preferă grăsimile de origine vegetală, care conțin mai puțini acizi grași saturați.

Totodată, **conform dietei tradiționale chineze, de la nici o masă nu trebuie să lipsească salatele, legumele și fructele proaspete nesupuse acțiunii căldurii**.

Cu toate că atât în bucătăria indiană, cât și în cea chineză se folosesc în mod frecvent picanterii și condimente, tratatele de dieto-terapie ale celor două mari culturi nu recomandă folosirea lor decât

extrem de limitat, în cantități foarte mici și numai pentru combaterea unor afecțiuni acute sau a unor parazitoze digestive.

Polarizarea de tip yin-yang se aplică și în cazul alimentelor; în funcție de elementul predominant, acestea pot fi de cinci tipuri: neutre, reci, calde, răcoroase, temperate.

În cazul alimentelor reci, ele sunt de tipul yin; la cealaltă extremă se află cele de tip yang, adică alimentele calde.

Alimentele răcoroase sunt de tip predominant yin, iar cele temperate de tip predominant yang.

Între tipul de alimente și anotimpurile din zonele temperate există o strânsă corelație, susține tradiția chineză.

Astfel, primăvara, yang-ul începe să crească, ajungând la valoarea maximă vara.

Apoi, spre toamnă, începe să crească yin-ul, atingând apogeul iarna. Prin urmare, din cele menționate mai înainte se poate desprinde că regimul alimentar cel mai adecvat pentru fiecare bolnav se poate stabili atât prin cunoașterea bolii de care suferă, cât și a naturii alimentelor recomandate în dieta sa.

Gustul alimentar prezintă, în concepția tradițională chineză, cinci tipuri de bază, exact ca și în dietoterapia ayurvedică: dulce, amar; acru, sărat și picant.

Ceea ce diferă însă față de sistemul indian este corespondența dintre elementele de bază care alcătuiesc corpul uman și tipul de aliment.

Astfel, dulcele este legat de elementul pământ, amarul de foc, aerul de lemn, picantul de metal, iar săratul de apă.

Alimentele dulci se recomandă în special persoanelor astenice sau celor aflate în convalescență după boli infecțioase, **alimentele amare** sunt indicate celor febrile, **cele acre** în cazul tratamentului tulburărilor cardio-circulatorii, iar **cele picante** sunt considerate a fi remediul optim în cazul guturailui, gripei și al afecțiunilor pulmonare.

Dacă **alimentele sărate** sunt preconizate în unele afecțiuni endocrine, ele sunt total contraindicate în maladiile renale.

* Bazată tot pe principiul polarității yin-yang, medicina chineză tradițională a intuit ceea ce știința occidentală avea să descopere peste mii de ani: importanța echilibrului dintre sistemul nervos simpatic și cel parasimpatic, cei doi reglatori ai vieții neurovegetative, care își găsesc asemănări izbitoare cu forțele opozante yin-yang.

Dezechilibrul dintre acestea reprezintă cauza inițială a oricărei boli, susțin medicii chinezi.

Față de sistemul occidental, diagnosticul acestora este mult mai subtil, mai detaliat și mai aprofundat, constând într-o evaluare precisă a cauzelor bolii.

Metoda diagnosticului (SZU-CHEN) se bazează pe examinare, interogare, consultație, palpate și miros, prin care se evaluează starea funcțională de moment a pacientului.

Fundamentul medicinei chineze constă în următoarele aspecte (după Manfred Pockert, 1977):

1. **Bolile simptomatice** se explică prin neregularități ale funcțiilor, dar fără alterări ale substratului (adică fără modificări organice). Dacă medicina occidentală poate oferi, câtă vreme nu se pot evidenția tulburări organice, numai un tratament nespecific în cazul acestor boli extrem de numeroase, medicina chineză, având drept preocupare majoră observarea funcțiilor organismului, poate diferenția simptome și, prin urmare, poate stabili un tratament mult mai specific.

2. **Bolile „chronodemice”** (shih-chg') apar simultan pe un vast teritoriu. Dacă aceste maladii au — în concepția occidentală — o cauză virală, în concepția medicală chineză sunt determinate de deficiențe sau

excedente energetice, pe anumite arii teritoriale (areale), condiționate de o stare imunologică particulară.

3. În ceea ce privește **bolile organice**, este acceptată unanim ideea că cele mai multe dintre bolile organice grave (insuficiența cardiacă, diabetul zaharat sau cancerul) sunt precedate de un stadiu preliminar al creșterii tulburărilor funcționale.

În cazul în care se stabilește un diagnostic precis și un tratament preventiv corespunzător, se poate evita stadiul organic al bolii care, potrivit medicilor chinezi, reprezintă un stadiu avansat, dar nu terminal al acestor boli.

* Pe lângă corelațiile stabilite între anotimpuri și alimentație, dietoterapia tradițională chineză mai ține seama și de mediul geografic (habitatul) specific, de vârstă, de sex, de tipul de activitate a individului, precum și de modul de viață al acestuia. În ceea ce privește vârsta, raedicina tradițională chineză recomandă ca alimentele copiilor să fie cât mai simple, cu valoare nutritivă ridicată, cât mai naturală, evitând dulciurile rafinate (bomboane, prăjituri, dulciuri, ciocolată, înghețată etc).
Similare sunt și sfaturile dietetice pentru cei în vârstă.

Măncarea bătrânilor trebuie să fie cât mai simplă, ușor digerabilă, având la bază cât mai multe fructe, legume și semințe și cât mai puține grăsimi și protide animale (carne), fiind indicat consumul de lapte, produse lactate și ouă, dar și acestea în cantități moderate.

Se vor evita condimentele, cafeaua, ciocolata, prăjiturile bogate în grăsimi; totodată, untul și grăsimile vor fi utilizate tot în cantități moderate.

Dieto-terapia asiatică pune un accent deosebit pe alimentele care întrețin yin-ul din corp și stimulează funcția renală.

Numeroasele studii efectuate azi în domeniul medicinei tradiționale chineze (cum ar fi, de exemplu, cele ale dr. **Bob Flaws**, 1995) subliniază faptul că o dietă echilibrată nu numai că previne sau chiar vindecă numeroase boli specifice vârstei a treia, dar prelungește mult viața.

În dieta vârstnicilor se vor include grăunțe germinate (Grâu, Porumb, Orz, Ovăz), semințe de legume (Fasole, Mazăre, Linte, Soia), legume și zarzavaturi „roșii” și „galbene” (Sfeclă, cartofi, dovlecei, morcovi). Legumele nu trebuie să lipsească de la nici o masă.

Potrivit aceluiași studii, carnea (inclusiv peștele) trebuie consumate în cantități reduse (cam 100 g de 3-4 ori pe săptămână).

Se vor evita alimentele fierte sau prăjite în grăsimi ori completate cu sosuri, precum și murăturile sau alte alimente fermentate.

Aromele artificiale create prin fermentație forțată conțin toxine nocive organismului, generatoare de boli. Este recomandat în special Orezul, deoarece hrănește yin-ul din corp, dar este necesar să fie consumat în combinație cu legume.

Ca o regulă generală, persoanele în vârstă trebuie să mănânce de mai multe ori pe zi câte puțin, ori de câte ori le este foame.

Referitor la modul de preparare a alimentelor, dieta tradițională chineză recomandă fierberea sau prelucrarea prin foc a alimentelor, deoarece în China există obiceiul fertilizării pământului cu excremente umane, factori de transmitere a multor boli microbiene sau parazitare.

Actualizând datele, în prezent este permisă folosirea crudităților; ca urmare a progresului în elucidarea cauzelor declanșatoare de boli și a renunțării la fertilizarea cu excremente umane.

Singura condiție ce se impune este numai spălarea sub jet de apă a legumelor și fructelor.

În privința prelucrării hranei, astăzi se preferă fierberea în abur în vase suprapuse speciale. Aceste vase relativ simple constau dintr-un recipient în care fierbe apa cu plante aromate, peste care se suprapun vase perforate în care se pun zarzavaturile în ordinea fierberii lor. Ultimul vas trebuie să fie bine acoperit cu un capac. Prin acest mod de fierbere a zarzavaturilor, se păstrează toate sărurile minerale și micro-elementele absolut necesare organismului. Atenție, însă! Niciodată nu se vor utiliza vase de aluminiu (potențial cancerigen)!

Nutriționiștii chinezi nu recomandă consumul de băuturi prea reci sau prea fierbinți. Temperatura minimă nu trebuie să fie sub 10°C, iar cea maximă nu va depăși valoarea de 40°C. În legătură cu acest aspect, merită semnalat un amănunt interesant: în sondajele ce luau în studiu longevitatea, rezultatele erau foarte diferite în ceea ce privește alimentația vârstnicilor. Unii dintre aceștia consumau moderat băuturi alcoolice, alții nu consumau deloc. Unii fumau, alții nu, unii erau vegetarieni, alții mâncau carne. Toți însă declarau în aceste sondaje că niciodată nu foloseau alimente sau băuturi foarte reci sau foarte calde.

Cum spuneam mai sus, vârstnicii trebuie să mănânce ori de câte ori le este foame. Se vor avea în vedere mesele la ore fixe, în scopul creării unui act reflex care să stimuleze pofta de mâncare. Se recomandă ca alimentele cele mai consistente să fie consumate dimineața, astfel ca spre seară alimentele să fie din ce în ce mai ușoare. Trebuie avut în vedere un alt principiu important: masticăția. Înainte de îngurgitare (înghițire), alimentele trebuie mestecate (triturate) de cel puțin 10 ori. În timpul mesei, întreaga atenție va fi concentrată asupra hranei, înlăturând orice gând străin, iar discuțiile purtate vor fi cât mai puține și deconectante.

O metodă de facilitare a digestiei constă în masajul circular, de 20-30 de ori, al stomacului în sensul acelor de ceasornic, iar apoi de tot atâtea ori în sens invers. Pentru cei supuși constipației cronice, masajul se recomandă a fi executat în sens orizontal, de la dreapta la stânga. După masă, este recomandabilă o plimbare ușoară de 10-15 minute, iar apoi se face siesta stând culcat sau chiar dormind o jumătate de oră.

Dieto-terapia tradițională chineză ține seama în recomandările sale și de particularitățile specifice fiecărui sex. Astfel, la femei, după pubertate, se petrec de-a lungul anilor fenomene fiziologice normale: menstruația, sarcina, nașterea, alăptarea, menopauza. Din acest motiv, pierderile de vitamine, săruri minerale, microelemente (în special fier și calciu) și de enzime sunt mai mari la femei decât la bărbați. În consecință, regimul dietetic va fi îmbogățit în aceste elemente cu funcție de catalizator, care contribuie la metabolizarea substanțelor nutritive și sunt absolut indispensabile organismului. Pentru femeile cu tendință spre anemie sunt indicate alimentele bogate în fier, cum sunt ouăle, Spanacul, Ștevia, urzicile și multe alte legume și fructe. În perioada sarcinii și alăptării se recomandă alimente bogate în calciu, fosfor, fier și vitamina D, precum și un aport mai substanțial de proteine vegetale sau animale. Pentru menopauză, este preferabil un regim hiperproteic, hipolipidic și hipoglicidic, dar bogat în legume, fructe și semințe; în acest mod se înlătură și tendința spre obezitate.

În continuare, vom enumera, așa cum am procedat și în cazul dietei ayurvedice, câteva tipuri de regim indicate de către medicina tradițională chineză în diverse afecțiuni.

Dieta în hipertensiune

În hipertensiune, se recomandă vegetalele, fructele proaspete sau sucul de fructe, supele ușoare (consome-uri) de legume.

Dintre rădăcinoase, este indicată țelina rasă sau sub formă de salată combinată cu morcovi, sub formă de supă sau garnituri la alte mâncăruri.

Sunt benefice și guliile, ridichile roșii sau negre (rase), fără sare.

Dintre fructe, sunt preferate coacăzele, lămâile, vișinele și merele, iar dintre semințe — castanele.

Sunt interzise toate băuturile alcoolice, condimentele iuți, murăturile, sarea.

Dieta în guturai și gripă

În guturai sau chiar în gripă, un meniu corect ar trebui să conțină foarte multe semințe exotice care conțin uleiuri volatile (aromate), dar și, unele plante care cresc și la noi, cum sunt Țelina, larba mare (rădăcina), Podbalul (numai frunzele), Usturoiul, varietăți de Ceapă, Sparanghelul, vinetele etc.

De asemenea, se recomandă ca în preparatele culinare să se adauge, după fierberea alimentelor, frunze de Mentă, Busuioc, frunze de Dud, flori de Crizanteme etc.

Ne vom opri aici cu exemplificările, deoarece în regimurile dietei chinezești indicate pentru numeroase și diverse afecțiuni, sunt incluse foarte multe alimente cu care noi, europenii, nu prea suntem obișnuiți (ca să folosim un eufemism), cum ar fi supa de carne de câine, de broască țestoasă, de șopârlă, de șerpi, de solzi de pește etc, etc.

CAP.3 RECOMANDARI PENTRU OBTINEREA UNOR PREPARATE DIN FRUCTE, LEGUME ȘI SEMINTE

Consumarea fructelor și a celor mai multe dintre legume și semințe proaspete — ca atare, în stare crudă — sau a sucului celular proaspăt obținut din ele, atât în alimentație cât și în scopuri terapeutice, este forma ideală care păstrează toate calitățile naturale ale produșilor sau ale substanțelor active elaborate de celula vegetală.

Cum însă acest lucru nu este posibil în zona temperată în tot timpul anului, iar gama sortimentelor de fructe și legume variază de la sezon la sezon, se pot realiza unele preparate care să păstreze în bună parte proprietățile nutritive și terapeutice ale acestor produse naturale.

Indiferent că este vorba de folosirea fructelor și legumelor în stare crudă sau de folosirea lor sub formă uscată (natural sau deshidratate pe cale artificială), prima măsură de precauție care trebuie luată înainte de consumare este spălarea cât mai îndelungată cu apă potabilă sau cu apă fiartă și răcită.

Chiar o infuzie, cu apă clocotită a fructelor sau legumelor nespălate bine, nu duce la distrugerea unor forme de rezistență a unor microorganisme patogene.

De aceea, insistăm, încă o dată, ca fructele și legumele să fie foarte bine spălate înainte de utilizare sau de uscarea pentru iarnă.

Pe de altă parte, dorim să subliniem încă o dată că, prin fierberea legumelor direct în apă, o mare parte din sărurile minerale și microelementele utile organismului se pierde.

Superioară acestei modalități curente este fierberea direct în abur, într-un set de cratițe suprapuse, un timp cât mai scurt.

Pentru folosirea fructelor și legumelor proaspete sau uscate, în scopuri terapeutice, vom prezenta pe scurt câteva dintre procedeele cele mai frecvente de preparare care pot fi efectuate în orice gospodărie.

MACERATUL LA RECE

Se obține din fructe și legume tăiate în bucăți mici sau răzuite printr-o răzătoare de sticlă, material plastic sau metal inoxidabil, peste care se pune cantitatea de apă prescrisă.

Se lasă în contact 6-8 ore, nu mai mult, deoarece, mai ales vara, la temperatura mediului ambiant pot surveni fenomene de fermentare sau de dezvoltare a unor bacterii prezente în mediul ambiant sau chiar pe suprafața plantelor.

Se recomandă ca vara macerarea să se facă la cca +4°C, la frigider.

După păstrare în contact cu apa, maceratul se filtrează prin tifon dublu, iar în final se stoarce conținutul din tifon.

Maceratul astfel obținut se folosește imediat sau se păstrează la frigider maximum 24 de ore.

INFUZIA

Este tot o extracție, obținută însă la cald.

În acest scop, fructele și legumele, bine spălate, se pun într-un vas de porțelan, de lut smâltuit sau de faianță, cu capac, încălzit în prealabil cu apă clocotită.

Se toarnă cantitatea de apă clocotită peste materialul vegetal tăiat mărunt.

Se acoperă vasul de infuzare și se lasă în repaus cca 20 minute.

Se filtrează, prin stoarcere sau presare, prin tifonul dublu pus pe o strecurătoare.

Infuzia obținută se consumă în 24 de ore.

DECOCTUL

Fructele sau legumele fragmentate mărunt se fierb la foc domol timp de 20-30 minute.

Se completează cu apa pierdută prin evaporare tot cu apă fiarlă.

Se filtrează la fel ca infuzia și se consumă în 24—48 ore.

Dacă este necesară păstrarea timp mai îndelungat, extractul obținut după filtrare se pune în sticle bine închise la gură (preferabil legate cu celofan) și se sterilizează pe baia de apă 30-40 minute.

SIROPUL

Este un extract destinat conservării mai îndelungate.

Conservarea este asigurată prin concentrația ridicată în zahăr.

Un sirop natural bun, care asigură nealterate aroma și substanțele active din materia primă vegetală, se obține la rece.

În acest scop, se prepară mai întâi un suc proaspăt din fructe sau legume, fie prin presare puternică (hidraulică), fie cu ajutorul unei prese mecanice sau electrice.

Se filtrează și se lasă la sedimentat 2-3 ore, după care se trage sucule obținut cu un tub de cauciuc sau plastic.

În sucule limpede se adaugă treptat zahăr și se agită din când în când.

Operația poate dura mai multe ore, pâna la o zi.

Când sucul de fructe a devenit suprasaturat în zahăr, aceasta se recunoaște ușor după stratul de zahăr, care rămâne pe fundul sticlei, nedizolvat.

O concentrație de 62-65% zahăr asigură o conservare naturală (fără conservant sau fără fierbere) timp de mai mulți ani.

Siropurile pot fi obținute și prin fierbere, dar în acest caz, atât aroma, cât și o serie de substanțe active își modifică sau își pierd proprietățile terapeutice.

CIDRUL DIN FRUCTE

Se obține din material vegetal fragmentat (cca 1 kg uscat sau 2-3 kg proaspăt) la care se adaugă 1,8-3 kg zahăr, 10 litri apă (fiartă și răcită) și cca 30 g drojdie de bere, eventual sucul de la 2 lămâi și coaja de la 1/2 lămâie.

Vasul cel mai indicat este damigeana de sticlă (nu de plastic!), prevăzută cu un dop perforat prin care este trecut un tub subțire din cauciuc sau material plastic, în așa fel încât capătul tubului din interiorul damigenei să nu atingă lichidul.

Capătul exterior al tubului se introduce într-o sticlă cu apă.

Când bioxidul de carbon format în timpul fermentației nu mai barbotează prin capătul tubului cufundat în apă, înseamnă că fermentația a încetat.

La temperatura camerei, fermentația durează 4-6 săptămâni.

Cidrul obținut se trage în sticle și se păstrează la frigider.

Este o băutură cu conținut moderat de alcool, care poate fi consumată numai de adulți.

TINCTURA

Se obține din cantitatea de fructe sau de legume prescrisă prin macerare 8-10 zile în alcool de 45°, 60°, 70°, într-un vas de sticlă bine închis.

Se filtrează și se păstrează în sticle cu dop.

Utilizarea tincturilor în general nu este recomandabilă celor care suferă de afecțiuni la care alcoolul este contraindicat și nici copiilor.

Tincturile se recomandă în special bolnavilor cărora le este contraindicat consumul mare de apă.

APLICAȚII EXTERNE

Pentru uzul extern se pot folosi toate formele de preparate descrise, sub formă de cataplasme, comprese sau prișnițe ori direct din produsele vegetale proaspete puse în două tifoane.

De asemenea, fructele și legumele se pot folosi sub formă de loțiuni sau frecții cu suc proaspăt sau preparat după unul din procedeele descrise.

PREPARAREA SUCURILOR

Fructele și legumele destinate preparării sucurilor trebuie să fie de bună calitate și ajunse la maturitate. Atât fructele cât și legumele pot conține un mare număr de germeni patogeni, paraziți și virusuri care prezintă un real pericol pentru sănătate.

De aceea, prima măsură care trebuie luată, în cazul consumării fructelor și legumelor ca atare sau sub formă de suc proaspăt, este eliminarea, cât mai mult posibil, a tuturor factorilor nocivi semnalati.

Pentru îndepărtarea prafului, pământului, a ouălor de paraziți și în bună parte a germenilor patogeni, singura măsură practică pe care o recomandăm este spălarea îndelungată, sub jet de apă potabilă, a fructelor și legumelor înainte de a fi consumate sau transformate în sucuri.

În timpul epidemiilor din perioada estivală sau în zonele tropicale și ecuatoriale, unde frecvența acestor epidemii este mai mare, fructele și legumele se vor ține câteva minute în apă cu cloramină, iar apoi se vor clăti cu apă potabilă înainte de a fi consumate, chiar și în cazul în care ele se consumă sau se prepară decorticate.

Pentru prepararea sucurilor se vor utiliza numai materiale de inox, sticlă sau plastic.

În prezent există numeroase tipuri de aparate manuale sau electrice pentru obținerea sucurilor naturale.

Randamentele cele mai bune se obțin prin prese de tip hidraulic.

Acestea prezintă și avantajul utilizării unor materiale de protecție de tip teflon, care împiedică un contact direct al fructelor și legumelor cu metalele ce produc transformări calitative, diminuând valoarea terapeutică a multor substanțe pe care le conține sucular celular al plantei.

Deși în comerț există aparate și vase de aluminiu, acestea se vor evita la prepararea sucurilor naturale.

Este recomandabil ca sucurile să se consume imediat după preparare. Se pot păstra în frigider, în sticle, cel mult 12 ore.

În ceea ce privește utilizarea sucurilor, ele pot fi consumate ca atare, îndulcite (dacă este cazul) cu miere, simple sau asociate, ținând seama de scopul pentru care se folosesc.

Din materialul prezentat în această lucrare, cu puțină imaginație, se poate alcătui o rețetă de sucuri mixte în funcție de afecțiunea avută sau de scopul urmărit.

Unele sucuri din legume cu gust puțin agreabil, cum este cel de cartof crud, de exemplu, pot fi ameliorate cu puțin suc de morcovi, de țelină sau de tomate, după gust.

Nu trebuie neglijate nici „deșeurile” care rezultă de la prepararea sucurilor.

De exemplu, resturile care rămân de la sucular de morcov pot fi transformate în chifteluțe delicioase prin adăugarea unui ou, cu puțină făină, puțin unt sau brânză de vaci și puțină carne, după care se prăjesc în ulei.

CONSERVAREA SUCURILOR

Cea mai indicată metodă de conservare a sucurilor proaspete de fructe, iară fierbere, este adăugarea de cca 65% zahăr, până se obține un sirop suprasaturat în zahăr care se recunoaște după cristalele de zahăr care rămân la fundul sticlei după 2-3 zile de la dizolvarea cantității de zahăr utilizate.

În acest fel, se pot conserva pentru iarnă sucular de vișine, de coacăze, de afme, de zmeură etc.

Prin această metodă, sucular transformat în sirop își păstrează în bună parte proprietățile de „suc natural”, precum și aroma.

Nu rămâne decât să se dilueze cu apă sau cu apă carbo-gazoasă, la întrebuintare.

Se va evita fierberea sucurilor sau adăugarea de conservanți.

Ca o regulă generală, atât pentru omul sănătos, cât și pentru cel bolnav, micul dejun se va începe cu un pahar de suc natural de fructe sau legume.

Sub aspect energetic, un litru de must (suc proaspăt de struguri) reprezintă echivalentul a peste 1/2 kg carne sau 12 ouă, sau aproape 1,250 kg cartofi).

Dar valoarea sucurilor nu trebuie apreciată sub raportul de calorii.

Sucular de fructe și legume conțin vitamine, zaharuri direct asimilabile, enzime, protide, fitohormoni, acizi organici, săruri minerale, substanțe cu acțiune antimicrobiană și numeroase microelemente absolut indispensabile funcției vitale.

FRUCTELE ȘI LEGUMELE USCATE

Dacă una dintre metodele cele mai vechi pentru conservarea în zona temperată a fructelor și în mai mică măsură a legumelor condimentare a fost uscarea lor la soare sau la căldura artificială, în prezent se utilizează industrial, pe scară largă, deshidratarea legumelor. Este o metodă practică prin care se ușurează mult munca gospodinelor. Fulgii de cartof permit prepararea unui pireu în câteva minute; varza, ceapa sau morcovii deshidratați scutesc mult timp la prepararea alimentelor. Sub aspect energetic, fructele și legumele uscate sau deshidratate au o valoare de 3-5 ori mai mare decât cele crude, raportate la greutate. Acest fapt este explicabil, deoarece, în general, fructele și legumele crude, proaspete conțin 80-95% apă. Prin deshidratare nu se pierd principiile componente din fructe și legume și nici oligoelementele. Se diminuează conținutul în enzime și vitamine, dar în nici un caz atât de mult ca în cazul conservelor. În prezent, în numeroase țări, precum și în țara noastră au început să se construiască uscătorii cu energie solară, care pot fi utilizate și la uscarea multor sortimente de fructe și legume.

ALTE METODE DE CONSERVARE

Există în prezent numeroase metode de conservare a fructelor și legumelor, prin congelare, refrigerare în spații climatizate cu un regim constant de temperatură și umiditate.

Prin congelare, metodă cu consum ridicat de energie, fructele și legumele își păstrează în special culoarea și calitățile nutritive; în schimb, proprietățile olfactive scad simțitor.

În special la decongelare, care se face destul de brusc, consistența fructelor și legumelor se schimbă radical.

Ele trebuie consumate imediat, deoarece în câteva ore își pierd și celelalte calități.

Pentru struguri și în special pentru mere și pere există metode simple, clasice, de conservare timp de 6-7 luni, în spații special amenajate la o temperatură scăzută — în jur de 4-5 °C și cu umiditate suficientă pentru a nu se deshidrata în timp.

La fel, silozurile, beciurile, lădițele cu nisip pentru cartofi, morcovi și alte legume reprezintă metode economice, practice și la îndemâna celor din mediul rural pentru conservarea în timpul iernii a numeroase sortimente de legume.

Pentru locuitorii din mediul urban — care în general nu au spații speciale de conservare — legumele și fructele sunt asigurate prin unitățile de desfacere în tot timpul anului.

Forma artificială de conservare în ambalaje metalice sau de sticlă, sub formă de ghiveciuri, compoturi, gemuri etc, considerăm că, excecptând murăturile, trebuie evitată cât mai mult.

Prin acțiunea factorului termic la prepararea lor și prin adăugarea unor „conservanți”, principalele proprietăți, în special cele terapeutice, pe care le au fructele și legumele se pierd.

În plus, această formă de conservare prezintă pericolul dezvoltării unor germeni foarte periculoși, cum ar fi Clostridia botulinică ce produce cea mai puternică toxină și aceasta ca un reves al insuficienței preparării termice a conservatelor.

De aceea, optăm pentru conservarea fructelor și legumelor prin metode cu consum cât mai scăzut de energie calorică, cât mai economice și totodată eficiente sub aspect terapeutic, respectiv prin păstrarea în condiții și prin metode naturale a tot ceea ce biosinteza prin minunatul ei mecanism a reușit să producă.

CÂTEVA PREPARATE RECI DIN FRUCTE ȘI LEGUME

— 1/2 kg mere rase, cu coajă cu tot, amestecând bine cu coajă de lămâie sau de portocală rasă și cu spuma de albuș de la două ouă.

Se repartizează în cupe.

Deasupra se pune cremă de cacao sau sirop de zmeură, coacăze sau vișine sau puțină dulceață de afine, caise, vișine sau cireșe.

— Se amestecă 100 g fructe (căpșuni tăiate în patru sau fragi, afine, coacăze etc.) cu două borcane de iaurt, cu fulgi de cereale sau cu două felii de pâine graham sau integrală și o lingură de zahăr.

— Fructe de sezon (căpșuni, cireșe, caise, piersici, zmeură, prune etc.) tăiate mărunt, amestecate cu nuci tăiate fin.

Se prepară o cremă din 30 g unt, 40 g făină, puțină sare, 30 g zahăr și 1/2 l lapte.

După răcire, creina se amestecă cu fructele proaspete. Se servește în cupe.

— Legume de sezon: ardei, roșii, castraveți, morcovi, ridichi, sfeclă roșie, țelină sau varză albă, rase sau tăiate fin, amestecate bine.

Se prepară o maioneză din gălbenuș de ou, untdelemn, suc de lămâie, puțină sare și smântână.

Se amestecă maioneza cu legumele.

Se servește ca aperitiv.

O altă variantă se obține amestecând legumele tăiate cu puțin untdelemn, două ouă fierte, cartofi fierți și brânză rasă sau iaurt.

— Sos de roșii.

Se trec roșiile printr-o sită inoxidabilă sau de plastic.

Se adaugă sare după gust și puțin usturoi ras.

Se amestecă cu iaurt sau cu puțin untdelemn.

— Maioneza.

Se prepară din două gălbenușuri de ou, 50 g untdelemn adăugat picătură cu picătură în timpul frecării, 20 g muștar; se omogenizează amestecul bine, în timp ce se adaugă suc de lămâie sau sare de lămâie și puțină sare, Baza de maioneză se amestecă cu legume de sezon tăiat fin.

Dintr-un kg de castraveți tăiați în felii subțiri, cu o căpățână de usturoi ras sau pisat fin, Pătrunjel verde, Cimbru sau Busuioc (după gust), amestecat cu puțin untdelemn și sare, 2 borcane de iaurt sau cu smântână, se obține o salată gustoasă.

În perioada de iarnă se pot obține salate crude foarte gustoase din varză albă sau roșie, ridichi negre rase, morcovi, țelină, sfeclă rasă, puțin hrean, suc de lămâie, untdelemn, iaurt sau smântână, după gust.

Primăvara se pot obține salate gustoase și din plante necultivate, din flora spontană (frunze tinere de Păpădie, Untișor, Măcriș, Leurdă sau Usturoiță, urzici foarte tinere) care se prepară cu maioneză sau cu salată de cartofi fierți.

Acestea sunt doar câteva exemplificări de preparate alimentare ce se pot obține din fructe și legume.

Din partea specială a acestei lucrări, din bogata literatură în acest domeniu și mai ales din imaginația și din arta gospodinelor, se pot naște sute de rețete culinare având la bază gama largă de materii prime naturale datorite de natură, de regnul vegetal.

Recomandăm cât mai multe produse naturale, cât mai multe crudități!

OBSERVATII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE

Trăim într-o lume din ce în ce mai civilizată, mai urbanizată, mai mecanizată, care cere adaptarea organismului nostru la noile condiții de viață.

Suntem confrunțați zi de zi cu un aer amestecat cu gaze de eșapament, cu un cer acoperit de norii artificiali ai industriei poluante, cu o apă potabilă în care se infiltrează de multe ori prea mult azot sau pesticide, cu o viață sedentară, lipsită de mișcare în aer curat, cu surmenajul profesional și cu stresul. Sub aspect calitativ, însăși alimentația noastră zilnică a suferit modificări esențiale din cauza chimizării excesive, mijloacelor moderne de combatere a dăunătorilor și prelucrării artificiale a alimentelor. Locul crudităților a fost luat de preparatele gătite din legume și fructe conservate și de compoturile cu conservanti.

Carnea, așa cum era utilizată odinioară, proaspătă sau conservată, sub formă naturală, a fost înlocuită de preparatele din carne, creându-se adevărate industrii de prelucrare.

Peștele proaspăt a fost înlocuit de conservele din pește, iar făina integrală a fost înlocuită de pâinea albă și de pastele făinoase.

Cercetările științifice asupra alimentației și efectelor ei asupra organismului au demonstrat că o masă obișnuită — formată dintr-o supă, o mâncare cu carne și legume și o prăjitură — determină o creștere rapidă a numărului de leucocite față de valoarea normală (cca 7.000/mm³), astfel încât după 10 minute se ajunge la 10.000, iar după 1/2 oră de la prânz la 30.000/mm³.

Acest fenomen este similar cazurilor de boli infecțioase sau inflamatorii.

Reacția de apărare a organismului în urma consumării alimentelor gătite se numește leucocitoză digestivă.

Numărul de leucocite revine la normal abia după o oră și jumătate.

Nu același lucru se întâmplă în cazul consumării unor alimente preparate din legume și fructe proaspete, crude, cu structura vie. În acest din urmă caz, numărul de leucocite rămâne în limitele normale.

Mai mult, în cazul în care se recurge la o alimentație mixtă, cu alimente gătite și crudități, fie înainte, fie imediat după masă, fenomenul de leucocitoză digestivă este foarte redus.

Experiențele de laborator au demonstrat că, în cazul în care sunt hrănite numai cu alimente gătite, animalele de laborator se îmbolnăvesc grav și mor în scurt timp.

Aceste exemplificări ne atrag atenția asupra posibilității înlăturării greșelilor din alimentația noastră zilnică prin utilizarea în fiecare zi, la fiecare masă, a cât mai multor fructe crude.

Fără îndoială că protidele sunt indispensabile în alimentația omului.

Necesarul zilnic este de 60-90 g pentru un adult.

Acestea pot fi procurate din ouă, lapte, produse lactate, carne, pește, precum și din numeroase legume, ca Soia, Fasolea, Mazărea, Lintea, din fructe și semințe oleaginoase.

Cu toate acestea, protidele din legume nu au aceeași calitate și același conținut în aminoacizi esențiali, absolut necesari organismului, precum cele provenite din carne, ouă, lapte și produse lactate.

Se recomandă ca minimum 20-30 g din protidele necesare zilnic să provină din regnul animal.

Lipsa de protide animale din alimentație este la fel de dăunătoare ca și abuzul de astfel de protide.

În ceea ce privește consumul normal de grăsimi, necesarul zilnic a fost stabilit între 40-80 g pe zi.

Această cantitate este de cele mai multe ori depășită.

Se preferă folosirea mai multor tipuri de grăsimi, ținând însă seama de însumarea cantității consumate zilnic.

Grăsimile obținute prin presare la rece, cât mai puțin purificate chimic, sunt superioare celor obținute la cald și ultraînalte prin procedee chimice.

Despre rolul vitaminelor, enzimelor, fitohormonilor, al sărurilor minerale și al microelementelor absolut necesare în alimentația zilnică am vorbit în capitolul privind aspectele biochimice ale alimentației.

Cantitatea și calitatea acestora se asigură tot prin utilizarea în alimentație a cât mai multor crudități.

În cadrul recomandărilor generale am dorit să atragem atenția asupra faptului că avem la îndemână tot ceea ce ne trebuie pentru o alimentație cât mai naturală, pentru a asigura corpului nostru o sănătate cât mai bună.

Ca o concluzie generală, putem afirma că esențial în alimentație este modul în care pregătint și introducem în corpul nostru alimentele.

CAP.4 PRINCIPALELE FRUCTE DIN ALIMENTATIE

Pentru fiecare dintre cele mai comune fructe și legume utilizate în alimentație am adoptat o clasificare recunoscută de cei mai mulți autori în acest domeniu.

După un scurt istoric, în cadrul monografiilor prezentate se va descrie compoziția chimică și, pe această bază, vor fi formulate indicațiile terapeutice.

Recomandările de folosire atât în uzul intern cât și în cel extern au la bază procedee simple de preparare care pot fi introduse în orice cămin.

GRUPA FRUCTELOR SĂMÂNȚOASE

Este o grupă foarte unitară din punct de vedere botanic, toate speciile făcând parte din subfamilia Pomoideae și a familiei Rosaceae, având drept principal caracter comun fructul fals de tip poamă, un fruct care nu ia naștere doar din peretele ovarului, ci din concreșterea acestuia cu receptaculul care devine gros și cărnos.

Din această grupă prezentăm două dintre speciile cu cea mai mare răspândire la noi, respectiv Mărul și Părul, alături de Gutui și din ce în ce mai puțin cunoscutul Moșmon, cultivat azi doar sporadic.

Toate, dar în special Mărul și Gutuiul, au importante proprietăți fitoterapeutice.

Mărul, acest pom minunat, prezent lângă casa omului, de la locuințele palustre și până la vilele moderne de azi, are proprietăți diuretice și urolitice remarcabile, hipocolesterolemizante, antiseptice intestinale, decongestive hepatice și multe altele, iar Gutuiul, cultivat în urmă cu mai bine de 4 milenii în Babilon și Persia, este un excelent remediu antidiareic, în special pentru copii și persoanele de vârstă înaintată.

MĂRUL

MALUS PUMILA MILL. (sinonim *Malus domestica* Borkh etc.) (FAM. ROSACEAE)

În prezent, genul *Malus* este reprezentat prin 28 de specii și peste 10.000 de soiuri cultivate.

De o mare varietate, cu piețiță verzuie și aproape transparentă, suav-gălbui sau roșu îmbujorate, merele sunt cele mai populare fructe autohtorie și cele mai larg consumate.

La vârsta copilăriei, printre poveștile cele mai îndrăgite se numără și „Prâslea cel voinic și merele de aur”, iar în colinde ni se urează să înflorim ca Mărul, ca Părul...

Mitologia greco-romană este foarte bogată în legende în care Mărul joacă un rol de seamă (să ne gândim numai la mărul de aur pe care Paris l-a înmănat zeiței Venus ca semn de supremă apreciere a frumuseții ei), iar în mitologia scandinavă nu ambrozia era hrana zeilor, ci merele.

În legenda cea mai dragă elvețienilor, despre Wilhelm Tell ca simbol al dragostei lor pentru libertate, Mărul joacă un rol deosebit.

Mâncarea ceremonială a Paștelui evreiesc includea la desert o combinație de mere tocate mărunt, nuci și stafide pisate, curmale, scorțișoară, vin și miere.

Această hrană ritualică se numește charoset (haroset) și se pare că însuși Iisus a gustat din ea.

În mitologia română, Mărul este considerat pomul vieții și exprimă, în credința țăranilor, dorința de rod bogat, de belșug și perenitate.

În unele zone din țară, mireasa se joacă pe două mlădițe de Măr dulce, pentru ca sarcina căsătoriei să nu fie anevoioasă.

Tot după o veche tradiție a locului, se puneau în apă ramuri de Măr, care urmau să înflorească de Anul Nou, cu care copiii mergeau apoi la sorcovit.

Acum, sorcovele sunt de hârtie sau de plastic...

Pentru importante și bine cunoscutele proprietăți terapeutice pe care le are, un dicton, larg răspândit în mai toată Europa, spune: „Un măr pe zi, doctorul niciodată”.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Mărul ca fruct conține, în funcție de soi sau varietate, 83-93% apă.

S-au identificat până în prezent zaharuri reducătoare (7-16%), celuloză (în coajă), zaharoză, pentozane (poliglucide), lignine, acizi organici liberi și combinați, pectine, materii grase, protide, taninuri, săruri de Ca, Na, Fe, K, P și — în cantități mai mici — Si, Al, Mg, Mn, S, Co etc.

Aroma este dată de esterii amilici, acizii capronic, formic și acetic, de geraniol și aldehida acetică.

Conținutul în principalele vitamine este prezentat în tabelele de la sfârșitul lucrării.

Merele conțin pe lângă vitaminele A, B, C și vitamina PP în partea externă a fructului.

De remarcă este faptul că în coaja fructului se află de două ori mai mult acid pantotenic și de două ori mai multă vitamină C decât în pulpă.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Principalele acțiuni se manifestă asupra aparatului digestiv.

Datorită acidității moderate, merele ajută digestia, provocând prin act reflex o importantă creștere a secreției salivare și gastrice.

Merele consumate cu coajă sunt ușor laxative și absorbante ale toxinelor și microorganismelor la nivelul intestinului, care sunt înglobate în celuloza și pectinele pe care le conțin, care nu sunt iritante și care se elimină.

La copii, merele rase curățate de coajă — alături de morcovi — reprezintă un tratament eficient în diareile acute și cronice.

Acțiunea diuretică a merelor este evidentă, dar mai importantă este eliminarea masivă pe această cale a acidului uric, ceea ce le face utile nu numai în afecțiunile renale ci și în diatezele urice (artrism, reumatism, gută).

Preventiv și curativ, ele au acțiune favorabilă în hipertensiunea arterială, ceea ce, combinat cu proprietatea pe care o au de a micșora concentrația colesterolului în sânge, justifică recomandarea lor în ateroscleroză.

Merele intră în dieta pentru combaterea obezității, iar în gerontologie sunt considerate utile în multe dintre neplăcerile pe care le aduce cu sine vârsta înaintată.

Autorii elvețieni citează rezultate favorabile în tratarea diabetului infantil prin cură de mere și tomate. Asupra sistemului nervos au o acțiune calmantă, considerându-se că un măr mâncat seara, la cutcare, ușurează somnul.

Este cunoscută în medicina populară utilizarea merelor pentru efectele lor asupra afecțiunilor pectorale, favorizând eiiminarea secrețiilor bronșice.

Extern

Medicina populară recomandă aplicații calde de fructe fierte, în dureri de urechi.

Pe plăgi atone se aplică fie mere rase și fierte în sucii lor, fie suc cu ulei în părți egale.

Tot în medicina populară se consideră utilă aplicarea de tărâțe bine umectate cu decoct de mere concentrat și cald în zona splinei, contra inflamațiilor acesteia.

Cosmetică

Sucul merelor ajută la tonifierea țesuturilor, masându-se ușor obrații, sânul, abdomenul.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Merele pot fi folosite ca atare, în cure de lungă durată, mergându-se până la 1 kg/zi, la bătrâni și bolnavi putându-se da numai sucii.

Pentru obezitate se recomandă „zile de mere”, în care să se consume câte 1 kg de mere pe zi, fără alimente.

Decocturi din mere uscate și bine mărunțite, o lingură la o cană, luându-se 3-5 căni pe zi îndulcite.

Mere rase, contra diareilor la copii (1/2 kg-1 kg pe zi, la cele 5 mese).

Decoct dintr-un măr tăiat în bucățele în 1/2 l apă, fiert la foc încet până se reduce la jumătate; se îndulcește și se bea seara înainte de culcare.

Sirop laxativ și pectoral, îndeosebi pentru copii, din suc de mere și zahăr în părți egale; se fierbe la foc încet până la consistență siropoasă, luându-se câte 2 linguri înainte de fiecare masă.

În hipertensiune, edeme cardiorenale, ateroscleroză, colesterolemie, preinfarct, se recomandă de unii autori cura lui Kempner, care duce la scăderea severă a colesterolului sangvin, reducerea valorii tensiunii arteriale, reducerea edemelor, merele având un rol important.

Într-o primă fază (1-3 luni), o adevărată „fază de atac”, se consumă numai 230-300 g orez fiert pe zi și mere (după gust).

Într-o a doua fază, se introduc puțin câte puțin legume, carne, pește, cartofi și puțină pâine fără sare.

Oțetul de mere și miere

După Elena Niță Ibrian, rezumativ se prepară astfel: merele din soiurile de toamnă se spală, se strivesc în piua de lemn sau se rad prin răzătoare inox.

Peste acest terci pus într-un vas potrivit se adaugă 5 litri apă la 4 kg terci și, pentru fiecare litru de apă, 140 g miere.

Se poate pune, pentru a grăbi fermentația, 1/2 kg drojdie de vin din struguri hibridi, nestropiți (partea groasă lichidă ce rămâne după tragerea vinului).

Borcanul sau vasul de lut în care s-a preparat această combinație se ține la temperatura camerei (20-30°C) neastupat, doar legat la gură cu un tifon, pentru a nu intra musculițele.

Se ține la loc întunecos.

Prima fază de fermentare durează 10-12 zile, perioadă în care se amestecă de 2-3 ori pe zi cu o lopățică de lemn.

Sucul obținut după fermentație se strecoară prin tifon dublu.

Se pune într-un vas cu gura largă și se mai adaugă pentru fiecare litru de suc 50 g miere.

Pentru a doua fază a fermentației, de asemenea aerobă, se leagă gura borcanului tot cu tifon și se păstrează la căldură.

După 40-60 zile oțetul este gata.

Se trage după limpezire, cu furtunul, în sticle care, astupate bine sau ceruite, se păstrează la rece.

Se consumă la salate, sosuri sau diferite preparate culinare.

PĂRUL

PYRUS COMMUNIS L. (FAM. ROSACEAE)

Având ca origine Părul sălbatic, Părul de cultură are o veche istorie, fiind cultivat în special în Asia Centrală din vremuri străvechi.

S-a răspândit treptat spre vest, iar în Evul Mediu era deja prezent și în Europa.

Deși înrudit cu Mărul, digestibilitatea și valoarea terapeutică a perelor este mai redusă.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Infuzia din flori are proprietăți antiinflamatorii recomandate de asemenea în cistite.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Perele conțin, în funcție de soi, între 82-85% apă, hidrați de carbon (zaharuri — n.n.) 10-13%, protide 0,5%, dintre zaharuri — în special levuloză (8%), celuloză, pectine, tanin, săruri de Ca, Na, K, Fe, P și cantități mai mici de S, Cl, Zn, Fe, Cu, Mn, I, As.

Conținutul în vitamine este redus: cca 5 mg% vitamina C, vitamina A 50 mg%, vitamina B2 70 mg%, vitamina B6 0,25 mg% și vitamina PP în cantități reduse.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Acțiunea laxativă, similară cu cea a merelor cu coajă, este marcantă.

La fel ca și merele, perele au acțiune diuretică și urolitică, împiedicând depunerea uraților și favorizând eliminarea lor.

Pe această acțiune se bazează recomandarea curelor de pere în afecțiuni urinare, în litiaza urinară, precum și în reumatism, gută și artritis.

Tot datorită acțiunii diuretice, perele au acțiune depurativă, iar conținutul ridicat în levuloză le recomandă și diabeticilor.

Atât scoarța Părului cât și frunzele și florile sunt utilizate în medicina empirică.

Astfel, scoarța are proprietăți astringente, antidiareice (datorită taninurilor) și febrifuge.

Substanțele active pe care le conține scoarța au acțiune hemostatică locală, datorită tot taninurilor care precipită proteinele, contractă capilarele și diminuează secrețiile.

Frunzele, în special cele ale Părului sălbatic, au proprietăți antiseptice în cazul căilor urinare, similare cu cele ale Merișorului (*Vaccinium vitis-idaea*), fiind recomandate sub formă de infuzie în cistite, prostatită, infecții urinare.

Consumate ca atare (mai puțin recomandate însă celor cu digestia dificilă, cu tractul digestiv iritat, cu hemoroizi, din cauza celulelor pietroase sau sclereidelor din pulpă).

Suc, 2—3 pahare pe zi, înainte de mese.

Decoct din 40-50 g pere uscate („poame”) la un litru de apă.

Cidrul de pere are acțiune diuretică și ușor laxativă.

Observație. Frunzele de Păr, pe lângă taninuri, conțin arbutozid, la fel ca frunzele de Merișor.

Ele au proprietăți diuretice, dezinfectante, antiinflamatoare, ușor sedative, favorizând dizolvarea calculilor renali.

Prin creșterea diurezei, urina devine clară, iar micțiunile frecvente în prostatite se diminuează.

Frunzele de Păr sunt indicate ca adjuvant în cistite, în litiaza renală și în general în afecțiunile renale, vezicale și ale prostatei.

Se utilizează sub formă de infuzie preparată din 100 g frunze proaspete sau 25 g frunze uscate la 1 litru de apă.

Infuzia astfel obținută se bea în cursul unei zile.

În trecut, în medicina tradițională, scoarța de Păr era recomandată pentru proprietățile ei astringente și febrifuge.

GUTUIUL

CYDONIA OBLONGA MILL. (FAM. ROSACEAE)

Gutuiul, originar din insula Creta și Asia de Sud-Vest, era foarte răspândit în jurul anticului Sidon, oraș înfloritor al Feniciei, de la care, de altfel, își trage și denumirea genului (de la cuvântul grecesc Kydon, numele vechi al orașului de azi Canea de pe insula Creta, nume folosit și de Hippocrate).

În Grecia antică, gutuile erau considerate fructele zeiței Venus, tinerele căsătorite trebuind să guste din ele înainte de a păși pragul camerei nupțiale, pentru a pune căsnicia sub protecția frumoasei zeițe.

Gutuiul se cultiva cu 4000 ani în urmă.

Gutuiul are două varietăți: var. maliformis (Mill.) (C.K. Schneid.) și var. pyriformis (Kirchn.) și mai multe soiuri de cultură: Angers, Lescowatz, Constantinopol, Berețchi, „De Vrania”.

Se utilizează, în scopuri medicinale, atât pulpa cât și semințele.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Gutuile conțin 70-72% apă, 7-8% zaharuri, 0,5% protide, acizi organici, tanin, pectine, cantități mici de grăsimi, săruri minerale de Fe, Ca, P, K, Cu, Mg, S etc, vitaminele A, B, C și PP. Semințele conțin 20% substanțe mucilaginoase și amigdalină.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Grație taninului, pulpa fiructului are proprietăți astringente puternice, gutuile fiind indicate ca antidiareice, mai ales în diareile celor debilitați, ale convalescenților, copiilor și vârstnicilor, deoarece acțiunea taninului este atenuată de cea emolientă datorita mucilagiilor.

De asemenea, se recomandă ca antihemoragice în hemoptizii, hemoroizi, hemoragii uterine.

Ușoara lor aciditate le face utile în dispepsiile atonice (așa-zisul „stomac leneș”), iar în consum prelungit, în insuficiența hepatică.

Gutuile se recomandă și ca antivomitiv în vomisme cronice.

Semințele, puternic emoliente, sunt recomandate ca remediu pectoral în tuse, bronșită, răgușeală.

Extern.

Proprietățile astringente combinate cu cele emoliente justifică utilizarea lor sub formă de gargarisme în laringite, faringite, amigdalite, stomatite, în tratamentul hemoroizilor, eczemelor, arsurilor etc.

Semiințele sunt recomandate și ca adjuvante în calmarea iritațiilor pielii și ale sânilor, ca și în tratarea crăpăturilor mâinilor, a degerăturilor, în eczeme, arsuri, conjunctivite, hemoroizi inflamatorii. Cosmetică.

Semiințele de gutui se citează pentru hidratarea tenurilor uscate și curățarea celor pătate.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumul fructelor ca atare sau al unor produse obținute din acestea (suc, sirop, jeleu) și ca mâncare preparată sub formă de diferite feluri culinare.

Decoctul are o acțiune mai marcantă. Se prepară dintr-o gutuie mare, rasă, la 1 litru de apă; se lasă să fiarbă până ce lichidul se reduce la jumătate, cantitatea care se bea în cursul unei zile, îndulcită cu 50 g zahăr.

Acest decoct se utilizează și extern pentru gargarisme.

Infuzie pectorală din semiințe, o linguriță la o cană, câte două căni pe zi.

Macerat la rece din o linguriță de semiințe la o cană timp de 2-4 ore, pentru loțiuni sau comprese contra iritațiilor pielii și în cosmetică.

Observație. Frunzele, bogate în tanin, sunt foarte eficiente, ca antidiareice, sub formă de infuzie cu 1-2 lingurițe la o cană, bându-se 2 căni pe zi.

Împreună cu frunzele de Mur sau Zmeur și cu fructe de măceșe, se obține un ceai alimentar foarte plăcut la gust.

MOȘMONUL

MESPILUS GERMANICA L. (FAM. ROSACEAE)

Moșmonul este un arbust sau arbore de 1,5-3 m sau chiar mai înalt, cu frunze alterne, scurt pețiolate, alungit eliptice, lungi de 5-8 cm și late de 2.5-5 cm, cu marginea întreagă, fin dirijată spre vârf.

Florile sunt solidare, cu diametrul de 3-4 cm, având petale albe.

Fructele au receptaculul extern cărnos, asemănându-se cu cele de Măceș, dar mai mari (2-3 cm în diametru), cu sepale persistente și după maturizare.

Crește subsontan pe coaste înșorite, stâncării, tufișuri, de la șes până la munte.

Cultivat astăzi cu totul sporadic, Moșmonul a fost bine cunoscut în Antichitate, Iulius Cezar aducându-1 în Italia după vestita sa campanie din Galia.

La noi în țară este semnalat la Deva, Hunedoara, Craiova, Pitești, Iași etc.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Cu un procent mai scăzut în apă (70-74%), fructul conține substanțe azotate, grăsimi (0,44%), tanin (în fructele uscate până la 12%), mucilagii, acid citric, malic și tartric, vitaminele C și B, zaharuri, proteine, săruri minerale, celuloză etc.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Fructul, puternic astringent, are acțiune antidiareică, cu efecte chiar în diareea dizenterică și enteritele rebele, având dublu efect, respectiv stagnarea scaunelor diareice și fortificarea mucoasei intestinale. Are proprietăți diuretice, cu eliminarea de urați, fiind un adjuvant util în litiaza urică, gută și reumatism. Empiric, în tratamentul paludismului și litiazei renale, în special decoctul din rădăcină.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare sau în compot; pentru a avea efect, trebuie consumată circa o cană de compot. Sirop pentru regularizarea tranzitului intestinal, din 1 kg fructe, 800 g zahăr sau mai bine miere și 500 ml apă; se fierbe 1 oră, la foc mic. Se bea dimineața câte un pahar.

Observație. Frunzele, la rândul lor puternic astringente, se utilizează sub formă de decoct (2 linguri la o cană), pentru gargarisme și spălături bucale, în afte și inflamații ale gâtului.

GRUPA FRUCTELOR SÂMBUROASE

Este o grupă foarte omogenă, cuprinzând specii din familia Rosaceae, subfamilia Prunoideae, caracterizate prin fruct cărnos tip drupă, endocarpul lor fiind lemnos, alcătuit din sclereide (celule pietroase).

Acest endocarp constituie sâmburele care protejează în interior sămânța.

Din această grupă fac parte Prunul, Cireșul, Vișinul, Caisul, Piersicul și Migdalul, acesta din urmă constituind o excepție prin aceea că mezocarpul este pielos și nu cărnos ca la celelalte, iar la maturitate se desface.

Această grupă de fructe este mai răspândită în țara noastră, ocupând peste 60% din suprafața cultivată cu pomi fructiferi.

Prin conținutul lor în glucide (cca 15%), fructele sâmburoase au o ridicată valoare nutritivă, iar datorită conținutului ridicat în apă și potasiu sunt diuretice.

Celuloza și acizii organici le imprimă proprietăți laxative, iar prin sărurile minerale și vitamine — în special vitamina A și riboflavina (vitamina B2) — sunt mineralizante și vitaminizante. Consumate în stare proaspătă, dar mai ales sub formă de compoturi, dulceață, gem, marmeladă, în timpul iernii, ele constituie desertul ideal al fiecărei mese.

PRUNUL

PRUNUS DOMESTICA L (FAM. ROSACEAE)

Atât de puțin pretențiosul Prun, originar din Persia și Caucazul de Est, a fost adus în Europa de către romani. În țara noastră și-a găsit o a doua patrie, fiind pomul fructifer cu cea mai mare pondere.

Având valoare nutritivă ridicată, el are și proprietăți terapeutice recunoscute încă din Antichitate.

Pliniu cel Bătrân laudă proprietățile laxative ale Prunului, iar prunele uscate erau recomandate de diferiți autori din Grecia antică.

Mai târziu, aceste fructe se bucurau de mare faimă în prescripțiile Școlii din Salerno (sec. XI-XII), pătrunzând până în Farmacopeea Engleză, ca medicament, în secolul al XVIII-lea.

Jean-Baptiste Poquelin, cunoscut sub pseudonimul literar Moliere, face aluzie la prune într-una din operele sale, „Bolnavul închipuit” (1673).

La noi se cultivă peste 10 varietăți de Prun.

Aproape că nu există casă în mediul rural care să nu aibă un prun sau doi, majoritatea lor, însă, cultivându-se în livezi.

Pe lângă fructele gustoase pe care le dă, Prunul este și un bun fixator al solurilor în pantă, al terenurilor alunecoase, împiedicând spălarea coastelor și fenomenul de eroziune.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Prunele proaspete, coapte, conțin cca 80% apă, 14-15% hidrați de carbon, 0,6% protide, săruri minerale (Na, K, Ca, P, Fe, Mg, Mn), dintre care predomină potasiul (210 mg%), acizi organici, mucilagii, vitamiuele A, B1, B2 etc.

Valoarea nutritivă energetică a prunelor în stare proaspătă este de 58-62 kcal la 100 g pulpă, iar în stare uscată de 249 kcal.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Au proprietăți diuretice, stimulente ale sistemului nervos, laxative, decongestive hepatice și dezintoxicante.

Se recomandă în special în constipațiile cronice, atât proaspete cât și uscate, înmuiate în apă. Sunt un bun laxativ și pentru cei care suferă de hemoroizi, dar nu și de colită.

Ameliorează stările inflamatorii ale ficatului.

În medicina populară se recomandă și în inflamațiile splinei.

Cosmetică.

Se pot folosi sub formă de mască pentru tenurile grase, cu porii dilatați.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare, în special dimineața sau la începutul mesei (8-20 bucăți sunt suficiente pentru efectul laxativ).

Decoct din prune uscate:

În cazul inflamațiilor splinei se recomandă să se bea dimineața lichidul, iar fructele din decoct să se consume seara.

Infuzia obținută dintr-o prună și o smochină la 100 ml apă, administrată zilnic copiilor ușor irascibili.

Asocierea cu smochinele este benefică și în cazul constipațiilor, deoarece smochinele sunt emoliente și se evită iritarea tractului intestinal.

Se poate face o infuzie cu prune și smochine, lăsându-se apoi la macerat 10-12 ore.

Pentru combaterea constipației se recomandă maceratul obținut la rece din cca 200 g prune uscate (nu afumate), ținute în apă 3-4 ore. Se iau seara.

Suc de prune, câte un pahar înainte de mese.

Mască cosmetică astringentă cu 5-6 prune zdrobite care se lasă 20 minute pe față.

În etnoiatrie (medicina populară) se folosește țuica cu tărie alcoolică ridicată pentru „plămădeli”, respectiv pentru macerarea unor plante medicinale, o formă populară a tincturilor.

Se utilizează și intern, dar mai ales extern, pentru fricționări.

Intern nu se recomandă în ulcer și hepatite.

Observații.

Frunzele de Prun au și ele proprietăți diuretice și laxative ca și fructele, fiind în plus febrifuge și vermifuge (contra oxiurilor și limbricilor).

Se folosesc empiric sub formă de decoct (fierbere 10-15 minute), o lingură la cană.

CIREȘUL, VIȘINUL

CERASUS AVIUM (L) MNCH. (sinonim Prunus cerasus var. avium L. — Cireș);

C. VULGARIS MILL (sin. Prunus cerasus L — Vișin) (FAM. ROSACEAE)

Originare din Asia Mică.

Pliniu cel Bătrân afirmă că au fost aduse în Europa de către Luculus, vestitul gurmand al Romei antice, după victoria sa asupra lui Mitridate, regele Pontului.

Despre Cireș și Vișin există referiri și în operele lui Teofrast.

Cireșul are la noi 3 varietăți principale și peste 25 soiuri cultivate, iar Vișinul 2 subspecii, numeroase forme și peste 15 soiuri de cultură.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Cireșele și vișinele au până la 90% apă. Dintre zaharuri, conțin în special levuloză, ceea ce face posibilă folosirea lor și în alimentația diabeticilor (în special vișinele).

Sunt bogate în săruri de Na, K, Ca, P, Mg, Fe, conțin, de asemenea, clor, sulf și microelemente ca Zn, Cu, Mn, Co etc.

Sunt mai bogate în vitamina A și conțin mici cantități de vitamina B1, B2, niacin și vitamina C.

Cireșele dulci conțin 13-14% hidrați de carbon și au o valoare energetică de 57 kcal la 100 g fructe.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Ușor acide, sunt un adjuvant utilizat în colitele de fermentație.

De asemenea, se întrebuințează ca hipotensoare; prin aportul lor caloric redus, ca și prin efectul ușor laxativ, se recomandă în obezitate.

Acțiunea diuretică este destul de marcantă, însoțită de una de purificare a organismului de substanțele de dezasimilație („acțiune depurativă”), fiind recomandate în afecțiuni renale, inclusiv litiază, precum și în gută, reumatism, artrism, ateroscleroză (contracarând depunerea colesterolului).

Se mai recomandă consumul în litiază ca și în hepatitele cronice sau în sechelele de hepatită (deoarece ajută la regenerarea parenchimului hepatic), iar în gerontologie sunt considerate printre fructele cu efectele cele mai salutare în întârzierea fenomenelor de îmbătrânire.

Îndeosebi cireșele sunt sedative și tonice pentru sistemul nervos.

Extern.

Se folosesc sub formă de comprese, deoarece au ușoare proprietăți antimigrenoase.

Cosmetică.

Ușor astringente și tonice, redau elasticitatea pielii.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare, făcându-se cure în obezitate și artrism, consumându-se fie o anumită cantitate în fiecare zi, fie rezervându-li-se în exclusivitate o zi pe săptămână.

Suc — utilizat în special în hepatite.

Infuzie de cireșe uscate (1 lingură la o cană).

Aplicații de fructe zdrobite pe frunte, cu rol antimigrenos, precum și pe obraji și pe gât, pentru a reda elasticitatea pielii.

Observație.

Au proprietăți medicinale recunoscute pedunculii sau codițele („Stipites Cerasorum”); ele constituie un diuretic de bază al „farmaciei naturii” datorită conținutului de săruri de potasiu, flavonoide, taninuri, catechinice.

În medicina populară se mai folosește și cleiul scoarței, ca antitusiv.

MIGDALUL

PRUNUS DULCIS (MILL) D.A. WEBB. AMYGDALUS COMMUNIS L (FAM. ROSACEAE)

Migdalele reprezintă una dintre acele semințe la care proprietățile nutritive se împletesc cu cele terapeutice.

O romantică legendă din mitologia greacă povestește că frumoasa Phyllis a murit de durere deoarece a fost părăsită de către Demofon, fiul lui Teseu și a fost transformată într-un Migdal. Când infidelul, cuprins de remușcări a venit plângând, îmbrățișând pomul, acesta s-a acoperit într-o clipă cu acele tlori frumoase roz, pe care le cunoaștem.

Dar înainte de această legendă, Migdaiul era cunoscut în Siria, Persia, în Asia Centrală până în Turchestan, unde creștea spontan.

A fost maturizat sau s-a sălbăticit în China, India, în țările mediteraneene.

Este cultivat în Europa Centrală și în America.

Medicii și învățații Antichității (Teofrast, Porcius Cato, Columella și Scribonius Largus) au recomandat Migdalul în multe afecțiuni.

Medicii arabi îl recomandau tot ca medicament, pe baza unuia dintre preceptele lor care spunea că un medicament trebuie să fie plăcut la gust.

Numele Migdalului este pomenit și în Vechiul Testament.

În timpul celor patruzeci de ani de peregrinări, evreii s-au simțit descurajați și au vrut să se întoarcă din drum.

S-au plâns conducătorilor lor.

Moise, cel care îi călăuzea prin deșert, s-a rugat pentru îndrumare și a fost îndemnat de Dumnezeu să ceară fiecărei familii câte un toiag cu numele capului familiei cioplit pe el.

Pe toiagul casei lui Levi, Moise a scris numele fratelui său, Aaron.

Toate toiagele au fost aduse în cortul cel mare (numit tabernacol), iar a doua zi, când Moise a intrat acolo, toiagul lui Aaron încolțise.

Era plin de muguri, flori și migdale coapte.

În ebraica veche, cuvântul „migdajă” înseamnă „darul lui Dumnezeu”.

Migdalul este primul copac din Țara Sfântă care înflorește ca semn al vieții reînnoite și al deșteptării naturii.

Chiar și în zilele noastre, evreii mai aduc crengi cu muguri de migdal în sinagogă, la marile sărbători religioase.

În secolul al XI-lea Migdalul figura în lista speciilor cultivate în grădinile medicinale ale lui Carol cel Mare. În Evul Mediu și mai târziu, Migdalul reprezenta obiectul unui comerț activ.

De la Migdal se folosesc semințele (sâmburii), atât de la varietatea dulce, cât și de la cea amară. Numai varietatea dulce este comestibilă. Cea amară are însă proprietăți terapeutice.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Semințele proaspete conțin până la 88% apă, iar cele uscate numai 4,5%.

Ele conțin cca 18% protide, 54-55% grăsimi formate din 75% acid oleic, fermenți, 16% hidrați de carbon, acizi organici, săruri de potasiu (833 mg%), calciu (250 mg%), fosfor (455 mg%), fier (4,1 mg%), vitamina A (20 μg%), vitamina B1 (0,20 μg%), B2 (0,60 μg%), niacin (4,2 mg%) și cantități mici (1 mg%) vitamina C.

Conține și o enzimă (emulsina).

În continuare vom prezenta pe scurt rezultatele unor cercetări relativ recente, puțin cunoscute cititorilor, în legătură cu una dintre cele mai comune nitrilozide, anume amigdalina, care se găsește în semințele unor fructe, în special ale merelor, caiselor, cireșelor, migdalelor, prunelor, piersicilor, nectarinelor etc. Din fructele semințelor menționate s-au izolat compuși netoxici, hidrosolubili, care conțin nitrilozida sau vitamina B17.

Lipsa din alimentație a acestui factor poate duce la tulburări fiziologice și, datorită acestui fapt, a primit statutul de vitamină.

În procesele metabolice, nitrilozidul (amigdalina) este hidrolizat în hidrocianamidă, benzaldehidă sau acetonă și zahăr.

Hidrocianamida formată este detoxificată de către enzima rodanază în molecule de tiocianati netoxici. Benzaldehida formată în prezența oxigenului este oxidată imediat în acid benzoic, de asemenea netoxic. Înainte de-a considera posibila acțiune de modelare antineoplazică a vitaminei B17, trebuie să menționăm faptul că acidul benzoic este antiseptic și antiinflamator.

Nu de mult timp, în multe țări, pentru bolile reumatismale au fost utilizați produși de adiție orto-hidroxizi ai acidului benzoic.

După numeroase cercetări s-a ajuns la concluzia că prezența vitaminei B17 în alimentație calmează durerile reumatice și reduce temporal hipertensiunea.

În cazul în care considerăm boala canceroasă ca o dereglare metabolică, se pune întrebarea dacă una dintre cauze n-ar fi și deficiența în vitamine, în special în vitamina B17.

În această direcție sunt semnificative cercetările omului de știință american Dr. Dean Burk de la departamentul de citochimie al Institutului Național de Cancer din Washington, după părerea căruia vitamina B17 este o vitamină într-adevăr antineoplazică.

Considerăm totuși necesară o precizare: până în prezent nu există un medicament specific, sigur în boala canceroasă.

Această precizare o considerăm cu atât mai importantă cu cât în publicațiile săptămânale de nespecialitate se face reclamă unor „medicamente anticancerose” preparate din plante (Spânz, Mărul lupului — *Aristolochia* sp., Tătăneasă etc), care au produs grave intoxicații.

Plantele cu substanțe citotoxiceucid în primul rând celulele sănătoase sau somatice, iar apoi pe cele cancerose.

După ultimele cercetări, speciile menționate accelerează dezvoltarea celulelor cancerose, sunt nu numai citotoxice, dar și hepatotoxice, mutagene etc.

Cu toate controversele științifice, în prezent există produse autorizate pe bază de amigdalină sau vitamina B17.

Până vor ajunge și la noi aceste produse denumite Laetril sau Letril, putem beneficia în alimentația noastră de binefacerile amigdalinei.

Preventiv, doza zilnică de 250-500 mg se poate asigura din 6-8 sâmburi de migdale sau caise și din 20-25 sâmburi de cireșe sau mere.

Valoarea energetică este apreciată la 615 kcal la 100 g semințe uscate.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

În prezent, în terapeutică, migdalele joacă un rol mai important decât în trecut.

Rolul major rămâne în alimentație și în cosmetică, dar nu numai după cele relatate la subcapitolul „Principalii constituenți”.

Intern.

Migdalele se recomandă în ulcerul gastric și în gastrite hiperacide, deoarece, pe de o parte, uleiul gras formează o peliculă de protecție pe peretele stomacului, iar pe de altă parte, protidele tamponează acidul clorhidric, neutralizând aciditatea excesivă.

În același timp, migdalele reduc secreția de pepsină și stimulează peristaltismul intestinal.

Durerile și arsurile gastrice (senzația de „pirozis”) se reduc simțitor după consumarea semințelor de migdal.

Tot asupra aparatului digestiv au și o acțiune antiseptică intestinală remarcabilă, fiind astfel utilizate în colitele de fermentație.

Sunt, de asemenea, ușor laxative și anticatarale.

Datorită acțiunii antispasmodice și de calmare a tusei, ele constituie un foarte agreabil remediu pectoral, fiind indicate chiar și în tusea convulsivă.

Ca anticatarale, au efect favorabil în laringite.

Acțiunea anticatarală se manifestă și în inflamațiile aparatului genito-urinar; au și proprietăți antilitiazice.

Prin compoziția lor chimică foarte complexă sunt tonice și reconstituante generale (inclusiv ale sistemului nervos) și remineralizante, putând fi consumate ca adjuvante în tuberculoză.

Deoarece au un conținut redus de glucide, migdalele pot fi consumate de diabetici.

Extern.

Prin acțiunea emolientă și trofică asupra țesuturilor se recomandă în eczeme, arsuri sau crăpături ale pielii.

Cosmetică

„Laptele” de migdale constituie un preparat foarte indicat pentru catifetarea și hidratarea pielii.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Decoția pectorală din coajă cu 50 g la litrul de apă, fiartă 20 minute; se beau până la 4 căni pe zi, în mai multe reprize.

Sâmburi zdrobiți, câte 10-15 de 2 ori pe zi, folosiți ca preparat antiulceros.

Și mai eficace contra ulcerului este un amestec din 30 sâmburi de migdale dulci, o lingură lapte și o linguriță smântână (rețetă din medicina populară).

Sirop, care se prepară din 500 g sâmburi dulci, 150 g sâmburi amari, 125 ml apă și 750 g miere.

Acestea se freacă până se obține o pastă care se fierbe la baie de apă cu 1.5 litri apă rece și 2.5 kg zahăr.

Se poate aromatiza cu esență de portocale.

Se păstrează la frigider.

„Laptele” de migdale, întrebuințat în uz extern, inclusiv în cosmetică, se prepară din 100 g migdale lăsate în apă câteva ore, pentru a li se umfla pielea, care să poată fi apoi curățată.

Se zdrobesc cu puțină apă rece, se amestecă cu sirop din 100 g zahăr la 2 l apă și se utilizează, ca atare.

CAISUL

PRUNUS ARMENIACA L. ARMENIACA— VULGARIS LAM. (FAM. ROSACEAE)

Originar din China, Caisul are fructe foarte nutritive, parfumate, bogate în vitamine.

Proprietățile medicinale sunt reduse.

Are o mare arie de răspândire, începând din Asia Centrală până în nordul Chinei, din Manciuria până în Caucaz. Este cultivat în Europa și America.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Fructele proaspete conțin cca 85% apă, 0,8% protide, grăsimi, 10-13% levuloză și glucoză, un tip de carotenoide, săruri de Na, K (250 mg%), Ca, P, Fe, iar ca microelemente: cobalt, fier, brom, magneziu, vitamina A în cantități apreciabile (250 mg%), vitamina B1, B2, niacin și cca 8 mg% vitamina C.

Proaspete, au o valoare energetică de 49-50 kcal la 100 g fructe, iar în stare uscată de 306 kcal.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Recomandările terapeutice se bazează în special pe faptul că este un fruct foarte nutritiv, cu aport mare de vitamine și foarte digestibil.

Este recomandat pentru dispeptici, convalescenți, anemici (fiind un regenerador al țesuturilor, mai ales al celui nervos, îndeosebi în anemii consecutive datorate unor hemoragii).

Fiind și tonice nervine, caisele pot fi consumate prioritar în astenii, stări depresive, nevroze și insomnii.

Actiunea asupra tranzitului intestinal este paradoxală; astfel, în timp ce fructele proaspete sunt astringente, antidiareice, cele uscate sunt ușor laxative.

Cosmetică.

Caisele constituie un tonifiant al tenului normal.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare sau ca suc, compot, fructe uscate.

În cosmetică, măști cu caise zdrobite sau loțiunări cu suc.

PIERSICUL

PERSICA VULGARIS MILL (FAM. ROSACEAE)

Piersicul a fost adus în Imperiul Roman din Persia, de unde îi vine și denumirea latină, însă aceasta n-a fost decât o haltă pe drumul răspândirii sale, originea trebuind s-o căutăm în China, cu peste 4 milenii în urmă.

Fructele sunt foarte digestibile, însă proprietățile medicinale sunt modeste.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Proaspete, au 85-89% apă.

Fructele conțin numai 0,7% protide, 10% hidrați de carbon, acizi organici, săruri minerale: Na, K (200 mg%), Ca, P, Fe, I, vitamina A, B1, B2, niacină și cca 9 mg% vitamina C.

Uleiul volatil, obținut prin distilare, conține esteri, linalol și acizi: acetic, formic, caprilic, aldehide, cadinen etc.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Datorită digestibilității ridicate a pulpei, piersicile facilitează digestia, ușurând la maximum travaliul musculaturii aparatului digestiv, recomandându-se persoanelor în vârstă, debile, dispeptice.

Fierte sunt mai bine tolerate.

Stimulând secreția glandelor digestive, piersicile sunt stimulent stomahic.

Ele sunt și ușor laxative, însă mai accentuat diuretice și depurative, fiind recomandate în dieta celor cu litiază urinară, gută, reumatism.

Cosmetică.

Piersicile pot constitui și ele un remediu pentru curățirea tenului.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare, sub formă de suc și compot.

Măști cosmetice din frunze zdrobite.

Observații.

Importanță medicinală mult mai ridicată decât a fructelor o au frunzele și florile, care prezintă și avantajul unei arome foarte plăcute; ele sunt foarte ușor de suportat, îndeosebi de către copii. Din păcate, sunt prea puțin cunoscute și utilizate în prezent.

Ambele sunt un laxativ ușor, fiind complet neiritante în constipațiile celor mici.

Au, deasemenea, proprietăți diuretice, utile în nefrite.

Cu flori și frunze de piersic se poate face un dublu tratament contra oxiiurilor, intern sub formă de infuzie, extern — spălături sau cataplasme.

Florile au în plus proprietăți sedative, fiind foarte utile pentru copiii cu stări de nervozitate, precum și proprietăți antispastice, putându-se folosi pentru calmarea tusei spastice.

Se fac infuzii cu flori (se pot obține foarte ușor, strângându-le pe cele avortate, care se scutură abundant imediat după începerea înfloririi), frunze sau în amestec, cu 1-1 1/2 linguri la o cană de apă sau lapte; se iau 2-3 căni pe zi.

Pentru copii se recomandă și un sirop foarte parfumat din infuzie concentrată de flori și fructe (100 g la litru), cu o greutate egală de zahăr sau mai bine de miere; se fierbe pe foc mic până la consistența siropoasă. Se iau 20-30 g pe zi.

GRUPA ARBUȘTILOR ȘI PLANTELOR IERBOASE FRUCTIFERE

Reprezintă o grupare eterogenă din punct de vedere botanic, având ca elemente comune aspectul de arbust sau ierbaceu, precum și fructele (sau pseudofructele) cărnoase.

Din această categorie fac parte specii ale căror fructe, pe lângă valoarea lor nutritivă, au și o importanță terapeutică.

Dar nu numai fructele, ci și alte părți de plantă, în special frunzele, conțin substanțe active cu aplicabilitate în tratamentul unor afecțiuni metabolice.

Unele specii sunt considerate medicinale și fac obiectul unor cercetări fitoterapeutice chiar în zilele noastre.

În cadrul acestei grupe vor fi descrise: Coacăzul negru, Coacăzul roșu și Agrișul (Fam. Saxifragaceae), Măceșul, Porumbarul, Murul, Zmeurul, Fragul și Căpșunul (Fam. Rosaceae), Cătina (Fam. Elaeagnaceae), Afinul (Fam. Ericaceae) și Socul (Fam. Caprifoliaceae).

COACĂZUL NEGRU

RIBES NIGRUM L (FAM. SAXIFRAGACEAE)

Arbust montan, sporadic în flora spontană, dar cultivat din ce în ce mai mult în grădină sau pe suprafețe compacte, Coacăzul este cunoscut de mult pentru proprietățile terapeutice ale fructelor sale.

Așa se explică faptul că francezul Beaumont i-a închinat în anul 1757 un voluminos „Tratat despre coacăz”, în care scria: „Cu greu se pot găsi alte remedii cu efecte atât de marcante și pentru un număr atât de mare de boli precum Coacăzul”.

Cercetări recente i-au confirmat și fundamentat din punct de vedere fitochimic și farmacodinamic utilizările terapeutice.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Coacăzele negre conțin 87-88% apă.

Acizii organici specifici fructelor sunt până la 3%, iar protidele 1,3%.

Conțin 12% hidrați de carbon și săruri de Na (2 mg%), K (300 mg%), Ca (45 mg%), P (40 mg%), Fe (4,3 mg%), Zn (3,5 mg%), vitamina A, care se află în fructele coapte în proporție de 23 mg%, cantități mici de vitamina B1, B2, B6 și PP, vitamina C în cantități apreciabile (cca 200 mg%).

100 g fructe proaspete conțin 56 kcal, din care se resorb sub formă energetică 89%.

Coacăzele negre sunt bogate în pigmenți antocianici și flavonoide.

Fructele mai conțin taninuri, rutozid, antociani, betacaroten, microelemente etc.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Coacăzele au un conținut remarcabil în vitamina C (de circa 3-4 ori — mai mult decât lămâile).

În mod cu totul particular, deoarece această vitamină este foarte stabilă, probabil datorită unor inhibitori ai oxidazelor, coacăzele manifestă un efect tonic general, în special în mărirea rezistenței organismului la procesele infecțioase, de asemenea, în stimularea formării globulelor roșii, în creșterea ponderală, în creșterea oaselor la copii.

Prin toate acestea, fructele de Coacăz sunt foarte utile pentru cei doi poli ai vieții, fiind preconizate în alimentația copiilor ca și a vârstnicilor, adjuvante de preț pentru gerontologie.

Se recomandă și în perioada de convalescență.

Efectul tonic se manifestă și asupra sistemului nervos, constituind un remediu adjuvant în surmenajul intelectual, în astenie.

Datorită rutozidului solubil, ele joacă un rol important în prevenirea accidentelor vasculare.

Pigmenții antocianici duc la mărirea acuității vizuale, coacăzele fiind foarte utile pentru lucrătorii în subteran, aviatori, scafandri etc.

Diureza crescută produsă de coacăze este însoțită de o eliminare relaxantă de acid uric, recomandându-se pentru aceasta în afecțiuni renale și cu deosebire în litiaza urinară, precum și în gută și reumatism.

Proprietățile lor pectorale le fac utile în tuse de diverse etiologii, răgușeală, angină.

Faptul că sunt și sudorifice face din coacăze un remediu în afecțiuni febrile și în eliminarea toxinelor.

MOD DE ÎNTEBUINȚARE

Consumate ca fructe proaspete, ca atare, suc. Infuzie din fructe uscate, 1-2 lingurițe la o cană cu apă; se beau 2-3 căni pe zi.

Sirop (în special ca pectoral) din 250 g fructe la 1 l apă, fiert până scade la jumătate; se strecoară, se adaugă o cantitate egală de zahăr sau miere și se fierbe din nou până scade la jumătate. Se ia câte o linguriță la două ore.

Siropul de coacăze preparat din suc de coacăze negre obținut prin presare și suprasaturat cu zahăr sau miere se păstrează timp de un an, când nu pierde decât 15% din vitamina C.

După doi ani, pierderea vitaminei C este de 70%.

Cidrul de coacăze, câte 100 ml înainte de mesele principale. Nu se va administra la copii.

Observatii.

Frunzele de Coacăz conțin taninuri, rutozid, vitamina C, ulei volatil (0,26%) și sunt o materie primă medicinală importantă.

Ele constituie unul dintre remediile „farmaciei naturii” în hipertensiune și ateroscleroză, datorită acțiunii hipotensive.

Proprietățile diuretice sunt dublate de cele de eliminare masivă a acidului uric și uraților, fiind adjuvante importante în litiaza urică, reumatism, artrism.

Se recomandă cure de lungă durată, de până la 6 luni, sub formă de infuzii cu 2 lingurițe la cană, bându-se 3 căni pe zi, între mese.

În semințele de Coacăz negru se află unul dintre cei mai importanți acizi grași esențiali, acidul gama-linolenic (A.G.L.) în proporție de 19% din totalul de acizi grași.

Acizii grași esențiali scad presiunea sangvină, iar A.G.L. inhibă agregarea plachetară.

Efectul imediat următor: ridicarea nivelului prostaglandinelor din seria 1 formate din A.G.L., având ca urmare o dilatare vasculară periferică.

Cantități mici de A.G.L. au dat rezultate bune în tratamentul anginei, spasmelor vasculare, în afecțiunile coronariene și în tratarea sindromului Raynaud.

Printre potențialele utilizări clinice ale A.G.L. se numără în special următoarele afecțiuni: diabetul, tulburările ciclului menstrual, stările inflamatorii, răspunsurile sistemului imunitar, scleroza multiplă, alcoolismul, atopiile etc.

AGRIȘUL ȘI COACĂZUL ROȘU

RIBES UVA-CRISPA L. (R. GROSSULARIA L.)*

ET RIBES RUBRUM L. (FAM. SAXIFRAGACEAE)**

* în Franța, Agrișul se cultivă din sec. al XIII-lea. Este răspândit în Europa, Asia, Africa de Nord, în America de Nord și Centrală.

** Răspândit în Europa și Asia. În Europa, se cultivă aproape în toate țările.

Ambele specii se întâlnesc sporadic în flora spontană a țării noastre, în păduri, tufișuri, lacuri stâncoase, din regiunea de munte până în cea subalpină. Se cultivă sub numeroase forme și varietăți pentru fructele lor, care se consumă sub formă de compot, în special Agrișul, iar sub formă de dulceață, siropuri, marmeladă, Coacăzul roșu.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Fructele ambelor specii conțin între 88-93% apă.

Agrișele conțin 0,80% protide, 0,80% acizi malic, citric și tartric (cca 1,5%), substanțe grase (0,65%), zaharuri, celuloză, vitamina C (26—43 mg%), vitaminele A și B1, săruri de K, Ca, Fe, P, Mg, Zn, Cu.

Coacăzele roșii conțin 1.1% protide, acizi malic, citric și tartric (până la 2%), hidrați de carbon (9%), substanțe minerale sub formă de săruri de Na (1 mg%), K (230 mg%), Ca (30 mg%), P (25 mg%), Fe (0,1%), vitamina A (6 g%), mici cantități de vitamina B1 și B2 și cca 35 mg% vitamina C.

Consumate ca fructe proaspete, coacăzele roșii conțin 44 kcal energie la 100 g fructe, din care se resorb în organism 91 %, iar agrișele 43 kcal, din care se resorb 89%.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Fructele ambelor specii, fiind acide, luate înainte de masă sunt tonic-aperitive, iar după masă stomahice, în atonii digestive; sunt totodată ușor laxative și remineralizante. Ca și coacăzele negre, produc diureză cu eliminare de acid uric și urați, fiind recomandate în inflamații ale căilor urinare, litiaze, hidropizie, artrism, reumatism, gută. Fructele ambelor specii sunt „depurative” prin diureză. Se recomandă ca stimulent al funcției hepatice.

MOD DE ÎNTEBRUIȚARE

Consumate ca atare.

Suc 100-300 ml pe zi, în 3-4 reprize.

Agrișele, sub formă de compot, supe sau garnitură cu sosuri albe.

Coacăzele roșii, sub formă de dulceață și sirop, sunt recomandate pentru aportul de vitamine, în special iarna și primăvara.

CĂTINA ALBĂ

HIPPOPHAE RHAMNOIDES L. (FAM. ELAEAGNACEAE)

La sfârșitul verii și până toamna târziu, călătorul poate desluși pe povârnișurile Văii Prahova, Teleajenului și Trotușului, pe dealurile Buzăului și practic în tot lanțul subcarpatic, ba chiar și în Deltă, ciorchinii portocalii ai Cătinei, arbust țepos care are și proprietatea de a fixa terenurile în pantă. Datorită valorii deosebite a fructelor, acestea au făcut obiectul a numeroase cercetări originale românești și străine, Cătina fiind totodată introdusă în cultură și ameliorată în multe țări (USA, Germania etc.)

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Fructele de Cătină albă conțin 80-85% apă, zaharuri, în special monozaharide (0,05-0,50%), acizi organici (1,5-4,1%), pectină (0,14-0,50%), polifenoli și substanțe taninoase (1,80%), celuloză (0,90%), proteine (1,20%), ulei gras (8,0-12%), beta-caroten (3,5-10%), calciu (211,8 mg%), fosfor (194,4 mg%), magneziu (186,1 mg%), potasiu (165 mg%), sodiu — mult mai puțin (2,80 mg%), fier (13,84 mg%), vitamine liposolubile: A (până la 380 mg%), E (16 mg%), F (8 mg%), D (20 mg%); vitamine hidrosolubile, a căror cantitate variază în funcție de perioada recoltării fructelor (între 360-2.500 mg%): C, P, K și aproape toate vitaminele din complexul B.

Conține 18 amino-acizi, dintre care majoritatea esențiali.

Pe drept cuvânt, fructele proaspete și produsele liofilizate din Cătină pot fi considerate adevărate suplimente nutriționale, care conțin multivitamine, multiminerale și substanțe probiotice.

Uleiul de Cătină albă conține 8090%. acizi numeroși grași esențiali dintre care: oleic, linoleic, linolenic (în semințe), pantotenic, palmitoleic, heptadecanoic, erucic (în proporție de 1-1.5, chiar până la 3%).

Mai conține acizii: succinic, malic, maleic, ascorbic etc, alfa și beta caroten, licopen, criptoxantină, zeaxantină, fitofluină, kantophilă etc.

Frunzele și scoarța de Cătină albă conțin cantități apreciabile de ritosteroli și tocoferol.

Prin tehnologii speciale, cum este în țara noastră, cea practică de Hofigal, se pot obține din Cătină produse care conțin în cantități mari substanțe active, cu o stabilitate bună.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Fructele constituie în primul rând o polivitamină naturală, cu efecte în toate afecțiunile provocate de carența unor vitamine, dar și cu recomandări deosebite pentru convalescenți, în stări de slăbiciune, tonifiante pentru copii și persoane în vârstă.

Mai ales în anotimpul rece, când sursele de vitamina C sunt mai reduse, ceaiul de Cătină este foarte bine venit, putând fi folosit în fiecare zi ca un ceai alimentar, aceasta datorită savoarei deosebite a fructelor, iar băut rece, în timpul verii, are un efect răcoritor evident, tăind setea datorită gustului acrișor.

Foarte importante sunt efectele pe care le imprimă flavonele asupra aparatului circulator.

Acestea măresc forța de contracție a miocardului, probabil datorită unei mai bune circulații coronariene și îmbunătățirii generale a metabolismului.

Îndeosebi quercetina antrenează o vasoconstricție și o diminuare a permeabilității capilare, ceea ce explică efectele ei în tratarea maladiilor hemoragice, ca de ex. purporele.

Vasoconstricția este urmată de o vasodilatare la nivel renal, măbind diureza, fructele fiind utile în insuficiența renală și în edeme. Adăugându-se și efectul hipotensor, se ajunge la o acțiune complexă, tonifiantă asupra aparatului circulator, diferită de cea a digitalicelor sau a cofeinei, fiind utile în insuficiențe cardiace ușoare sau chiar în forme mai avansate, însoțind medicația de bază, ca antiagregant plachetar, antitumoral, antiinflamator, antioxidant, antispastic, coleretic, diuretic și antihipotensiv.

S-a preconizat, relativ recent, utilizarea produselor care conțin kamphaerol în tratamentele limfoamelor, radiculitei, fiind antagoniste serotoninei, inhibitor al creșterii tumorilor și trofice ale mucoasei uterine. În corelație cu compoziția chimică prezentată a Cătinei albe, fără a exagera putem spune că în special fructele și uleiul reprezintă nu numai o polivitamină naturală, dar și o sursă de microelemente și substanțe probiotice.

În opinia noastră, valențele terapeutice ale produselor pe bază de Cătină nu sunt decât oarecum „pe la mijloc” de-a fi complet elucidate și aplicate în fitoterapie.

Se mai citează efectele ceaiului de Cătină ca antidiareic, antireumatismal, dar în special „depurativ”, în urticării și în diferite dermatoze.

MOD DE INTREBUINȚARE

Infuzie din 1-2 lingurițe la o cană cu — apă, 2-3 căni pe zi.

Asocierea cu niăceșe este benefică, deoarece rezultă o infuzie care poate fi servită la micul dejun sau seara, ca un ceai alimentar cu efecte tonice și reconstituente utile.

Cidrul, care are o discretă aromă de ananas, se prepară din 200 g fructe deshidratate peste care se toarnă 5 litri de apă fiartă și răcită, adăugându-se 1,5 kg zahăr sau miere și 20-25 g drojdie.

Se lasă 15-20 zile într-un borcan acoperit cu tifon, agitându-se din timp în timp, după care se decantează și se trage la sticle.

Fiind totuși o băutură alcoolică, se va consuma cu moderație, iar administrarea ei la copii este exclusă.

Gem, marmeladă, compoturi din fructe proaspete.

Nu neglijați nici produsele fabricate de vechea și tânăra noastră industrie de produse naturale.

MĂCEȘUL

ROSA CANINA L. (FAM. ROSACEAE)

Spinosul Măceș este capul de serie al mării familii al Rosaceelor, chiar denumirea științifică venind tot de la o utilizare nededicată, însă cu totul neașteptată, „câșina” însemnând în latină „câșinesc”, aceasta pentru că în Antichitate se considera a fi un remediu eficace contra turbării!

Măceșele reprezintă din punct de vedere botanic fructe false, fructele adevărate fiind acele mici achene păroase din interior, cărora popular li se spune îndeobște „semințe”.

Cunoscute și utilizate încă din Antichitate, măceșele dețin câteva „recorduri absolute” în lumea fructelor. Astfel, ele conțin de 4-16 ori mai multă vitamină C, de pildă, decât citricele, adevărate „etalioane” în acest domeniu, iar față de alte fructe indigene raportul este și mai mare, întrecând de 80-100 de ori cireșele și vișinele, de cca 120 de ori piersicile și caisele și aproape de 200 de ori merele, perele, prunele și pepenii. În ceea ce privește vitamina A, măceșele, de asemenea, nu au egal, depășind de 2 ori caisele (considerate a fi cele mai bogate în această vitamină), de 10 ori afmele (și ele bogate) și de peste 20 de ori merele.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Pseudofructele de măceș conțin 0,20-0,80 g% vitamină C.

Unele specii sau variații de cultură conțin 2-5 g % vitamină C.

Ele conțin și acid dehidroascorbic, 2,50-6,50 mg % vitamină A și mici cantități de vitamină B1 și B2, vitamină P și vitamină K, acid nicotinic, acid citric și malic, zahăr invertit, taninuri, flavonoizi, ulei gras, ulei volatil și săruri minerale.

Semințele (de fapt, fructele) conțin vitamină E, ulei gras (cca 10%), ulei volatil, lecitină, zaharuri.

Cu privire la conținutul în vitamina C al pseudofructelor de Măceș din țara noastră, arbustul reprezentat prin cel puțin 45 de specii și peste 500 de varietăți și forme a constituit obiectul unui studiu desfășurat de-a lungul a cel puțin 6 ani.

Cu această ocazie, am descoperit specia „Campion mondiali” în ceea ce privește maximumul existent de vitamina C în natură.

Este vorba de specia *Rosapendulina* L. (sinonim cu *Rosa alpina* L.), care crește în tot lanțul Carpaților noștri la diferite altitudini, între 600-800 m până la 2000 m, în căldarea lezărului Mare a Cindrelului din Munții Cibinului.

În pulpa uscată a pseudofructelor de *Rosa pendulina* am găsit, prin diferite metode de analiză (indometrice, cu diclorindofenol etc), un conținut de 9 g % (9.000 mg%) de acid ascorbic.

Această descoperire a fost publicată în Comunicările Academiei Române (1956) și a fost recenziată în toate publicațiile de specialitate din Statele Unite ale Americii, din Germania etc.

Am propus introducerea în cultură a acestei specii în zonele submontane și montane ale țării.

Este suficient să menționăm că doar printr-o tehnologie simplă — uscare, în condiții adecvate, pulverizare și tabletare — se poate obține ușor cea mai bogată sursă de bioflavonoide, ceea ce este complet diferit de vitamina C sintetică pe care o înghițim zilnic.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Compoziția chimică explică convingător utilizarea principală a măceșelor ca un excelent tonic-vitaminizant, recomandat mai ales pentru convalescenți și copii, în cazurile de avitaminoze.

De fapt, intrând mai în profunzime, prin sistemul redox format din cuplul de acizi ascorbic și dehidroascorbic, ele contribuie la procesele intime de oxidoreducere și respirație celulară.

Datorită conținutului în vitamina P, măceșele au un rol în permeabilitatea și elasticitatea capilarelor, acționând pentru normalizarea circulației periferice, fiind utile, spre exemplu, în purpuri.

În ce privește aparatul digestiv, măceșele sunt indicate în stările iritative ale intestinului (catar intestinal), în colite și în afecțiuni hepatice.

Achenele, popular „semințele”, sunt un diuretic deosebit de eficace, recomandat în curele de lungă durată, deoarece nu sunt iritante.

După unii autori, efectul ar fi atât de marcant încât ar duce chiar la eliminarea calculilor renali.

Numai pulpa fructului este considerată un bun vermifug.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Infuzie sau decoctie scurtă, 2 linguri de pulpă mărunțită la jumătate litru de apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Este foarte utilă asocierea cu fructe de Cătină.

Pulpă mărunțită și amestecată cu miere în părți egale.

Se iau 2-3 lingurițe dimineața pe stomacul gol, în cure de 8-10 zile, ca vermifug. Sirop din 250 g pulpă de măceșe peste care se pun 1,5 litri apă în clocot, lăsându-se la macerat 12 ore, după care se filtrează și se adaugă 500 g zahăr. Se fierbe până ce capătă consistența specifică siropului.

Cidru din 500-600 g pulpă de măceșe care se pune la fermentat în 10 litri apă; se adaugă 2,8 kg zahăr, 2 lămâi rase (dacă se dorește un gust amar se poate adauga și coajă rasă), 30-40 g drojdie. Se ține la temperatura camerei 4-6 săptămâni într-un borcan acoperit, astfel încât să se poată degaja bioxidul de carbon rezultat din fermentație. În primele 2 săptămâni se amestecă la fiecare 2 zile, în caz contrar trecându-se la fermentație acetică („oțetire”).

La încheierea fermentației se lasă să se limpezească, apoi se trage cu furtunul în sticle. Maximum 2 pahărele de 100 ml pe zi pot constitui doza considerată medicinală, depășirea ei având desigur efecte inverse, ținând seama totuși că este o băutură hidroalcoolică.

Decoct diuretic din achene („semințe”), cu 1-2 lingurițe la o cană, putându-se bea până la 3-4 căni pe zi.

PORUMBARUL

PRUNUS SPINOSA L (FAM. ROSACEAE)

Primăvara, prin tufărișuri, pe coline sau în viroage, la marginea pădurilor, a căilor ferate, de la câmpie și până la munte, se întinde podoaba florilor arbuștilor de Poruhibar, purtând numele de Spinosa, din cauza ramurilor transformate în ghimpi puternici. Foarte rezistent la ger, este unul din puținele exemple în care florile apar înaintea frunzelor. Toamna ramurile se umplu de fructe cărnoase, sferice, negre-albăstrui, astringente, care se păstrează pe arbust și peste iarnă.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Florile de Porumbar conțin flavonoizi, acizi organici, quercitină, kempherol, săruri de potasiu și magneziu, numeroase microelemente și glicozide.

Fructele conțin zaharuri, acizi organici, antocianină, prunicianidină, polifenoli, gumi-rezine, taninuri, vitamina C, săruri de calciu și magneziu etc.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Porumbele sunt astringente puternice în diareea însoțită de dureri și spasme, simptome pe care medicamentele uzuale au tendința de a le agrava, precum și în colitele de fermentație.

Fructele au de asemenea proprietăți tonice stomahice, sedative, în diateze urice, datorită eliminării acidului uric (uremie, gută, artratism), precum și în dischinezii biliare.

Florile au acțiune laxativă și diuretică. Mustul proaspăt, datorită proprietăților antihemoragice conferite de bogăția de tanin, oprește sângerările nazale (epistaxis).

MOO DE ÎNTREBUINȚARE

Decoct din o lingură la o cană, 2 căni pe zi.

Suc — cu care se fac tamponări ale mucoasei nazale.

Sub formă de compot, sirop, gem, pastă. Se industrializează sub formă de marmeladă.

Observație.

Florile de Porumbar (Flores Pruni spinosi) sunt ușor laxative, sedative, diuretice, depurative, fiind recomandate în special copiilor cu iritabilitate crescută dublată de constipație, recomandându-se, de asemenea, și ca ușor hipotensiv, sub formă de infuzie cu 1, 1.5 lingurițe la cană, 2-3 căni pe zi.

ZMEURUL

RUBUS IDAEUS L. (FAM. ROSACEAE)

Arbust fin-ghimpos în partea inferioară, foarte mult întâlnit în flora spontană din țara noastră, îndeosebi în tăieturile de păduri din zona de deal și de munte, introdus sporadic și în cultură.

Zmeurul este cunoscut pentru proprietățile sale nutritive încă din timpurile palustre ale omului primitiv, lângă locuințele căruia s-au găsit mari cantități de semințe.

Este răspândit în zona subarctică și rece temperată din emisfera nordică (Europa, Asia, America de Nord). Se cultivă din secolul al XIV-lea, de când s-au obținut numeroase forme și varietăți cu fructe galbene, albe, negre sau roșu aprins, foarte mari, parfumat.

Astăzi se cunosc peste 40 de soiuri de cultură.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Fructele de Zmeur conțin 85-86% apă, 4,5-10 g% zaharuri, acizi organici (1-2,3 g%), pectine (0,5-2,8 g%), proteine (1,2 g%), potasiu (127 mg%), fosfor (45 mg%), calciu (27,3 mg%), magneziu (24 mg%), mangan (15 mg%), sodiu (3,5 mg%), zinc (3 mg%), cupru (1 mg%), fier (0,6 mg%), acid carbonic (25 mg%).

Conținutul în vitamine este: vitamina C (30 mg%), B1 (0,02 mg%), B2 (0,03 mg%), provitamina A, vitaminele D și P în cantități mici și substanțe tanante. Frunzele conțin cca 10% tanin, substanțe de natură flavonică, vitamina C (800 mg%), substanțe minerale și microelemente. Ca valoare energetică, 40 kcal la 100 g fructe.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Zmeura reprezintă un fruct tonic pentru astenici și copiii în creștere. În trecut era mult întrebuințată ca sirop în farmacii, pentru corectarea gusturilor neplăcute ale unor medicamente.

Ușor acide, cu proprietăți sudorifice, fructele sunt utile în afecțiuni febrile. Aciditatea ușoară le face să fie recomandate pentru dispeptici.

Zmeura este și ușor laxativă, precum și diuretică, cu eliminare de urați, adjuvantă în afecțiunile renale, reumatism, gută, astenie și afecțiuni cardiace, pulmonare și renale.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Sub formă de fructe crude.

Sirop din suc și o cantitate egală de zahăr; se fierb până la consistența dorită.

Siropul cu calități superioare și cu aromă plăcută, naturală, se prepară din suc proaspăt de zmeură obținut prin presare și suprasaturat cu zahăr sau mai bine cu miere (75%).

Se conservă bine și 2 ani.

Observații.

Frunzele au proprietăți medicinale recunoscute (Folium Rubi idaei), utilizate ca infuzie simplă sau în amestecuri, având proprietăți astringente și dezinfectante, recomandându-se în diaree, hiperaciditate (micșorând aciditatea gastrică) și în alte afecțiuni digestive.

MURUL

RUBUS FRUTICOSUS L (FAM. ROSACEAE)

Sub denumirea de Rubus Fruticosus L. în prezent sunt cunoscuți mai mulți taxoni, dintre care mai importanți sunt Rubus candicans Whe., Rubus sulcatus Vest, Rubus tomentosus Borkh.

Este un binecunoscut și răspândit arbust din regiunile deluroase, de la marginea pădurilor, rășișuri, până în zona superioară.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Murele conțin cca 84% apă, 1,2% protide, 1% acizi organici (izocitric, malic), 9% hidrați de carbon (zaharuri 3,48% până la 6%), săruri de Na (3%), K (190 mg%), Ca (30 mg%), Fe (0,9 mg%), vitamina A (45 mg%), cantități mici de vitamina B1 și B2 (0,04 mg%), niacină și vitamina C (25-40 mg%). Sub aspect energetic, murele au o valoare de 48 kcal la 100 g. Frunzele de Mur conțin taninuri, acizi organici (malic, lactoizocitric, succinic și oxalic), peptide, substanțe colorante, flavonoide, inozitol, vitamina C.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Datorită conținutului mai ridicat în tanin, cu calități astringente, murele sunt utilizate în diaree și răgușeală.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare, crude.

Sirop obținut dintr-un kg de suc (din fructe zdrobite și lăsate, pentru sucul lor, 24 de ore), la care se adaugă 900 g zahăr sau 1,2 kg miere; se fierbe până la consistența siropoasă.

Se utilizează și extern, în gargarisme.

Observații.

Frunzele de mur fac parte din nomenclatorul plantelor medicinale {Folium Rubi Fruticosi), cu efect tonic, dar mai ales astringent, atât pentru uz intern, cât și pentru uz extern.

Infuzia de frunze de Mur (o linguriță la cană) este indicată în gastroenterite, enterocolite, în congestiile de hemoroizi, menoragii, metroragii și în infecții pulmonare.

Pentru uzul extern se folosesc, tot sub formă de infuzie, 2 linguri frunze la 200 ml apă, în amigdalite și în angină, sub formă de gargară.

Mugurii și rădăcinile se folosesc mai rar, tot ca astringente.

FRAGUL ȘI CĂPȘUNUL

FRAGARIA VESCA L; FRAGARIA MOSCHATA DUCH (FAM. ROSACEAE)

Apreciat încă din Antichitate la romani, Fragul a fost studiat de marii medici-naturaliști ai secolelor XVII-XVIII, Lobelius și Boerhaave, care i-au atribuit proprietăți diuretice și litotropice, iar Linne, părintele sistematiei, care s-a vindecat cu ele de o gută rebelă, le-a denumit la rândul său „o binefacere dumnezeiască”.

Căpșunile au o compoziție chimică și proprietăți medicinale asemănătoare cu frăguțele de pădure.

Fraga și căpșuna nu sunt fructe propriu-zise, ele rezultând din îngroșarea receptaculului floral care devine cărnos și include numeroase achene mici numite nucule.

La noi, în nordul țării, există varietăți de căpșuni care dau 2 recolte pe an, primăvara și toamna.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Fraga și căpșuna conțin cca 89% apă. Conținutul în protide este relativ redus (0,8%), la fel ca și cel în hidrați de carbon (7%); în schimb, conținutul în săruri de potasiu este destul de ridicat (140 mg%), iar în fosfor este de 30 mg%. Sodiul este prezent în cantități mici (2 mg%), calciul 25 mg%, iar Fe 0,9 mg%; substanțele uleioase sunt în cantitate de 0,150 g%, iar acidul salicilic este prezent în mici cantități (0,01 g/kg), la fel ca și microelementele (sulf, siliciu, iod, brom). Conținutul în vitamina C este în proporție de 60-80 mg%. Fraga și căpșuna mai conțin vitaminele A1, B1, B2 (0,05 mg%). Între zaharuri predomină levuloza (cca 5%), ceea ce permite consumarea lor și de către diabetici.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Indicațiile vechilor medici și naturaliști și-au păstrat valabilitatea și astăzi, fragile și căpșunile fiind diuretice active, cu eliminare de acid uric; ele se recomandă în curele pentru afecțiunile renale (inclusiv litiaze), artratism, reumatism, cu un accent în plus pentru gută.

Efectul diuretic favorizează eliminarea toxinelor și le face utile în tratamentul eczemelor și al afecțiunilor dermatologice. Asupra aparatului digestiv, acțiunea este multiplă: ușor laxativă, de combatere a oxiurilor

și cu efect favorabil în afecțiunile hepatice, inclusiv în litiaza biliară. Proprietățile hipotensive le fac în același timp utile în ateroscleroză și, în plus, prin efectele lor diuretic-depurative contribuie la eliminarea excesului de colesterol.

Datorită bogăției în săruri minerale (cu deosebire de fier) ca și datorită valorii nutritive mari, se recomandă cașecticilor și, în tuberculoză, ca tonic și remineralizant. Fragile și căpșunile pot fi folosite și de către diabetici în cure de primăvară, până la 300 g zilnic.

Pentru nediabetici, se recomandă cure de căpșuni 1-2 kg/zi, timp de 7-14 zile, în special pentru cei care suferă de constipație cronică, reumatism articular, gută sau nefrite, litiază urinară și biliară.

Se vor evita de către indivizii care suferă de alergii la căpșuni și fragi, deoarece declanșează puternice reacții alergice însoțite de urticarie.

Se pare că alergiile la aceste fructe se datorează unei deficiențe a mucoasei intestinale care devine permeabilă pentru unele protide existente în pulpa pseudofructului.

Cosmetică.

Și căpșunile se numără printre fructele cele mai utilizate pentru măști de frumusețe, pentru diverse tenuri.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare, putându-se face cure cu 300-500 g până la 1,5 kg pe zi, de preferință dimineața. În cazul oxiziuriei se mănâncă 500 g dimineața pe stomacul gol, fără a se mai consuma altceva până la prânz.

Sirop.

Măști cosmetice cu căpșuni zdrobite, amestecate cu albuș de ou pentru tenul gras și cu smântână pentru tenul uscat. Lapte nutritiv din suc de căpșuni cu aceeași cantitate de lapte.

Observații.

Frunzele de Frag și de Căpșun fac parte și ele din nomenclatorul plantelor medicinale (Folium Fragariae). Frunzele conțin tanin elagic (12-15%), fragarol, cvercitrină, citrol, săruri minerale, zaharuri, urme de ulei volatil și vitamina C.

Ele reprezintă un produs antidiareic și diuretic foarte eficient, cu proprietăți dezinfectante ale căilor urinare.

Se utilizează sub formă de infuzie 1-2 lingurițe frunze uscate și mărunțite la 200 ml apă. Se beau 2-3 căni pe zi.

Împreună cu frunzele de Zmeur, constituie un bun ceai alimentar de fiecare zi.

AFINUL

VACCINIUM MYRTILLUS L. (FAM. ERICACEAE)

Arbust răspândit pe suprafețe întinse (afinișuri) în zona montană din țara noastră, introdus experimental și în cultură. La limita atât de apropiată între „medicament” și „aliment”, afinele reprezintă un bun exemplu, ele fiind și veritabile produse fitomedicinale (Fructus Myrtilli), cunoscute încă din Antichitate și, în același timp, și alimente.

Dioscoride este primul care le-a indicat contra dizenteriei, deși proprietățile lor antidiareice se cunoșteau cu mult timp înainte.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Fructele de Afin conțin cca 86% apă. Conținutul în protide este relativ redus (0,6%), iar acizii organici sunt în proporție de cca 1%, dintre care acidul citric cca 0,9%, iar acidul benzoic, tartric și malic între 0,05-0,15%. Conțin cca 13% hidrați de carbon, săruri de K (65 mg%), Ca (10 mg%), Na (1 mg%), P (10mg%) și Fe (0,7%), taninuri, pectine și pectoze, o substanță colorantă, mirtalina și antocianozide, care joacă rolul de vitamina P.

Conținutul în provitamina A este în jur de 20 mg%, în vitaminele B1 și B2 și în niacină între 0,02-0,04 mg% fiecare, iar vitamina C este clar reprezentată (cca 15 mg%).

Vitamina E există în cantități mici. Ca săruri minerale, conțin K (50 mg%), calciu (10 mg%), fosfor, sulf, magneziu, mangan, fier (1 mg%).

Puterea energetică a fructelor crude este de 60 kcal, din care se resorb 90%.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Datorită conținutului în taninuri și acizi organici — în special acidul benzoic, precum și datorită conținutului în substanțe antibacteriene, fructele proaspete sau uscate de Afin au un rol important în fitoterapia enterocolitelor, în dizenterie și în colibaciloză (sindrom entero-renal).

În fructe, taninurile sunt combinate cu substanțe colorate, care se scindează în intestin prin hidroliză sub acțiunea unor enzime. Taninurile astfel separate protejează mucoasele, iar substanțele colorante potențează acțiunea astringentă.

Mai mult, s-a demonstrat că extractul total de afine posedă remarcabile proprietăți bacteriostatice și bacteriolitice.

Prin această acțiune complexă, taninuri — substanțe colorante — substanțe fitoncide, dezvoltarea colibacililor (cauza diareei de fermentație) poate fi oprită într-o singură zi.

Fructele de Afin acționează și asupra bacilului lui Eberth și al lui Gaertner.

De menționat este și faptul că proprietățile bacteriostatice și bacteriolitice se mențin și după uscarea fructelor.

Un rol terapeutic important îl joacă glicozidele antocianice asupra aparatului circulator și în special asupra vederii, așa după cum au arătat cercetătorii francezi din Clermont-Ferrand, care au elaborat și un produs farmaceutic pe această bază.

Nu este de neglijat nici acțiunea antihelmintică a fructelor de Afin și în special în oxuriiază.

Fiind complet inofensive, se administrează în special copiilor, timp de 3 zile consecutiv, perioadă în care nu se consumă nici un alt aliment, cel mult 100 g lapte zilnic sau apă la cerere (în cazul tratamentului cu fructe uscate).

Atât asupra tubului digestiv cât și asupra aparatului respirator, afinele au o acțiune anticatarală, în diversele stări inflamatorii ale acestor aparate.

Protectoare ale pereților vasculari, afinele sunt utilizate în hemoragiile datorate fragilității pereților vasculari, purpuri, tulburări circulatorii (varice, arterite, sechele de flebită, afecțiuni coronariene, sechele de infarct), recomandându-se și în ateroscleroză.

În afecțiuni hepatice au rol de regenerare a celulei hepatice.

Afinele au, de asemenea, rol hipoglicemiant, fiind utile ca antidiabetice.

Extern.

Tot datorită conținutului mare în taninuri, afinele dau rezultate bune sub formă de gargarisme în faringite, stomatite, afte, candidoze bucale.

Tratamentul antihemoroidal intern se poate completa și cu spălături locale sau comprese cu decoct sau macerat la rece.

în fine, au și acțiune antieczematoasă.

Se recomandă și în tratamentele rănilor sângerânde.

MOD DE INTREBUINȚARE

Cură de afine 300-500 g zilnic sau 100 g uscate (în practica populară, uscate sau macerate în alcool, ca antidiareic).

Decoct din o linguriță de afine uscate la o cană sau macerat la rece din aceeași cantitate, timp de 8 ore, din care se beau 2 căni pe zi.

Pentru maturi, se poate folosi cidrul (slab alcoolic, din fermentare naturală) sau afinata, în cantități moderate.

Siropul preparat de preferabil cu miere.

Observații.

Frunzele sunt un produs medicinal reputat (Folium Myrtilli), fiind prezentate pe larg în lucrări de specialitate.

Conținând mirtilină, supranumită și „insulină vegetală”, sunt printre cele mai eficace adjuvante antidiabetice din „farmacia naturii”.

Ele sunt, ca și fructele, bune antidiareice.

SOCUL

SAMBUCUS NIGRA L (FAM. CAPRIFOLIACEAE)

Arbustul atât de comun din câmpie până în zona de munte, înflorind abundent de la sfârșitul lui mai până la mijlocul lui iunie, este o plantă cu proprietăți atât medicinale cât și alimentare, folosindu-se în scopuri medicinale în principal fructele și florile, într-o măsură mai redusă frunzele și scoarța, iar în scopuri alimentare fructele. În ultimii ani s-au făcut în zona Brașovului culturi experimentale, în scopul ameliorării fructelor.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Fructele coapte conțin 80-95% apă, rutozid, izocvercetină, antociani, aminoacizi, acizi organici: citric, chimic, malic, sichimic, taninuri, zaharuri (9,1%), vitamina C (65-120 mg%), vitamine din complexul B, vitamina A (300 |ig%), săruri minerale, în special potasiu (300 mg%).

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Fructele au în general aceleași proprietăți medicinale ca și florile, însă într-o măsură mai redusă.

Se consideră ca principală acțiunea sudorifică, sudorația — respectiv transpirația cutanată abundentă — având o influență pozitivă în numeroase afecțiuni, în primul rând în răceli, stări gripale, bronșite și stări febrile.

În aceeași măsură, fructele de Soc au efecte favorabile în reumatism, ca și în bolile eruptive, cum ar fi rujeola și scarlatina. În afara efectelor sudorifice, fructele de Soc au și o acțiune diuretică (de fapt, o componentă a efectului sudorific), ca și ușor laxativă, prin conjugarea tuturor acestora ele fiind recomandate în combaterea obezității. Se mai citează efectul galactogog, respectiv de mărire a secreției lactate, fiind deci utile în perioada de alăptare.

În uz intern, au o acțiune specifică, respectiv de combatere a hemoroizilor.

Dau rezultate bune și în tratamentul arsurilor.

Observații.

Fructele necoapte au un anumit grad de toxicitate, intoxicațiile manifestându-se prin vomă și diaree. În caz de intoxicații, bolnavului i se dau lapte și cărbune medicinal.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Decoct din o linguriță de fructe coapte, proaspete la o cană cu apă; după ce dă în clocot, se strivesc boabele și se adaugă zahăr.

Se beau 1-2 căni pe zi (decoctul se poate face și din fructe uscate).

Compot, dulceață, gem. Suc 50-100 mg/zi.

Cataplasme cu decoct concentrat (3050 g la un litru apă ca antiinflamator).

Din flori se prepară socata, băutură răcoritoare, analcoolică.

GRUPA FRUCTELOR USCATE

Grupa respectivă este eterogenă din punct de vedere botanic, fructele fiind diferite și din punct de vedere al structurii morfologice; caracterul comun este acela că de la acestea se consumă sâmburele, foarte concentrat în substanțe nutritive, cu conținut redus de apă.

Deși au valoare nutritivă mare, sub raport fitoterapeutic au importanță redusă.

Sunt bogate în săruri de potasiu, calciu, fier și fosfor și în vitaminele B1 și B2.

Din această grupă fac parte alunele, castanele comestibile și nucile. Arahidele vor fi tratate în capitolul plantelor exotice.

ALUNUL

CORYLUS AVELLANA L (FAM. BETULACEAE)

Arbust formând tufărișuri întinse, în poieni, păduri, de la câmpie până la etajul montan mijlociu.

Se cultivă numeroase varietăți cu fructele ameliorate. Lujerii tineri se folosesc pentru împletituri, iar lemnul este adecvat lucrărilor de strungărie. Mai există o specie de Alun, cunoscut sub denumirea de Alun Turcesc (*Corylus colurna*), din aceeași familie.

Este un arbust foios, spontan, megafanerofit până la mezofit, moderat termofil, întâlnit în special pe coaste înșorite calcaroase, bogate în humus. La noi se întâlnește în special în vestul Olteniei și în sudul Banatului.

Este răspândit în Peninsula Balcanică, Asia Mică, Caucaz, până în Himalaya. Fructele sunt mai mari decât la Alunul comun, ajungând până la 2 cm în diametru, lat elipsoidale, turtite, muchiate. Compoziția chimică este similară cu cea a Alunului comun (*Corylus avellana*).

La fel, recomandările terapeutice.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Alunele au un conținut redus de apă, cca 3,5%, în schimb sunt foarte bogate în ulei (62%). Conțin cca 14 g% protide, 13 g% hidrați de carbon, 635 mg% săruri de potasiu, 225 mg% calciu, 330 mg% fosfor, 3,8 mg% fier și numai 2 mg% sodiu și urme de cupru. Vitamina A se află în cantitate de 2 ug%, B1 0,04 mg%, B2 0,20 mg%, niacină 1,4 mg%, iar vitamina C numai 3 mg%.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

În primul rând, alunele au o valoare nutritivă foarte mare. Sub aspect energetic, 100 g alune au o valoare de 2890 kJ, ceea ce este echivalent cu 690 kcal, din care se resorb 89%. Acest fapt fundamentează recomandarea alunelor ca energizant la bolnavii de tuberculoză și la diabetici. Fără a se baza pe

experimentări științifice, unii autori consideră că alunele au proprietatea de a dizolva calculii renali. Uleiul de alune este considerat tenifug (favorizează eliminarea teniei). Alunele sunt recomandate tinerilor aflați în creștere, persoanelor anemice, femeilor în timpul gravidității, copiilor debili și persoanelor de vârsta a treia.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare sau măcinate în amestec cu miere. Uleiul, ca tenifug, câte o linguriță în fiecare dimineață, timp de 15 zile. Un aliment energetic natural pentru sportivi și alpinști se prepară din părți egale de alune, nuci, stafide și miere.

Observatii.

Frunzele de Alun (Folium Corylli) sunt considerate materie primă vegetală cu aplicabilitate terapeutică. Ele au proprietăți vasoconstrictive și tonifiante venoase, cu aplicații în tratamentul varicelor și edemelor la picioare.

Se utilizează sub formă de extract fluid în doze de 60-80 picături.

Sub formă de infuzie se recomandă extern în tratamentul plăgilor ulcerose varicoase.

CASTANUL DE CULTURĂ (comestibil)

CASTANEA SATIVA MILL. (FAM. FAGACEAE)

Specie mediteraneană care pe vremuri forma păduri întregi, la noi Castanul este întâlnit în zona Baia Mare, în depresiunile Tismana, Polovraci din Subcarpații Olteniei.

O interpretare romantică a originii numelui său botanic susține că o frumoasă nimfă din alaiul Dianei, Neea, cea castă (casta Neea), a căzut victimă pasiunii lui Jupiter care, urmărind-o cu asiduitate, a prins-o odată, când se depărtase de tovarășele ei. De disperare, aceasta s-a sinucis, iar Jupiter a transformat-o în Castan.

Longevitatea Castanului depășește 1000 ani.

Alimente foarte nutritive, castanele sunt totodată adjuvante în tratamentul unor afecțiuni.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Castanele fără coajă conțin cca 52%) apă, 2,6% ulei, 4%> proteine, cca 40% hidrați de carbon, săruri de potasiu în cantități apreciabile, fier, magneziu, mangan, cupru, zinc, cantități reduse de sodiu, calciu, vitaminele B1 și B2 și cantități destul de mari de vitamina C (cca 50 mg%>). Valoarea în kilocalorii este de 220 kcal la 100 g castane.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Bogate în tanin, castanele sunt un remediu pentru diareile benigne și dizenterie.

Ele sunt tonice stomahice, stimulând digestia, precum și antiseptice ale tubului digestiv.

Se recomandă în alimentația celor ce suferă de afecțiuni cardiovasculare și renale, datorită conținutului redus în sodiu. Castanele se recomandă, de asemenea, celor cu predispoziție la varice și hemoroizi.

Valoarea lor nutritivă le conferă proprietăți energizante și remineralizante în asteniile fizice și intelectuale.

Profesorul Heupke numește castanele „pânișoare naturale”.

Se recomandă în special copiilor și celor în vârstă.

Extern.

În medicina populară, decoctul de castane se folosește contra degerăturilor sub formă de băi locale sau cataplasme.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Decoct din 15-20 g la un litru, lăsându-se în clocot numai 2-5 minute, după care se lasă la infuzat încă un sfert de oră; se beau 2-3 căni pe zi.

Sub formă de pireu de castane coapte sau fierte, după masa de prânz și seara.

NUCUL

JUGLANS REGIA L. (FAM. JUGLANDACEAE)

Adus din Persia de către romani în primele secole ale erei noastre, ajuns simbol al vieții și al fecundității, Nucul a găsit condiții favorabile de dezvoltare în țara noastră. Nucile au o valoare biologică foarte ridicată — sub raport energetic, plastic, favorizând unele funcții metabolice.

Sunt recomandate în alimentația celor slăbiți, a convalescenților, dar și a omului sănătos.

Valoarea rriedicinală se considera în trecut că are învelișul cămos sau pericarpul (Pericarpus Nucis Juglandis), de ale cărui proprietăți terapeutice s-au ocupat în Antichitate Dioscoride, Pliniu cel Bătrân și Galen.

În prezent se folosesc în același scop terapeutic, validat științific, frunzele.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Nucile proaspete conțin cca 17% apă, iar cele uscate aproape deloc.

Conținutul în protide este destul de ridicat (15%), iar în grăsimi foarte ridicat (63%).

Hidrații de carbon sunt prezenți în proporție de 14%, sărurile de Na (4 mg%>), foarte bogate în K (545 mg%), Ca (70 mg%), P (430 mg%), Fe (2,1 mg%), vitamina A (4 mg%), B2 (0,10 g%), niacină (1 mg%), iar vitamina C 15 mg%.

Valoarea în kilocalorii este de 705, din care cantitatea de energie resorbită este de peste 90%.

Extractul de nuci conține și acid omega-3, indicat în afecțiuni inflamatorii și boli cardio-vasculare.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Cercetări mai recente asupra uleiului de nucă indică rolul acestuia în prevenirea aterosclerozei.

Pericarpul (coaja verde)* era utilizat ca tonic, stomahic, acționând și în stările catarale ale tubului digestiv.

* După ultimele cercetări, pericarpul (coaja verde) a fructelor, din cauza naftachinonei juglona, are proprietăți mutagenice și probabil carcinogene. Nu mai folosili. deci, dulceața de nuci verzi!

Contrar unor păreri generalizate, coaja verde de Nuc nu conține iod.

Colorarea pielii când se curăță nucile de pericarpul fructului se datorează juglonei și pigmentilor antocianici.

Prin conținutul ridicat în tanin, are proprietăți astringente care acționează atât în diareile rebeie, cât și în oprirea hemoragiilor, iar prin conținutul în vitamina C, este și antiscorbutic.

În afecțiunile renale se citează efectul adjuvant al pericarpului în litiază renală și enurezis (incontinență urinară).

Mai aparte sunt proprietățile diuretic-depurative ale pericarpului, fiind folosit de aceea ca antidot în intoxicațiile cu compuși de mercur, manifestate prin ulcerări ale pielii și ale ganglionilor.

Bune rezultate se obțin și în combaterea oxiurilor și limbriciilor.

În fine, se citează utilizarea în reumatism și gută.

Nu se mai utilizează intem.

Extern.

Sucul nucilor verzi poate fi utilizat pentru îndepărtarea negilor la copii, precum și pentru tratarea celor scrofuloși sau rahitici.

Băile cu coji de nucă se recomandă ca tonice.

Fiind astringente, atât nucile verzi cât și pericarpul se recomandă sub formă de gargară în amigdalite.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Extern.

Decoct preparat din 80-100 g la un litru, care se adaugă în apa de baie sau cu care se face gargară. Pentru îndepărtarea negilor, aceștia se freacă ușor cu suc de nucă verde de 3 ori pe zi, dar nu mai mult de 3-4 zile.

Observații.

Frunzele de Nuc (*Folium Juglandis*) reprezintă o materie primă cunoscută pentru proprietățile astringente, antidiareice și tonice, în scrofuloză și rahitism, precum și ca adjuvante antidiabetice.

Se mai recomandă în leucoree, precum și pentru combaterea transpirației. În uz extern, sub formă de gargară în stomatite și ca vulnerare.

Inflorescențele, și ele bogate în tanin, sunt antidiareice și antihemoragice.

Miezul nucilor asociat în părți egale cu miere este un aliment energetic aproape complet.

GRUPA FRUCTELOR EXOTICE

Este o grupă eterogenă în care sunt tratate fructele tropicale și mediteraneene cele mai comune din alimentația noastră.

Ele reprezintă o prețioasă sursă complementară de vitamine în perioada anotimpului rece.

Sunt cuprinse în acest capitol grupul hesperidelor (Lămâiul, Portocalul, Grape-fruitul, Mandarinul și altele), apoi Smochinul (deși izolat, este cultivat în părțile sudice ale țării noastre), Curmalul, Bananul, Măslinul, alunele de pământ (arahidele), cultivate și ele rar în țară.

Dintre acestea, lămâile și portocalele sunt cele mai mult utilizate, fie ca atare, fie sub diferite forme: sucuri proaspete sau conservate, limonadă sau oranjadă în cofetărie sau coaja în industria lichiorurilor.

LĂMÂIUL

CYTRUS LIMON BURM. (FAM. RUTACEAE)

Originar din India. cunoscut din cărțile vedice sub numele de „nimbuka”, Lămâiul a fost preluat de arabi care l-au botezat „limun”, găsindu-și o a doua patrie în partea sudică a Mediteranei, pătrunzând târziu în Europa, de vreme ce Ibn Bauthar nu îi citează într-o enumerare a plantelor cultivate în Spania. Se pare că în cultură a pătruns în Europa de-abia spre mijlocul secolului al XV-lea.

Gama recomandărilor sale terapeutice este de-a dreptul impresionantă, uneori chiar exagerată, atât pentru pulpa fructului, pentru suc, cât și pentru coajă, în uz intern și extern, în cosmetică, pentru prepararea uleiului esențial sau a acidului citric.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Lămâile conțin 86-88% apă.

Dintre acizii organici: acidul citric (6-8% în suc), acidul malic, citrat de calciu și de potasiu.

Conținutul în protide este redus (0,5%), la fel ca și cel în hidrați de carbon (5%).

Sărurile minerale sunt reprezentate prin cele de Na (2 mg%), K (95 mg%), Ca (7 mg%), P (10 mg%), Fe (0,3 mg%), iar sub formă de oligoelemente: Si, Mn, Cu etc.

Dintre vitamine, pe primul loc se situează vitamina C (40-50 mg la 100 g fructe), apoi vitaminele B1, B2, B3A, E și PP.

Uleiul volatil din coaja de lămâie este format din terpeni (limonen, pinene, camfen, felandren, sesquiterpeni etc), din linalil, acetat de linalil și geranil, citronelol, citral, aldehide etc.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

În trecutul îndepărtat, lipsa din alimentație a vitaminei C, în special din cea a marinarilor, provoca o boală cunoscută sub numele de scorbut. De aici și denumirea de „acid ascorbic” dată pentru vitamina C. Această vitamină joacă un rol important în vindecarea fracturilor prin fixarea calciului, în tulburări de circulație și în special în prevenirea fragilității capilarelor, în hemoragiile subcutanate și în hemoragiile gingiilor.

Carența în vitamina C duce la insuficiențe corticosuprenale, astfel încât consumul de lămâie mărește capacitatea de apărare a organismului în bolile infecțioase.

Bactericide, datorită uleiului volatil, lămâile pot fi utilizate în infecții digestive și respiratorii.

Efecte bune se obțin în tratarea afecțiunilor hepatice, atât în refacerea parenchimului hepatic (în hepatite și chiar în preciroză), ca și pentru calmarea crizelor acute hepatobiliare.

Contrar unor păreri răspândite că ar mări aciditatea (prin conținutul mare de acid citric și gustul său acid) și deci că ar fi contraindicată în hipoaciditate, ulcer gastric și duodenal, lămâia are o reacție bazică puternică, căci acidul citric este oxidat în cursul digestiei și prin reacțiile din tubul digestiv se ajunge la carbonat și bicarbonat de calciu.*

* De fapt, la citrat și bicarbonat de calciu.

Prin aceasta, sunt alcalinizante gastrice în gastrite hiperacide, ulcer gastric și duodenal.

Valoarea lămâilor nu constă numai în aportul de vitamină C, dar și în acidul citric care joacă un rol important în metabolismul celular, respectiv în ciclul lui Krebs.

Lămâile au multiple efecte și în afecțiunile aparatului circulator.

Tonice cardiace, ele sunt active în scleroza arterelor cărora le redau elasticitatea, ducând și la scăderea concentrației în colesterol; sunt deci indicate în ateroscleroză și hipercolesterolemie.

Destul de remarcabile sunt și proprietățile hipotensive.

În afecțiunile vasculare, în special în cele ce afectează membrele inferioare (varice, flebite), lămâile sunt un adjuvant util.

De asemenea, sunt antihemoragice îndeosebi în epistaxis (hemoragii nazale), hematurii, hemoragii digestive în care apar scaune cu melena.

Prin stimularea hematopoezei, acestea sunt antianemice, în același timp activând și funcția leucocitară. Diatezele urice (litiata urică, artrismul, guta, reumatismul) sunt printre afecțiunile care beneficiază cel mai mult de aportul lămâilor. Ducând la scăderea glicemiei, lămâile pot intra prioritar în regimul diabeticilor.

Ca remineralizante, ele se recomandă în special în tuberculoză.

Semințele sunt un vermifug eficace contra oxiurilor.

Mai puțin cunoscută este acțiunea antimigrenoasă a lămâilor; în schimb, cunoaștem cu toții efectul binefăcător al acestora în maladiile febrile. Numeroși autori o citează ca armă importantă contra obezității.

Extern.

Sucul este printre cele mai bune remedii în afte, angină, amigdalită, în special la copii, ba chiar și în otite, rinite, sinuzite.

Prin efectul lor antiseptic și cicatrizant, lămâile se pot utiliza în plăgi infectate, erupții și furuncule, acționând și în calmarea înțepăturilor de insecte.

Tamponarea negilor și herpesurilor cu suc de lămâie dă, de asemenea, rezultate pozitive.

Se citează și utilizarea lor în degerături. Cosmetică.

Astringența sucului îl face util pentru porii dilatați (spațiile intercelulare) și punctele negre care apar la tenurile grase.

Ca adaos în ultima apă de spălat pe păr, dă suplețe și strălucire părului.

Pentru cosmetica mâinilor, acestea se freacă cu felii de lămâie, care întăresc totodată unghiile casante.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare sau ca limonadă (mai ales în maladii febrile, ca răcoritor). Suc, în uz intern, până la 200 g/zi, consumat cu miere sau adăugat în salate, ciorbe etc, iar în uz extern utilizat într-o multitudine de forme; aplicații cu suc ca atare sau diluat, în arsuri și plăgi; tamponarea locului unde s-a produs înțeparea de insecte cu vată îmbibată în suc, procedeu recomandat și pentru oprirea hemoragiilor nazale; frecții ale porțiunilor cu degerături; picurarea câtorva picături în ureche (pentru otite), diluat 1:1 pe globul ocular (pentru blefarite) sau în narine, de mai multe ori pe zi, pentru rinită și sinuzită.

Contra migrenelor se ia o ceașcă de cafea în care se adaugă o felie de lămâie stoarsă; totodată se pun comprese cu felii de lămâie pe frunte.

Cura de lămâie se recomandă să se înceapă cu o lămâie pe zi, crescând zilnic consumul cu câte încă una, până se ajunge în ziua a zecea la 10 lămâi (sub diverse forme: limonadă, suc, în preparate culinare), apoi se descrește până se ajunge din nou la o lămâie pe zi.

Decoție, pentru calmarea crizelor hepatobiliare: o lămâie stoarsă se taie în bucăți mici și se fierbe în 300 ml apă, într-un vas acoperit, timp de 20 de minute.

Se strecoară, se îndulcește și se adaugă suc de stors.

Macerat la rece dintr-o lămâie zdrobită, cât mai bogată în sămburi (care să fie bine mărunțiți), timp de 2 ore, în apă cu miere. Se stoarce și se bea seara la culcare, fiind recomandat contra oxiurilor.

Tot ca vermifug, 2 lingurițe de sămburi zdrobiți și miere, pe stomacul gol în fiecare dimineață, timp de 5-6 zile.

Macerat la cald, dintr-o lămâie tăiată felii și 2-3 fiori de Mușețel, ce se lasă peste noapte într-o cană de apă; dimineața se strecoară și se bea.

O sursă bună de calciu natural este coaja bine spălată și fiartă, apoi pisată, care se lasă la macerat o săptămână în sucul de la două lămâi.

Se adaugă miere, după gust.

Se iau 3 lingurițe pe zi.

în afte, stomatite, amigdalite, fie tamponare cu o felie de lămâie, fie badijonări cu suc, fie se țin în gură cât mai multe felii de lămâie cu miere și apă.

Gargară cu suc diluat, în angine.

Oțet medicinal din coaja de la 2 lămâi macerate 8 zile în 200 ml oțet; se strecoară și se fac badijonări de 2 ori pe zi, contra negilor.

Mască în cosmetică pentru tenuri grase, din suc, la care se adaugă un albuș de ou bătut.

PORTOCALUL

CITRUS AURANTIUM L (FAM. RUTACEAE)

Arbore originar din China și India, adus în Europa în perioada cruciadelor și răspândit în special în zona mediteraneană.

La fel ca și Lămâiul, este o specie pretențioasă față de temperatură, sol și umiditate. Se dezvoltă bine chiar la temperaturi de +8-10°C, iar la înflorire are nevoie de +15, +18°C.

Îngheață la -7°C.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Portocalele conțin până la 90% apă.

Protidele sunt în cantitate mică, doar 0,7%, iar hidrații de carbon cca 9%. Sărurile de sodiu 2 mg%, cele de potasiu 130 mg%, de calciu 30 mg%, fosforul 15 mg%, iar fierul 0,4 mg%. Dintre vitamine, cantitatea cea mai mare este reprezentată de vitamina C (35-50 mg%), în timp ce vitamina A este de numai 11 mg%, vitamina B1 0,06 mg%, vitamina B2 0,03 mg%, iar niacinul 0,2 mg%.

Acizii organici sunt în proporție de 1,5-2,5 g%. Energia pe care o dau 100 g portocale fără coajă este de 39 kcâl, din care se utilizează 89%.

Necesarul zilnic de vitamina C este asigurat prin 100 ml suc proaspăt din pulpă de fruct.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Portocalele au multe recomandări comune cu lămâile. Având și ele un conținut destul de ridicat de vitamina C, măresc rezistența la boli infecțioase și sunt indicate în carențe de vitamina C și ca remineralizante.

Au proprietăți antihemoragice și de protector vascular în fragilitatea capilară, tromboze și vâscozitatea crescută a sângelui.

Se cunosc, de asemenea, proprietățile lor ușor diuretice și laxative.

Alte proprietăți comune cu ale lămâiului sunt cele de hepatoprotector, ușor coleretic-colagogene. În fitoterapia aparatului digestiv, portocalele sunt indicate în dispepsii și meteorism.

Portocalele au și efecte depurative. Coaja, la rândul ei, este tonică, stomahică.

Extern.

Efectul ușor astringent, cumulat cu cel antiseptic, fac ca portocalele să fie recomandate și în stomatite și gingivite, precum și în unele dermatoze și eczeme.

Cosmetică.

Se utilizează în întreținerea tenului, prevenind formarea ridurilor.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare.

Suc ca atare, iar în uz extern, tamponări în stomatite, gingivite, dermatoze. În scop laxativ, se fierbe coaja de la 2 portocale 30 de minute, apoi se aruncă apa.

Se fierbe din nou în apă îndulcită (cu 200 g la un litru).

Se lasă să se usuce pe o farfurioară și se consumă a doua zi dimineața.

Aplicații pe ten cu felii de portocale, 15-20 minute.

MANDARINUL

CITRUS NOBILIS. ANDR. (FAM. RUTACEAE)

Originar, de asemenea, din China, Mandarinul are fructe foarte asemănătoare cu Portocalul, ca gust și compoziție chimică.

Ca atare, și recomandările terapeutice sunt similare, în plus — datorită conținutului ridicat în brom — manifestă și proprietăți sedative.

GRAPE-FRUITUL

CITRUS PARADISII MACFAD. (FAM. RUTACEAE)

Bogat vitaminizante, fructele sale au recomandări comune cu ale lămâilor și portocalelor.

Datorită gustului amărui, grape-fruitul este un tonic amar, foarte util pentru copiii debili, cu lipsă de poftă de mâncare. Conține 0,5% protide, 4% acizi organici, 7% hidrați de carbon, 130 mg% săruri de potasiu, 14 mg%, calciu, 10 mg% fosfor, 0,2 mg% fier, 32-35 mg% vitamina C, 2 mg% vitamina A și cantități mici de vitamina B1 și B2 (0,02-0,05 mg%).

Energia calorică dată de acest fruct este redusă: 23 kcal, la 100 g pulpă.

ALTE FRUCTE ȘI SEMINȚE EXOTICE

ANANASUL

ANANAS SATIVUS SCHULT, ANANASSA SATIVA Lindl. (FAM. BROMELIACEAE)

Din această familie, numai Ananasul se bucură de un renume alimentar deosebit.

Originar din America tropicală, în prezent se cultivă în toate regiunile calde și în unele sere din zonele temperate.

Fructele de Ananas n-au fost cunoscute în Europa decât după redescoperirea Americii de către portughezi, care au introdus în cultură planta în India în 1594.

În secolul al XVIII-lea, un olandez a avut ideea să-1 cultive în sere și a reușit.

Se spune că olandezul a cultivat Ananasul în grădinile regale din Versailles în anul 1730, iar mai târziu, culturile au fost reluate în timpul lui Ludovic al XV-lea, inițiativa fiind urrriată în multe orașe mari din Europa.

Aceste culturi în sere reprezentau un lux, care a decăzut datorită extinderii culturilor în țările calde care, prin prețului redus al fructelor exportate, au eliminat culturile din serele europene.

Din punct de vedere botanic, Ananasul reprezintă o curiozitate: fructele rezultă în urma reunirii fructelor a numeroase flori situate pe aceeași branchiolă.

Fructul de Ananas conține 83-84% apă, 0,5% protide, cca 14% hidrați de carbon, 0,67% acizi organici, bromelină, două cisteine similare ca acțiune bromelinei, acid cinamic, beta-cumaric, ferulic, polizaride, pectine, vitamina C, fibre vegetale.

Nu conține grăsimi.

Valoarea în kilocalorii este de 62-100 g fruct.

După cum rezultă din compoziția chimică, fructele de Ananas sunt foarte bogate în apă, au un aport caloric redus și conțin foarte puține substanțe minerale și vitamine.

Totuși, ananasul este singurul fruct care conține un ferment de natură protidică, care are o remarcabilă proprietate de a disocia moleculele protidice din alimente (bromelina, enzimă proteolitică, comosaina și ananaina).

Astfel, acest fruct poate stimula digestia protidelor și, ca o consecință directă a acestui proces biochimic, este foarte util în dispepsii, pentru a combate atonia gastrică, achilia și anorexia.

Intr-o oarecare măsură, fructele de Ananas înlocuiesc sucurile gastrice.

Se va consuma după mesele principale.

Acțiunea biologică a sucului de Ananas este datorată în principal conținutului în bromelină și în compuși înrudiți.

Un studiu recent a raportat că această substanță (bromelina) are și acțiune antiinflamatoare, fibrinolitică, precum și proprietatea de-a înlătura leziunile cutanate.

De asemenea, s-a demonstrat că inhibă agregarea piastrinică și interferează replicarea crescută a celulelor maligne.

Rezumativ, principalele efecte terapeutice ale fructelor de Ananas sunt:

- Acțiune antiedematoasă și antiinflamatoare datorată bromelinei și complexului fitoterapeutic din pulpa fructului în edemele datorate albuminuriei, în edeme traumatice, edeme pulmonare, contuzii, rupturi de ligamente sau mușchi, în insuficiență venoasă etc.
- Acțiune favorabilă în celulite și obezitate. O reținere excesivă a sărurilor în țesuturile subcutanate contribuie la depozitarea lipidelor în țesuturile adipoase care contribuie la patogeneza celulitelor. O cură cu Ananas, care are și acțiune diuretică, elimină atât sărurile cât și apa în exces din țesuturile subcutanate.
- Acțiune benefică în răni și arsuri. S-a demonstrat clinic o îndepărtare a durerilor și o mai rapidă refacere a țesuturilor.

Considerăm necesar să subliniem faptul că numai sucul proaspăt de fructe de Ananas (obținut prin presare sau la mixer) are aceste proprietăți.

Enzimele din acest fruct sunt extrem de termolabile, iar sucurile sau compoturile conservate de Ananas, deși au un gust plăcut, nu au nici o valoare sub aspect dietoterapeutic.

În prezent există produse standardizate obținute prin liofilizare, sub formă de capsule operculate de 262 mg (titrate, la un conținut de 1,53% asparagozid, prin metoda cromatografiei de înaltă performanță), corespunzând la 4 mg de substanțe active.

Unul dintre aceste produse foarte bune este preparat în Laboratoarele Aboca din Italia.

Se administrează 4 capsule pe zi.

Se recomandă consumarea feliilor de ananas proaspete sau a sucului obținut imediat după presare. Se poate administra și sugarilor.

BANANIERUL

MUSA PARADISIACA L; MUSA SAPIENTUM L; MUSA SINENSIS SAJOT; MUSA FEHIBERTERO ETC. (FAM. MUSACEAE)

Este o plantă anuală cu creștere impresionantă. Are înălțimea de peste 30 m, iar frunzele ajung la lungimi care depășesc 2,5 m. Este o specie zigomorfă, florile masculine sunt de obicei situate în partea superioară a tulpinei, iar cele femele ceva mai jos. De fapt, acestea interesează, deoarece conțin în medie 20 de banane, a căror greutate poate ajunge până la 30 kg.

În cazuri excepționale, la varietățile de cultură, se înregistrează până la 250 fructe.

Deosebit de alte specii este faptul că, după rodire, planta moare.

Continuitatea speciei este asigurată de numeroșii lăstari bazali care se transplantează de către cultivatori. Iar în anul următor vor da noi plante viguroase, care vor rodi numai un an.

Nu vom intra în amănunte cu privire la cultura Bananierului, dar considerăm relevant faptul că într-un sol fertil producția de banane poate atinge 50-70 tone la hectar.

Este, deci, o cultură foarte rentabilă.

Este semnificativ faptul că, în ceea ce privește conținutul în glucide, fructele Bananierului înregistrează creșteri semnificative în timpul coacerii.

Astfel, dacă în primele două zile de la recoltarea fructelor mature, acestea conțin numai 2,31% glucide, în ziua a 8-a au 16,05%, iar în ziua a 12-a au un conținut de peste 18% glucide.

Aceste date demonstrează valoarea nutritivă a bananelor, amidonul din ele transformându-se în glucoză, levuloză și zaharoză.

Un kg de banane conține 350 g coajă, 650 g pulpă proaspătă, care conține, la rândul ei, 78 g apă, 250 g pulpă uscată, care la rândul ei conține cca 22% apă. În ceea ce privește conținutul în elemente minerale, în primul rând se plasează potasiul (0,850 g%), fosforul, sodiul, calciul, magneziul, iar ca microelemente, fierul și cuprul.

Pentru a înțelege mai bine valoarea nutritivă a bananelor și aportul lor în energie, mai prezentăm în continuare unele date analitice: o banană conține 23% apă, 4,97% protide, lipide și 67,04% glucide.

În ceea ce privește capacitatea în kilocalorii, 100 g de pulpă uscată au valoarea de 354.

Bananele proaspete au un conținut scăzut în vitamina C (1,218 mg%).

În concluzie, bananele nu pot fi considerate un aliment complet, din cauza conținutului redus în substanțe azotate și în substanțe grase, dar au un procentaj ridicat în amidon și în zaharuri, ceea ce explică folosirea lor ca aditiv important în alimentație.

În țările tropicale, bananele verzi, bogate în amidon, reprezintă alimentul de bază în preparatele culinare în locul cartofului care nu crește în aceste regiuni.

Dacă facem o comparație între cartofi și bananele alimentare, apelând la statistică, vom obține următoarele cifre:

- bananele conțin 75,3% apă;
- cartofii conțin 84,6% apă;

- bananele conțin 1,3% protide;
- cartofii conțin 0,4% protide;
- bananele conțin 0,6% lipide;
- cartofii conțin 0,5% lipide;
- bananele conțin 22% glucide;
- cartofii conțin 14,2% glucide.

Deci, valoarea nutritivă și energetică a bananelor este superioară celei a cartofilor.

Din punct de vedere fitoterapeutic, vom prezenta în primul rând concluziile medicilor indieni cu privire la această specie: cenușa din întreaga plantă este considerată ca antiacid, fiind recomandată în calmarea durerilor abdominale, în primul rând pentru a potoli senzația de sete în holeră; este recomandată și în combaterea crizelor de ulcer și ca antihelmintic.

Planta este recomandată în disfuncții de natură nervoasă, cum ar fi isteria și epilepsia, în diaree și dizenterie, ca antidot în intoxicațiile cu opiu, iar ca purgativ, în combinație cu iaurtul, în părți egale, câte o uncie (23,3 g) din fiecare.

Extern, se aplică ca stiptic în diverse răni.

Extractul apos preparat din lăstari se aplică sub formă de cataplasme în arsuri și ulcerații.

Rădăcina plantei este considerată ca tonică, coleretică și antiscorbutică, iar sucule rezultat din presarea rădăcinii se recomandă în retențiile urinare (anurie), iar în combinație cu iaurtul și cu zahărul în părți egale, în tratamentul gonoreii sau al altor boli venerice.

Sucule obținut prin presarea florilor se recomandă în dismenoree și menoragii.

În diabet se recomandă introducerea în alimentație a florilor fierte.

Fructele Bananierului sunt considerate ca antiscorbutice, afrodisiace, diuretice și laxative.

Dorim să facem o precizare pentru cei interesați: bananele verzi, necoapte sunt hipoglicemizante, în timp ce bananele coapte sunt hiperglicemizante.

Deci, utilizarea lor în alimentația zilnică trebuie făcută cu discernământ.

MANGO

MANGIFERA INDICA L (FAM. ANACARDIACEAE)

În țările de origine (ecuatoriale și tropicale) se cultivă în prezent peste 300 de varietăți pentru fructele gustoase, mult apreciate atât pe plan local, cât și pentru export.

Greutatea fructelor se situează între 200-500 g, dar sunt varietăți care ating până la 2 kg.

Cele mai apreciate fructe provin de la speciile *Mangifera elephantiana* Lour și *Mangifera siamensis* Lour. În India, Malaezia, Indochina și alte țări și zone, arborele de Mango este considerat și ca plantă medicinală.

Frunzele fragede sunt recomandate în diaree și diabet.

Infuzia de frunze și scoarța ramurilor este astringentă, fiind folosită ca apă de gură în stomatite și paradontoză.

Datorită conținutului ridicat în taninuri, scoarța are o acțiune benefică asupra mucoaselor; se recomandă în menoragii, în tricomonază și în secrețiile muco-purulente uterine și intestinale, în dizenterie, ca hemostatic, în general, în afecțiuni cutanate, difterie etc.

Fructele necoapte sunt bogate în acizi organici și vitamina C și sunt recomandate ca antiscorbutice (în unele țări avitaminoza C mai reprezintă încă o problemă), diuretice, laxative, în cura de slăbire.

Coaja coaptă a fructului imatur se recomandă amestecată cu zahăr în menoragii și dizenterie.

Semințele decorticate conțin o mare cantitate de acid galic, un astringent prețios în dizenteriiile cronice, în diaree, hemoroizi, tricomonază vaginală, menoragii, hemoragii de natură diferită etc. Din păcate, noi beneficiem foarte puțin de proprietățile și valoarea nutritivă a fructelor de Mango.

RODIA

PUNICA GRANATUM L. (FAM. PUNICACEAE)

Arbust originar din Persia și Mesopotamia, introdus în Europa de cartaginezi, se cultivă în toate regiunile mediteraneene.

La noi se cultivă pe alocuri, în special ca arbust ornamental, datorită florilor abundente, mari, frumoase, de culoare roșie. Rezistă bine și în timpul iernii, în special în sudul țării: Băile Herculane, București și în Dobrogea la Techirghiol.

Crește spontan la Buziaș.

În trecut se utiliza foarte mult ca plantă medicinală, folosindu-se scoarța de pe rădăcini sau de pe ramuri, în combaterea paraziților intestinali, acționând în special asupra teniei (*Taenia serrata*), ascarizilor și ankylostomelor.

În medicina tradițională indiană, pe lângă folosirea pentru efectele tenifuge, se utilizează și în prezent ca febrifug, în leucoree și în hemoragii pasagere.

Bobocii floralii se utilizează în gonoree, tricomonază, în diaree cronice, în dizenterie (în special la copii), în bronșită etc.

Sub formă de pudră fină sau infuzie, se recomandă în tratamentul paraziților intestinali din genul *Stringylus*, *Strongyloides*.

Acțiunea antihelmintică se justifică prin prezența în scoarța rădăcinii a alcaloizilor 1 — peletierina, d — peletierina, un derivat al tropioninei numit pseudo-peletierină.

Mai conține tanin elagic, acid betulinic, fridelină, betasitosterol, oxalat de calciu, minerale.

Fructele sunt comestibile și nu conțin alcaloizi, ci zaharuri, acid citric, acid malic, vitamina C, tanin etc. Nu au proprietăți tenifuge, deoarece nici fructul și nici coaja fructului nu conțin derivați ai peletierinei, care sunt contraindicați la cei care suferă de nevroze, la femeile gravide și la copii.

Se consumă ca atare, sunt dulci-acrișoare, răcoritoare și se utilizează în special la prepararea șerbetului și a siropurilor.

Tot din medicina tradițională indiană este de reținut indicația utilizării semințelor pisate și amestecate cu lapte pentru dizolvarea calculilor și a nisipului, din rinichi (de altă natură decât cea oxalică), în special la femeile gravide care suferă de această afecțiune.

SMOCHINUL

FICUS CARICA L (FAM. MORACEAE)

Smochinul este bine cunoscut și apreciat încă din Antichitate. Egiptenii îl considerau medicament, Biblia îl evocă adesea și este pomenit și de Horațiu.

În sudul și în vestul țării s-au făcut încercări reușite de introducere a Smochinului în cultură.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Fructele proaspete coapte conțin până la 84% apă, iar cele uscate aproape deloc.

Conținutul în protide este de 3,5%, foarte ridicat în hidrați de carbon — zahăr invertit (61%), la fel ca și în potasiu (840 mg%).

Sodiul se află în fruct în proporție de 40 mg%, calciul 190 mg%, fosforul 105 mg%, iar fierul 3,3 mg%.

Vitamina A este 10 u.g (micrograme)%, B1 0,10 mg%, B2 0,10 mg%, niacină 1,1 mg%.

Conține mici cantități de vitamina C, magneziu și brom.

Sub aspect energetic, smochinele uscate conțin 260 kcal, din care se resorb peste 90%.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Proprietățile pectorale sunt dominante, fructul fiind un emolient și expectorant recomandat în bronșite, laringite, traheite, pneumonii.

Fiind emoliente, smochinele au o acțiune utilă și în alte tipuri de cataruri, de pildă în cel intestinal și urinar.

Au, de asemenea, proprietăți laxative și diuretice.

Extern.

Tot prin proprietățile emoliente se explică și recomandarea lor în stomatite, gingivite, inflamații ale gâtului.

De asemenea, sunt utile în abcese dentare, furuncule.

Pentru zonele de la noi unde cresc exemplare de Smochin, sucul lăptos al smochinelor verzi este activ în combaterea negilor și bățăturilor.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare, fiind recomandate în special sportivilor, copiilor și celor vârstnici.

Decoct expectorant cu 2-3 fructe la cană, 2 căni pe zi. Sirop, din 500 g la un litru de apă.

Se fierbe pe baia de apă până se reduce la jumătate.

Se strecoară și se adaugă 250 g miere. Se ia câte o linguriță de 2-3 ori pe zi.

În vechime, latexul fructelor imature de Smochin servea la prepararea brânzeturilor și la frăgezirea cărnii.

Aplicații cu rol maturativ al furunculelor, de favorizare a colectării puroiului („coacere”) — smochine calde sau cataplasme din fructe fierte în apă sau lapte.

Aplicații repetate (de 3 ori pe zi, timp de 5-6 zile) pe negi și bățături cu suc obținut din fructele tinere.

Observații.

Frunzele de smochin au și ele unele întrebuințări terapeutice ca expectorant, în tulburări circulatorii și sunt emenagoge (reglarea ciclurilor) sub formă de infuzie 20-30 g la litru.

Ramurile tinere, sub formă de decoct (cca 2 linguri de rămurele tăiate mărunț la 250 ml apă), constituie un bun laxativ și diuretic, care se poate da și la copii.

CURMALUL

PHOENIX DACTYUFERA L (FAM. PALMAE)

Palmier exotic cu port arborescent, răspândit în zona tropicală, subtropicală sau chiar mediteraneană (Algeria, Tunisia). Curmalele — fructele Palmierului — au fost numite „hrana pământului”. În Valea Iordanului erau atât de răspândite, încât Ierihonul era cunoscut drept „cetatea palmierilor” (Deuteronom 34:3).

Simbol al speranței și al supraviețuirii (vezi chiar denumirea sa latinească — Phoenix dactylifera), Palmierul roditor de curmale este menționat și într-unul din psalmii lui David (Vechiul Testament): „Dreptii vor odrăsli ca Finicul (palmierul, n.n.) (...). Sădiți în casa Domnului, ei vor da mlădițe (...). Chiar și la bătrânețe, ei vor avea rod.” (Psalmul 92: 13-15).

Legenda spune că Sfântul Cristofor a folosit un toiag din lemn de Palmier când l-a condus pe pruncul Iisus peste râul năvalnic. Iisus i-a spus să-și înfigă toiagul în pământ, iar din acesta a crescut un Palmier, miracol care a dus la convertirea lui Cristofor.

La intrarea în Ierusalim, Iisus a fost întâmpinat de popor cu frunze de Palmier, ca semn al iubirii și al renașterii spirituale. Se mai povestește că îngerii le aduceau ramuri de palmieri martirilor creștini, pentru a le conduce sufletele spre cer.

Chiar și azi, frunzele de Palmier sunt folosite la marile praznice, atât la evrei, la sărbătoarea Tabemacolelor, cât și la creștini, în Duminica Floriilor și la Paști.

La noi se cultivă în sere sau ca plantă ornamentală de apartament.

Se cunosc mai mult de 200 de varietăți.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Apă 24-33%, protide 2%, hidrați de carbon cca 50%, săruri minerale, derivați cumarinici, vitamine: A, D, B1, B2.

Conținutul în fier este de 4-5 mg%, iar în magneziu de 63 mg%.

Valoarea nutritivă este exprimată în 350 kcal la 100 g fructe uscate.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Curmalele au proprietăți pectorale și emoliente apreciabile, favorizând expectorația, tonic-nervine și musculare. Sunt recomandate în perioada de creștere, în sarcină și după bolile infecțioase.

Dau rezultate bune în astenie fizică și intelectuală și în anemie.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare.

Infuzie din 50 g la un litru de apă, bându-se 2-3 căni pe zi.

Observații.

Sâmburii de Curmal se pun la germinat în ghivece și se udă din când în când.

Germinează după 3-4 luni și se obțin palmieri ornamentali pentru interior.

MĂSLINUL

OLBA EUROPAEA L (FAM. OLEACEAE)

Cu silueta sa de o noblețe aparte și cu un aspect deosebit de decorativ, Măslinul este un simbol al păcii și al înțelepciunii, bucurându-se de un adevărat cult din partea locuitorilor anticei Eliade.

El poate fi considerat totodată un simbol al altruismului și al grijii față de generațiile următoare, căci, datorită longevității sale, ca și faptului că fructifică tardiv, cel ce 1-a plantat se bucură mai puțin de roadele lui decât urmașii.

Importanță terapeutică are îndeosebi uleiul de măsline.

Măslinul este cultivat în regiunea mediteraneană, în Asia de Vest, în America Centrală și de Sud, în Africa de Sud și în Australia.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Măslinile proaspete conțin până la 75% apă, iar cele uscate aproape deloc. Protidele sunt în proporție de 0,17-1% în măslinele crude, iar în cele uscate până la 3%. În măslinele verzi, cantitatea de grăsimi (ulei) este de 15%, iar în cele mature, uscate este de 58%. Conțin între 1-3,6% celuloză, în funcție de stadiul de maturitate. Sunt bogate în săruri minerale, potasiu (până la 1 g%), calciu, fier, cupru, magneziu, sulf, fosfor, mangan etc. Sunt prezente vitaminele: A, B1, B2, C și E (8 mg%).

Valoarea calorică este, pentru 100 g măsline, de 224 kcal, iar pentru ulei 900 kcal.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Uleiul de măsline, obținut prin presare la rece, este în primul rând nutritiv, dar este util ca adjuvant în afecțiuni hepatice, cu deosebire în dischineziile biliare, deoarece are un efect colagog.

Este, de asemenea, util în insuficiență hepatică, în colici hepatice, precum și pentru eliminarea calculilor biliari.

Având proprietăți emoliente și formând o peliculă protectoare la suprafața tubului digestiv, este utilizat în stări iritative sau cataruri stomacale și intestinale.

Pentru că această peliculă împiedică absorbția la nivelul intestinului, se recomandă și ca antidot contra unor otrăvuri.

În doze moderate, se manifestă ca un foarte bun laxativ, fără a produce colici.

I se mai citează și efecte antihelmintice.

Extern.

În amestec cu albuș de ou, este un remediu contra arsurilor.

Uleiul de măsline calmează imediat durerile și ajută la cicatrizare.

Dă bune rezultate în masaje ale gingiilor în parodontoză.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Administrare ca atare, câte o lingură de supă dimineața devreme, eventual în amestec cu suc de legume sau fructe și, dacă este posibil, să se stea în repaus, culcat pe partea dreaptă, 15-20 minute, în afecțiuni hepatice, sau doze de 20-40 g pentru efectul laxativ și în aceleași doze ca antihelmintic.

Pentru tratarea arsurilor, uleiul de măsline se amestecă cu albuș de ou și se unge locul afectat.

Pentru tratarea parodontozei se masează gingiile după badijonări cu tinctură de Propolis sau decocturi de plante care au un conținut bogat în taninuri (coajă de Stejar, Salcie, Nuc etc), cu ulei de măsline de 2-3 ori pe zi.

În furunculoze se fac cataplasme cu măsline coapte, pisate, aplicate local, pentru a accelera maturația.

ARAHIDELE

ARACHIS HYPOGAEA L. (FAM. LEGUMINOSAE)

Specie erbacee originară din America de Sud, cu o maturare foarte apăsătoare a fructului, care își pleacă pedunculul, astfel încât ultima fază a coacerii se produce în sol, de unde și denumirea de „alune de pământ”.

În prezent se cultivă în Asia, India, China, Africa, America de Nord și de Sud, în Europa (Italia, Spania, Grecia etc).

Fructele fiind extrem de nutritive, se fac încercări de introducere în cultură și la noi în țară.

Proprietățile medicinale sunt moderate.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conțin apă 3,5-6,5%, protide 24-30% și grăsimi 45-52%.

Hidrații de carbon sunt în proporție de 18%.

Aceste componente principale le conferă importante proprietăți energetice: 650 kcal la 100 g arahide.

Ele mai conțin: sodiu 6 mg%, potasiu 780 mg%, calciu 65%, fosfor 410 mg%, fier 2,3 mg%.

Uleiul de arahide conține peste 15% acizi grași nesaturați.

Alunele de pământ conțin și vitaminele B1 (0,25 mg%), B2 (0,14 mg%) și niacină (14,3 mg%).

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Foarte nutritive, alunele de pământ constituie un remediu util în astenii și surmenaj.

Prin conținutul extrem de ridicat al uleiului în acizi grași nesaturați, ele sunt importante în scăderea colesterolului și, prin aceasta, și în ateroscleroză.

Datorită conținutului în tanin, sunt antidiareice.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare, după o ușoară prăjire.

După o prăjire prea avansată, uleiul se transformă în acroleină — substanță foarte nocivă în special pentru ficat (hepatotoxică, carcinogenă).

Preferabil este să se consume neprăjite.

SUSANUL

SESANUM INDICUM L. (FAM. PEDALIACEAE)

Este o plantă anuală erbacee, mult cultivată în regiunile tropicale și mediteraneene.

Este menționată în scrierile lui Herodot, Teofrast și Pliniu cel Bătrân.

Începând din anul 1956 s-au făcut încercări și la noi de introducere în culturi, dar în prezent semințele de Susan provin în mare parte din import.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Semințele conțin substanțe grase (48-65%), substanțe proteice (24%), substanțe extractive neazotate (14,18%), vitaminele B, D, E, F.

Uleiul este format din glicerid-esteri ai acizilor oleic, linoleic, palmitic, stearic, arahinic, linoceric, fitosterine, alcooli superiori, compuși nesaponificabili, sezamol și sezamolin. (C. Pârvu, 1997).

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Se folosește la garnisirea produselor de patiserie și simigerie.

Intră în procesul de fabricare a indigoului și penicilinei.

Din uleiul de Susan se fabrică cele mai fine săpunuri.

Din plantă se extrag substanțe odorante parfumate, iar din funingine tușuri fine.

În țările de origine, această specie are numeroase utilizări medicinale.

Deoarece frunzele, datorită substanțelor mucilaginoase pe care le conțin, sunt emoliente, se folosesc în afecțiunile respiratorii, în colera infantilă, în diaree și dizenterie, în amenoree și dismenoree, în cataruri, cistite etc.

Semințele sunt emoliente, laxative și diuretice.

Se folosesc în constipații cronice și în hemoroizi.

Uleiul din semințe are proprietăți demulgente și emenagoge și este folosit în special în dizenterie și în afecțiuni ale căilor urinare.

Se folosește în doze mici, 2-3 g, în doze mai mari fiind avortiv.

Uleiul se mai folosește sub formă de fricțiuni în migrene și amețeli (vertij), în special combinat cu uleiuri esențiale (de conifere, Eucalypt, Levănțică, Mentă).

VIȚA DE VIE

VITIS VINIFERA L (FAM. VITACEAE)

Plantă cu mare răspândire și importanță nutrițională.

Se clasifică aparte datorită biologiei ei specifice.

Vița de vie, simbol al bucuriei, prezentă în atâtea practici cultice înfășurând toiagul lui Bachus, a fost cunoscută din vechime și pe meleagurile noastre, unde a găsit cele mai bune condiții.

Se spune, nu știm cu cât temei istoric, că în vremea strămoșilor noștri geto-daci, s-a luat măsura stârpirii viței de vie, produsele ei abundente influențând în rău vitejia luptătorilor.

„Eu sunt vinul cel adevărat”, a spus Iisus, a cărui primă minune a fost preschimbarea apei în vin.

La Cina cea de Taină, El a fost cel care a spus că vinul va simboliza Sângele Său, instituind astfel sacramentul vinului.

În parabola Bunului Samaritean, vinul este menționat direct ca fiind aliment tămăduitor: „i-a legat rănilor, turnând pe ele untdelemn și vin”. (Luca, 10:34)

Licoarea strugurilor este deseori pomenită în textele Scripturii: „Fost-am lovit, dar nu m-a durut, bătut am fost, dar n-am simțit nimic. Când mă voi scula din somn, voi cere iarăși vin.” (Pildele lui Solomon, 23:35).

Însuși Apostolul Pavel îl sfătuiește pe Timotei în Epistola întâi: „Nu bea numai apă, ci folosește-te de puțin vin: pentru stomacul tău și pentru deseale tale slăbiciuni.” (Epistola I a Sfântului Apostol Pavel către Timotei, 5:23).

Erau astfel recunoscute proprietățile sale stimulative, în doze mici: „Vinul care înveselește inima omului și untul de lemn care face să strălucească fața lui.” (Psalmul 104:15).

Sau, dimpotrivă, sedative, dacă este folosit în cantități mari: „Dați băutură îmbătătoare celui gata să piară și celui cu sufletul amărât, ca să bea și să uite sărăcia lui și să nu-și mai aducă aminte de chinul lui.” (Pildele lui Solomon, 31:6-7).

Se poate afirma că, și din punct de vedere fitoterapeutic, Vița de vie are o importanță deosebită.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conținutul în apă al pulpei de strugure este de 72-73%, zaharuri fermentescibile 22%, acid tartric liber 0,29%, alți acizi organici 0,30-0,35%, protide 0,7%, hidrați de carbon 16%, sodiu 2 mg%, potasiu 255 mg%, calciu 20 mg%, fosfor 25 mg%, fier 0,5 mg%, vitamina A 5 mg%, vitamina B1 0,05 mg%, vitamina B2 0,03 mg%, niacină 0,2 mg%, vitamina C 3 mg%, taninuri (în pieleț) 1,2%. Valoarea energetică a 100 g struguri este de 70 kcal, din care se resorb în organism 90%.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Strugurii au un rol deosebit asupra aparatului digestiv, atribuindu-li-se proprietăți tonic-aperitive, stomahice, fiind utili în dispepsii, atonii gastrointestinale. Efectul lor este de asemenea binefăcător și în hepatite sau chiar în ascitele consecutive unor hepatite, deoarece au totodată și proprietăți coleretic-colagoge.

Proprietățile diuretice și depurative marcante fac din struguri un adjuvant de preț în afecțiunile renale (inclusiv litiaze), în bolile de piele, artrism, reumatism și gută.

Asupra aparatului cardiovascular au o acțiune hipotensoare și de scădere a colesterolului în colesterolemie și ateroscleroză.

Pentru influența favorabilă asupra metabolismului, se recomandă în obezitate și avitaminoze.

Mai sunt și variații în funcție de sol și varietăți.

Astfel, strugurii mai acizi de pe soluri reci, argiloase, mai improprie pentru vița de vie, sunt laxativi sau chiar purgativi, pe când la cei crescuți pe soluri calcaroase predomină proprietățile diuretice și depurative.

După varietate, cei albi sunt stimulenți, cei negri sunt astringenți datorită taninului și în mod deosebit tonici. Sucul de aguridă are proprietăți diuretice marcante, combate obezitatea, iar diluat cu apă dă o băutură revigoratoare.

Strugurii stafidiți au proprietăți pectorale, calmând tusea.

Extern.

Turtele rezultate de la pasarea strugurilor se pot utiliza pentru atenuarea durerilor de gută, reumatism, sciatică. Cosmetică. Mustul reprezintă un remediu util pentru întreținerea tenului.

Cu totul aparte este indicația privind „camuflarea” încăruntării părului.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumați ca atare (în obezitate 2 zile pe săptămână doar 1,2 kg struguri zilnic).

Cura de must (importantă pentru efectul diuretic, depurativ și antisclerotic): se începe cu 0,5 litri zilnic, în 3 reprize, cu o oră înainte de mese, apoi se crește progresiv până se ajunge, după cca 2 săptămâni, la 2 litri zilnic, cantitate care se menține astfel 2-3 zile fără a se mai consuma altceva.

După acest nivel maxim se revine apoi la cantitatea inițială de care se profită cât mai țin strugurii.

Cataplasme cu turte rămase de la presarea strugurilor.

Loționări cu o cârpă curată îmbibată în suc, se lasă 10 minute pe ten, apoi se șterge cu apă caldă cu un praf de bicarbonat de sodiu.

Pentru „mascarea” încărunțirii, se fierb 4 g sulfat de fier în 250 ml vin roșu.

Se piaptână părul cu pieptănul umectat în această soluție câteva minute pe zi, timp de 15-20 de zile, apoi se continuă de 2 ori pe săptămână.

Observații.

Fmzele sunt foarte astringente și prin aceasta utile în diarei cronice, hemoragii, sângerări la nivelul mucoasei nazale, alterări ale pereților venoși (varice, hemoroizi).

În cură de lungă durată, frunzele de Viță de vie se citează a fi utile în celulită, obezitate.

Cele cu nuanțe roșietice se recomandă în combaterea hemoragiilor uterine și ca fortifiant.

Se folosesc sub formă de decoct, din 2 linguri la o cană de apă, bându-se 3 cani pe zi: prima dimineața devreme, celelalte 2 înainte de mese.

La rândul său, seva abundentă de primăvara, numită atât de romantic „plânsul Viței de vie”, este un produs util în spălături oculare, în conjunctivite și alte stări iritative oculare, fiind considerată totodată tonică, cicatrizantă și antihemoragică.

Litiază renală și litiază biliară sunt influențate, de asemenea, favorabil.

În uz extern, este antiseptică și cicatrizantă a rănilor.

CAP.5 PRINCIPALELE LEGUME, SEMINTE ȘI CEREALE DIN ALIMENTAȚIE

GRUPA LEGUMELOR DE LA CARE SE CONSUMĂ RĂDĂCINILE TUBERIZATE

Reprezintă o grupare eterogenă din punct de vedere botanic, majoritatea plantelor făcând parte din familia Umbelliferae (Morcovul, Pătrunjelul, Păstârnacul, Țelina)*, celelalte reprezentând familia Cruciferae (Ridichea și Hreanul) și Chenopodiaceae (Sfecla roșie).

* De la Pătrunjel și Țelină se consumă curent și frunzele, ele urmând a fi tratate și în subcapitolul în care se descriu legumele de la care se folosesc frunzele.

Toate aceste plante au comun faptul că sunt bienale (exceptând ridichile de vară care sunt anuale), formând în primul an o rădăcină pivotantă, iar în anul al doilea o rădăcină tuberizată, prin dezvoltarea intensă a unui parenchim de depozit.

Substanțele de rezervă care se depun la acel nivel conferă rădăcinilor tuberizate importante proprietăți nutritive.

În același timp, datorită conținutului în substanțe active, enzime, vitamine, săruri minerale și microelemente, precum și în uleiuri volatile, legumele din această grupă au și o valoare terapeutică remarcabilă, în special Morcovul, Pătrunjelul, Țelina, Hreanul și Ridichile de iarnă pot fi considerate, în sensul larg al cuvântului, drept plante medicinale.

HREANUL

AP.MORACIA LAPATHIFOLIA GILIB. Sin. Armoracia rusticana (LAM) G.M. Sch. (FAM. BRASSICACEAE CRUCIFERAE)

Nu degeaba Hreanul ocupă un loc important în galeria plantelor medicinale analizate în opera sa de flamandul Oodoens, unul din marii medici și naturaliști ai Renașterii.

De altfel, până de curând, era considerat numai ca plantă medicinală, calitate în care este menționat încă de Pliniu cel Bătrân, fiind inserat în unele farmacopei.

Ierburile amare de la Cina cea de Taină sunt simbolizate, uneori, de Paști, de un singur aliment: hreanul. Se utilizează rădăcinile, care au proprietăți stimulente.

Între excitant, stimulent și iritant este însă numai un pas, mai mare sau mai raic, în funcție de concentrație și subiect.

Depășind dozele moderate sau medii, se ajunge la efecte nedorite, iritații ale parenchimului rinichilor, ale mucoasei gastro-intestinale și ale sistemului nervos.

Hreanul este contraindicat pentru cei suferinzi de hemoroizi, hemoptizie, dereglări de ritm cardiac, stări congestive.

În măsură mai redusă se utilizează și frunzele, un bun conservant natural pentru murături.

Rădăcina de Hrean conține cca 2% protide, 8% hidrați de carbon, săruri minerale de sodiu 5 mg%, potasiu 295 mg%, calciu 55 mg%, fosfor 35 mg%, fier 0,7 mg%, vitamina A 2 mg%, B1 0,05 mg%, niacină 0,3 mg% și 100 mg% vitamina C.

Pe lângă aceste substanțe comune multor fructe și legume, Hreanul mai conține glicozizi sulfurați, mirozina — o enzimă care se eliberează prin raderea rădăcinii, formând mirozinat de potasiu.

Mai conține cantități mici de ulei volatil și acizii clorhidric, sulfuric, carbonic, silicic, precum și substanțe antibiotice.

Valoarea energetică este exprimată în 40 kcal la 100 g hrean proaspăt.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Dacă importanța sa ca antiscorbutic este astăzi cu totul secundară — scorbutul aparținând trecutului - în schimb înțelegem principalele sale proprietăți terapeutice tot prin prisma efectelor sale excitante asupra mucoaselor.

Astfel, intensificând secrețiile salivare și gastrice, este util ca tonic aperitiv și stimulent gastric în anemii, lipsă de poftă de mâncare, gastrite hipoacide, acționând favorabil și ca antidiareic.

Datorită excitației generalizate și asupra parenchimului renal, se explică și efectul diuretic marcant, util în hidropizie, gută, reumatism (completat și cu terapie de uz extern), considerându-se chiar a avea și efect antilitiazic.

Nu se recomandă în afecțiuni renale acute.

În terapia aparatului respirator, Hreanul este utilizat în catar cronic respirator, astm, bronșită.

Foarte interesantă este recomandarea sa, inspirată din medicina tradițională, ca adjuvant în afecțiuni cardiace: cardiopatie ischemică dureroasă, angină pectorală și hipertensiune arterială.

Ca antiparazitar, Hreanul are o acțiune tenifugă remarcabilă.

Extern.

Utilizarea în uz extern se bazează în principal pe proprietățile revulsive ale Hreanului proaspăt ras. Producând o congestie la locul aplicării, activând circulația sângelui, aplicațiile cu Hrean fac să dispară sau să diminueze durerile.

Se recomandă în diverse nevralgii de natură reumatică, în inflamații articulare, chiar și pentru combaterea migrenelor, a nevralgiilor intercostale și dentare.

Congestia locală puternică încirculația periferică duce, prin compensare, la descongestionarea unor organe interne, în special a plămânilor, Hreanui fiind utilizat prin această proprietate în bronșitele acute, pneumonii, gripe.

Prin efectul revulsiv, prin afluxul de sânge la nivelul gingiilor, poate fi un adjuvant prețios în paradontoză. Datorită efectului antiseptic, se recomandă în igiena bucală, sub formă de apă de gură.

Se mai citează și recomandarea în combaterea degerăturilor.

Cosmetică.

Hreanul reprezintă un remediu și contra pistruiilor.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat ca atare, în scopuri condimentare; pentru combaterea teniei se recomandă să fie consumat timp mai îndelungat, alături de ceapă și fructe crude.

Infuzie din 15-20 g la litrul de apă, care se lasă apoi la macerat 12 ore; se iau 2 căni pe zi, între mese.

Vin tonic și antianemic, prin macerare timp de 24 ore a 30 g de Hrean ras la un litru de vin.

Se strecoară și se ia câte un pahărel de 50 g înainte de mese.

Sirop — pentru copiii anemici, limfatici, fără apetit.

Pentru aceasta se taie rădăcina în rondele fine, se adaugă zahăr, iar din suc care se formează se recomandă acestora câte o lingură pe zi.

Macerat în lapte timp de o oră, din 2 linguri de Hrean ras la 1/2 litru lapte fierbinte; se bea dimineața, ca adjuvant antireumatic.

Cură de Hrean cu miere în cardiopatii ischemice dureroase, angină pectorală, hipertensiune.

Se face o pastă omogenă dintr-o lingură de Hrean ras cu o lingură de miere; se ia treptat, cu lingurița, dimineața cu o oră înainte de micul dejun. Cura durează 30 de zile, repetându-se cu pauze de câte 2 luni, de 4 ori pe an timp de 3 ani.

Cataplasme cu Hrean ras aplicate pe torace în cazuri de bronșite, gripă, congestie pulmonară.

Bâi locale sau generale cu făină de Hrean, utile în reumatism și inflamații articulare, asemănătoare celor cu făină de Muștar, ținându-se făina într-un săculeț de tifon peste care se toarnă apă caldă de 25-30°, socotindu-se circa o linguriță cu vârful la un litru de apă.

Săculețul se agită în apă, iar baia durează 20-30 minute.

Tinctură de Hrean din 20 g hrean ras, macerat timp de 2 săptămâni în 100 ml alcool, utilizată în fricțiuni antireumatismale.

Mestecarea unei bucăți de rădăcină, în fiecare zi, în paradontoză.

Tinctură din frunze (20 g la 100 ml alcool timp de 10 zile), diluată cu apă, este o apă de gură antiseptică.

MORCOVUL

DAUCUS CAROTA L (FAM. UMBELLIFERAE)

Provine din selecția și ameliorarea Morcovului sălbatic din bazinul mediteranean.

Menționat de Pliniu cel Bătrân, Morcovul a fost folosit irițial ca plantă medicinală și apoi alimentară. Și în medicina tradițională românească, Morcovul este un remediu bine cunoscut.

În ultima perioadă a crescut interesul pentru Morcov datorită cercetărilor privind utilizarea sucurilor de legume și fructe, cel de Morcov fiind de bază în acest sens, fie consumat singur, fie în amestec cu alte sucuri din plante.

Unele studii merg până la recomandarea sucului de Morcov ca preventiv în boala canceroasă.

Se recomandă ca morcovii să nu se curețe, ci numai să se spele foarte bine.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Morcovii conțin cca 80% apă. Conținutul în protide este de numai 1%, iar în hidrați de carbon de 6%. Conțin 35 mg% sodiu, 235 mg% potasiu, 30 mg% calciu, 25 mg% fosfor, 1120 mg% vitamina A, 0,05 mg% vitamina B1, 0,05 mg% vitamina B2, 1 mg% niacin, cca 7 mg% vitamina C și mici cantități de vitamina K, de magneziu, sulf, cupru și brom, precum și un ulei volatil, asparagină și daucarină. Valoarea energetică este de 30 kcal la 100 g, din care cantitatea de energie resorbită este de 93%.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Morcovul este considerat un remediu de bază în numeroase afecțiuni ale aparatului digestiv.

El acționează în stările inflamatorii (cataruri) gastrointestinale.

Totodată, el reglează tranzitul intestinal, atât în constipație cât și în diaree, fiind unanim apreciat în tratamentul dispepsiilor acute și al diareilor sugarilor.

O acțiune favorabilă este cea din gastritele hiperacide, ulcerele gastroduodenale, chiar cu hemoragii.

Acțiunea sa bactericidă se manifestă în colibaciloză.

Indicațiile anti-parazitare se referă la combaterea teniei.

Se recomandă, de asemenea, în tratamentul tuturor afecțiunilor hepatice, fiind un vechi remediu al medicinei tradiționale în icter.

Este, de fapt, un stimulent al regenerării parenchimului hepatic și, de asemenea, un coleretic și colagog activ.

A doua grupă de recomandări se bazează pe acțiunea diuretică.

Într-adevăr, această proprietate este remarcabilă, Morcovul determinând chiar dublarea volumului de urină și, ceea ce este mai important, și eliminarea masivă de acid uric, fiind astfel recomandat în litiaza urică, ca și în alte forme de diateze urice (reumatism, gută, artritis).

Prin conținutul său de vitamine, în special A, B1, B2, C și K, Morcovul este un excelent vitaminizant, având ca efect accelerarea creșterii la copii, mărirea rezistenței la infecții, păstrarea rezistenței epitelilor, mărirea acuității vizuale.

Ajutând la regenerarea globulelor roșii, este și un remediu pentru anemii (la copii, convalescenți).

De asemenea, utilizat de mamele care alăptează, are efect galactogog (mărirea cantității de lapte).

Asupra aparatului respirator, Morcovul acționează favorabil în bronșite cronice și astm.

De dată mai recentă sunt cercetările privind efectul vasodilatator, îndeosebi la nivel coronarian. S-a depistat de asemenea și o acțiune asemănătoare insulinei, de unde și recomandarea Morcovului ca hipoglicemiant în diabet.

Îndeosebi sub formă de suc, Morcovul are o acțiune depurativă, prin eliminarea masivă de toxine, fiind recomandat în dermatoze.

În gerontologie, consumul de morcovi are ca efect prevenirea îmbătrânirii și formării ridurilor. În prezent intră în compoziția unor suplimente nutriționale ca Herbaforte, Herbatonic, capsule granulate etc. (Fares Orăștie).

Extern.

Prin proprietățile antihemoragice, analgezice și cicatrizante, Morcovul are efecte favorabile în răni, răni cu ulcerații, eczeme, pecingine, degerături.

Se studiază și efectul adjuvant în abcese, cancere de sân și epitelioame.

Cosmetică.

Morcovul se utilizează pentru a da prospețime pielii și a combate petele, îndeosebi cele care apar odată cu vârsta.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat ca atare.

Suc obținut la mixer, câte 100 ml dimineața devreme, ca diuretic, depurativ, antianemic în cataruri gastrointestinale.

Supă din 500 g morcovi rași sau tăiați mărunț, fierți 1/2 oră, preferabil 1/4 oră, la presiune; se pasează și se completează până la 1 litru cu apă fiartă.

Se dă cu biberonul pentru diareile nou-născuților, înlocuit treptat cu lapte.

Cataplasme cu morcovi rași.

Mască cosmetică cu morcovi rași simplu ori cu adaos de smântână sau loțiunări zilnice ale tenului cu suc.

Observatii.

Frunzele au proprietăți astringente, decoctul proaspăt din ele putând fi folosit în gargarisme pentru afte, stomatite, precum și ca băi locale sau comprese în degerături.

Fruitele au proprietăți carminative, tonic-aperitive, galactogoge și vermifuge contra limbricilor și oxiurilor, proprietăți comune cu ale celorlalte fructe de umbelifere, datorită conținutului bogat în ulei volatil.

Ele se folosesc și sub formă de infuzie preparată dintr-o linguriță la cană, 2 căni pe zi.

NAPII

BRASSICA NAPUS L (FAM. BRASSICACEAE CRUCIFERAE)

Plantă originară din bazinul mediteranean, este astăzi folosită din ce în ce mai rar, fiind înlocuită cu alte legume mai productive și cu gust mai plăcut.

De la Napi se utilizează în special rădăcinile îngroșate, uneori și frunzele.

A fost cultivat din Antichitate.

Romanii îl numeau „napum”.

S-a extins în culturi în jumătatea de nord a Europei, în Canada, Noua Zeelandă și fosta URSS.

La noi în țară a fost cultivat în județele Brașov și Maramureș.

Se întâlnește uneori subspontan pe marginea drumurilor.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conțin 88% apă, iar conținutul în protide este scăzut (1-1,6%); relativ mai bogat este conținutul în hidrați de carbon (6%).

Napii conțin 8 mg% sodiu, 190 mg% potasiu, 40 mg% calciu, 25 mg% fosfor, 0,4 mg% fier, 14 ug% vitamina A, 0,05 mg% vitamina C.

Energia este evaluată la 29 kcal pentru 100 g napi.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Proprietățile diuretice, la care se adaugă cele de dizolvant uric, fac napii utili nu numai în cistite și litiază urică, ci și în gută.

În medicina populară sunt mult apreciate proprietățile pectorale, în bronșite, tuse, angine.

Fiind depurativ-diuretici, consumul lor are efecte favorabile în eczeme, acnee.

Se mai recomandă în enterite, având proprietăți astringente.

Tot în completarea tratamentului intern, se recomandă pentru afecțiuni respiratorii.

Extern.

Napii au proprietăți maturative, putându-se folosi pentru furuncule și abcese.

Aplicațiile cu napi se recomandă în degerături și pentru completarea tratamentului gutei.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumați ca atare, în special ca depurativ-diuretic. Infuzie diuretică cu o linguriță de pulbere de napi la 0,5 l apă.

Decoct pectoral, preparat din 100 g napi tăiați în felii la 1 litru apă sau lapte.

Gargară cu aceiași decoct.

Aplicații în uz extern cu napi fierți, apoi masare ușoară, pentru a-și lăsa sucul.

PĂTRUNJELUL

PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) A. W. HILL (FAM. APIACEAE — UMBELLIFERAE)

Provenit din Pătrunjelul sălbatic, originar de pe litoralul mediteranean, Pătrunjelul cultivat mai are și un alt punct de convergență cu Morcovul, și anume faptul că de la început a fost utilizat în egală măsură medicinal și alimentar.

Este cunoscut și apreciat încă din Antichitate, de Hippocrate, Dioscoride, Pliniu cel Bătrân, Galen, pentru frunzele sale. Dioscoride îl numea „petroselinon”, iar Pliniu „petroselinum”.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Frunzele de Pătrunjel cu rădăcină conțin 3% protide, 6% hidrați de carbon, 20 mg% sodiu, 600 mg% potasiu, 145 mg% calciu, 75 mg% fosfor, 4,8 mg% fier, 730 mg% vitamina A, 10 ug% vitamina B1, 0,20 mg% vitamina B2, 0,8 mg% niacină, peste 100 mg% vitamina C (de 2-3 ori mai mult decât portocalele). Pătrunjelul conține și un principiu estrogen: apiolul, ulei volatil format din terpene, pinene, apiol și apelin. Conține și numeroase microelemente: iod, magneziu, mangan, sulf, cupru și o enzimă. În rădăcini, conținutul în vitamina A este mai ridicat (730 p.g%).

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Așa cum le recomandă încă din Antichitate Galen, rădăcinile de Pătrunjel sunt un diuretic important, recomandat în afecțiuni renale, cu deosebire în litiaze.

Important este faptul că el are și efect declorurant (deci cu acțiune favorabilă în edeme cardiorenale), precum și în eliminarea uraților.

Are, de asemenea, un rol tonic-aperitiv, fiind un stimulent general și nervin.

Are remarcabile proprietăți antixeroftalmice, antirahitice și antianemice.

Reglează tulburările de ciclu.

Datorită conținutului ridicat în apiol, fructele se utilizează în scopuri avortive. Nu recomandăm această practică.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat în preparate culinare.

Decoct din 50 g rădăcini fierte 20 minute într-un litru de apă; se strecoară și se îndulcește,ându-se 2-3 căni pe zi.

Suc, 50-100 ml/zi.

Observații.

Proprietățile fitoterapeutice ale frunzelor vor fi tratate în capitolul privitor la legumele de la care se utilizează frunzele.

PĂSTÂRNACUL

PASTINACA SATIVA L (FAM. APIACEAE - UMBELLIFERAE)

Mai puțin utilizat, Păstârnacul își are originea tot în zona mediteraneană.

Efectele terapeutice sunt moderate, deoarece se consumă în cantități reduse, numai ca adaos, în schimb, proprietățile nutritive sunt remarcabile.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Păstârnacul are o compoziție chimică asemănătoare cu cea a Păstrun jelului, fiind bogat în săruri de potasiu, vitamina A, B1, B2 și C, în ulei volatil, conținând și apioi. Valoarea energetică este exprimată prin 40 kcal la 100 g rădăcini.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Ca și celelalte rădăcini de umbelifere, cele de Păstârnac sunt tonic-aperitive și ușor diuretice, prin diureză producându-se și o eliminare de toxine, deci au efect depurativ-diuretic. Se citează efectul emenagog (contribuind la reglarea ciclurilor), precum și cel antireumatismal.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat în preparate culinare sau sub formă de decoct, ca și rădăcina de Păstrunjel.

ȚELINA

APIUM GRAVEOLENS (FAM. APIACEAE — UMBELLIFERAE)

Această legumă, ce-și are originea în Țelina sălbatică din bazinul mediteranean, a fost cunoscută pentru proprietățile sale medicinale încă din Antichitate, fiind recomandată de medicii hipocratici Dioscoride și Pliniu cel Bătrân.

De la această interesantă legumă, cu o paletă de recomandări terapeutice surprinzător de bogată, se utilizează în aceste scopuri atât rădăcinile, cât și frunzele și semințele.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conține 83% apă.

Are un conținut redus în protide (1%) și mediu (5%) în hidrați de carbon, comparativ cu celelalte legume rădăcinoase.

Bogată în minerale și săruri de sodiu (55 mg%), potasiu 2,35 mg%, calciu 50 mg%, fosfor 60 mg%, fier 0,4 mg%, conține mici cantități (2 (ig%) de vitamina A.

Vitarninele B1 și B2 sunt în cantitate de 0,05 mg%, niacina 0,7%, iar vitamina C numai 10 mg%.

Ca microelemente, conține iod, magneziu, mangan și cupru etc.

Țelina conține și un ulei volatil format din anhidridă sedanoică și alți componenți (colină, tirozină, acid glutamic).

Valoarea energetică este de cca 28 kcal la 100 g, din care se resoarbe cca 92%.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Efectul tonic este binecunoscut și în medicina populară, afirmându-se metaforic că redă o nouă tinerețe.

Unul din factorii responsabili de această acțiune este probabil stimularea glandelor suprarenale.

Proprietățile diuretice sunt certe, rădăcinile de Țelină fiind totodată și declorurante, fiind utile în afecțiuni renale (litiază, colică nefritică) și pentru cardiaci cu edeme cardio-renale și albuminurie.

Prin eliminarea excesului de apă din țesuturi se recomandă și în obezitate, putând intra în cura de slăbire. Având acțiune diuretică, este și depurativă; se recomandă în formele de diateză urică (reumatism, gută).

Având proprietăți hipoglicemizante, este considerată ca adjuvant antidiabetic.

În catarurile bronșice, Țelina acționează prin proprietățile expectorante și de calmare a tusei.

Extern.

Cu totul specifică este acțiunea de combatere a degerăturilor, folosindu-se pentru aceasta rădăcinile de plantă cu frunze cu tot.

Sucul este utilizat în unele forme de afecțiuni oftalmice.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumată ca atare în preparate culinare.

Suc (îndeosebi în cure de slăbire, reumatism, gută, tuse și catar bronșic) — câte 100 g dimineața înainte de masă; pentru afecțiuni oftalmice, se picură pe pleoape câteva picături sau se tamponează ușor cu un tampon steril, umectat.

Decoct din cca 30 g la un litru de apă; se beau, pentru efectele diuretice, 2-3 căni pe zi.

Tinctură preparată din rădăcini tăiate și alcool diluat de 40° în părți egale; se ia câte o linguriță de 2 ori pe zi.

„Vin tonic”: se prepară din o rădăcină mărunțită și macerată 48 de ore într-un litru de vin alb, adăugându-se 100 g de miere.

Din acest vin deosebit de parfumat și cu o aromă discretă de ananas, se iau 2-3 păhărele pe zi, manifestându-se, în afară de efectul diuretic, și efecte tonice generale.

Băi locale pentru degerături.

Se fierbe o țelină cu frunze cu tot, tăiată mărunt, în 2 litri apă, circa 45 minute.

Se țin părțile degerate în decoctul cât se poate de cald, reîncălzindu-se pentru a se folosi de 3 ori pe zi.

Tratamentul durează 3-5 zile.

Observatii.

Semințele de Țelină au proprietăți comune cu ale celorlalte umbelifere, stimulând digestia, fiind și carminative.

Se folosesc sub formă de infuzie cu 1/2 linguriță la cană, 2 căni pe zi, maximum 3 zile.

RIDICHILE

RAPHANUS SATIVUS L. (FAM. BRASSICACEAE — CRUCIFERAE)

În mitologie, zeului Apollo i se atribuia afirmația potrivit căreia, dacă guliile merită greutatea lor în plumb, iar sfeclele greutatea lor în argint, ridichile ar merita desigur greutatea lor în aur, fapt care atestă importanța pe care o dădeau anticii acestei legume, cultivată de peste 4 milenii.

Părintele istoriei, Herodot, arată că sclavilor care clădeau piramidele li se dădeau, alături de usturoi, și ridichi.

Mult apreciată în Grecia și Roma antică, Hippocrate recomanda ridichea în hidropizie; amintită de Teofrast, era apreciată de Dioscoride pentru proprietatea de a stimula apetitul, a favoriza digestia și a calma tusea.

În Evul Mediu se folosea pentru „eliminarea din viscere a tumorilor maligne” și drept antidot în otrăviri. Matthiolus — savantul Renașterii — o recomanda pentru proprietățile diuretice și antilitiazice, iar

Mizauld, în lucrarea sa „Grădina de plante medicinale” (1578), o recomanda și el ca tratament specific antilitiazic.

Multe din aceste proprietăți sunt aduse în atenție prin cercetările fitoterapeutice mai recente.

Proprietățile medicinale aparțin îndeosebi ridichilor negre (așa-zisele „ridichi de iarnă”), *Raphanus sativus* L. var. *niger* (Mill). D.C.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Ridichea de iarnă conține 1% proteine, 3% hidrați de carbon, 15 mg% sodiu, 245 mg% potasiu, 25 mg% calciu, 20 mg% fosfor, 0,6% fier, abia 1 mg vitamina A, 0,05 mg% vitamina B1, 0,02 mg% vitamina B2, 0,3 mg% niacină și 25 mg% vitamina C. Ridichile negre, în special, conțin un ulei volatil sulfurat: rafanolul și mici cantități de tocoferol. Valoarea energetică este redusă și este exprimată prin 15 kcal la 100 g.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Sunt considerate în primul rând ca antilitiazice importante, atât în litiaza biliară, cât și în cea renală.

Mai ales în cea renală, lucrări recente consideră ridichile, alături de frunzele de Mesteacăn și rădăcinile de Roibă (*Rubia tinctorum*, o plantă tinctorială bine cunoscută și la noi în popor), ca formând „triada de aur” capabilă să mărunțească pietrele (proprietăți litotritice).

Efectele coleretic și colagog le fac utile pentru cei cu insuficiență hepatică, colecistică și alte afecțiuni hepatice.

Se citează folosirea ridichilor și în atonia stomacului (deci pentru așa-numitele „stomacuri leneșe”), ca și în aerofagie.

Considerații mai recente asupra sucului de ridichi indică utilizarea acestuia pentru „curățirea” și regenerarea mucoaselor în cazuri de sinuzite sau rinite.

Bine cunoscute în medicina populară sunt proprietățile pectorale, adjuvante de real folos în bronșită, tuse de diferite etiologii, cataruri ale căilor respiratorii, chiar și în astm.

În secundar, datorită conținutului ridicat în vitamina C, mai puțin în B1, B2 și A, se recomandă în afecțiuni carentiale.

Extern.

Ridichea rasă are proprietăți rubefiante, respectiv de a produce o iritație locală și prin aceasta un aflux mai mare de sânge, o înroșire locală, care provoacă cedarea stărilor congestive ale organelor interne (pneumonii, stări congestive ale ficatului).

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate sub formă de ridichi rase (eventual cu mere).

Suc (de preferat în amestec cu suc de morcovi), îndeosebi în litiază biliară sau renală.

Se iau 30-40 g cu cca 15 minute înainte de mese.

Sirop pectoral, din ridichi tăiate felii peste care se presară zahăr și se acoperă; după 24 de ore se strânge sucul care s-a lăsat, administrându-se 3-4 lingurițe pe zi.

De asemenea, pentru proprietăți pectorale, în medicina populară se recomandă să se scobească o ridiche mai mare, să se umple cu zahăr (cu miere) și hrean.

Se coace, iar apoi se strânge sucul care se lasă, administrându-se 3-4 lingurițe pe zi.

Tot în medicina tradițională se recomandă aplicații locale cu ridichi rase în dreptul plămânilor (pentru pneumonii) sau în dreptul ficatului (pentru stările congestive ale acestuia).

Observații.

Ridichile roșii și albe de primăvară — numite și „ridichi de lună” — au proprietăți similare.

Se recomandă să se consume cu frunze cu tot, care sunt foarte bogate în vitamine, săruri minerale și alte substanțe chimice foarte utile..

SFECLA ROȘIE

BETA VULGARIS L. Forma RUBRA L. (FAM. CHENOPODIACEAE)

Având originea într-o specie spontană din bazinul mediteranean (Beta maritima L.), Sfecla roșie s-a cultivat încă din sec. II — III ale erei noastre.

Este caracteristică formarea mai multor fascicule libero-lemnoase concentrice, care se observă chiar cu ochiul liber în secțiune.

Specie alimentară nutritivă, aperitivă și energetică, are și unele aplicații terapeutice, deși este încă insuficient studiată sub acest aspect.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conținutul în protide este de 1-1,8%, cca 6% hidrați de carbon, cca 60 mg% sodiu, 260 mg% potasiu, 25 mg% calciu, 35 mg% fosfor, 0,7% fier și numeroase microelemente, dintre care unele rare: rubidiu și cesiu, alături de cupru, magneziu, brom, zinc. Conținutul în vitamine este scăzut: 2 mg% vitamina A, 0,02-0,03 mg% vitamina B1 și B2, cca 0,2% niacină și doar 10 mg% vitamina C; în schimb, conține asparagină, betaină și acid glutamic. Valoarea energetică este de cca 30 kcal la 100 g.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Prin conținutul ridicat de săruri minerale și microelemente de mare importanță ca elemente constitutive ale unor enzime, Sfecla roșie este utilă în colite, enterite și tuberculoză.

Se recomandă consumarea ei în timpul edemelor, epidemiilor de gripă, iar după unii autori, chiar în boala cancerosă.

Ea constituie și un adjuvant în tratamentul hipertensiunii.

Este contraindicată în diabet.

Medicina tradițională consideră, nu fără temei, sucul de Sfeclă roșie un excelent depurativ și diuretic.

Pe baza cercetărilor recente asupra acțiunii sucurilor, se citează utilizarea sucului de Sfeclă roșie, împreună cu cel de Morcov și de Castravete, în tratamentul litiazelor urice și al diatezelor urice.

MOD DE INTREBUINȚARE

Consumată ca atare în salate și în alte preparate culinare.

Fiartă sau coaptă, își pierde din proprietățile terapeutice.

Suc de Sfeclă roșie, simplu sau în combinație cu cel de castraveți și morcovi. Se bea dimineața, 100-150 ml.

GRUPA CEPEI

Grupă omogenă din punct de vedere botanic, reprezentanții făcând parte nu numai din aceeași familie (Liliaceae), ci chiar și din același gen — Allium.

Din această grupă, principalii sunt Ceapa, Usturoiul și Prazul.

Atât în scopuri alimentare, cât și în fitoterapie, se folosesc în principal bulbii și tulpinile aeriene false. Acestei unități de structură îi corespunde și o compoziție chimică destul de unitară, cu totul caracteristică fiind prezența fitoncidelor, substanțe cu puternică acțiune antimicrobiană, similare antibioticelor produse de plantele inferioare.

Toate cele trei specii au o deosebită importanță medicinală, fiind adevărate plante medicinale cu o paletă largă de recomandări, în unele cazuri servind chiar și ca materie primă pentru industria de medicamente (ca, spre exemplu, Usturoiul).

Toate cele trei specii sunt pomenite în Biblie (Vechiul Testament): „Ne aducem aminte de peștele pe care îl mâncam pe degeaba în Egipt, de castraveți, de harbuji, de praz, de ceapă și de usturoi.” (Numerele, 11:5)

CEAPA

ALLIUM CEPA L. (FAM. LIUACEAE)

Cultivată încă cu 5000-6000 de ani înaintea erei noastre pe valea Nilului, provine din forme sălbatice originare din centrul Asiei și Asia Mică.

Amintită în lucrările lui Homer și Herodot, Ceapa a avut încă din Antichitate o reputație deosebită și sub raport medical. Astfel, Dioscoride o recomanda ca diuretic extrem de eficient, iar Pliniu cel Bătrân, care o numea „Cepa”, o considera drept cel mai bun leac contra ascitei, cele indicate de el rămânând în mare măsură valabile peste veacuri.

Recomandări interesante se găsesc în lucrările vestitei școli din Salerno, precum și în operele marilor medici arabi ai Evului Mediu.

Se utilizează bulbul, cu o multitudine de recomandări medicale, atât în uz intern, cât și în uz extern. Este contraindicată suferinșilor de hiperaciditate.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conținutul de protide e scăzut (1%), iar în hidrați de carbon este de 9%.

Conține mici cantități de sodiu — cca 8 mg%, 160 mg% potasiu, 30 mg% calciu, 40 mg% fosfor și 0,5 mg% fier.

Dintre microelementele pe care le conține sunt citate: iodul, siliciul, sulful și fluorul (0,05 mg%).

Vitaminele sunt în cantități mici: 5 μg% vitamina A, 0,03 mg% vitaminele B1 și B2, 0,2 mg% niacină și 8 mg% vitamina C.

Mai conține acizii fosforic și acetic, ulei volatil, bisulfat de alil și propil, enzime și glucochinonă.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Principala recomandare pentru Ceapă este aceea de diuretic energic, diureza fiind însoțită de o eliminare masivă de clorură de sodiu, prin aceasta dovedindu-se utilă în toate cazurile de retenție clorurosodică (edeme, ascite, ciroze, pleurezii, pericardite).

Producându-se și o eliminare de uree și acid uric, Ceapa este utilă în litiaza urică și diateze (reumatism, gută, azotemie).

Ameliorează simțitor starea bolnavilor în prostatite, mai ales în pregătirea lor pentru intervenții chirurgicale: preventiv, inhibă evoluția adenomului de prostată.

Deoarece fitoncidele (antibiotice din plante superioare) îi conferă proprietăți antiseptice, Ceapa combate flora patogenă din intestin în colite, enterite și, prin aceasta, constituie și un remediu contra diareilor, fiind totodată un bun carminativ.

Proprietățile de stimulare a digestiei sunt cunoscute de toți.

Acțiunea antiseptică amintită, combinată cu cea emolientă, îi conferă proprietăți pectorale, făcând-o utilă în răgușeală, tuse rebelă, cataruri bronhice.

Datorită proprietăților hipoglicemiante, Ceapa este un adjuvant și în diabet.

Cercetări destul de recente au arătat că un regim bogat în Ceapă fluidifică sângele, micșorând riscul de tromboză și infarct.

Prin aceasta se explică și efectul antiaterosclerotic al plantei.

Se mai citează și proprietățile ei ușor hipnotice.

Extern.

Prin proprietățile ei antiseptice, constituie un remediu activ în stomatite, afte, alte afecțiuni bucofaringiene, furunculoze, având efect în special asupra stafilococilor.

Utilizarea în furunculoză se explică și prin proprietățile ei maturative (grăbind colectarea) și emoliente (înmuind țesuturile).

Plăgile congestive, ulcerațiile pot, de asemenea, beneficia de efectele Cepei, ca de altfel și degerăturile și durerile de urechi.

Se citează în medicina populară utilizarea cepei pentru calmarea nevralgiilor dentare.

Cosmetică.

Sucul de ceapă se recomandă pentru combaterea negilor și pistruiilor.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumată ca atare, minimum 1-2 cepe pe zi.

Tinctură, în special ca diuretic și în prostatite, dintr-o ceapă zdrobită macerată 10 zile în aceeași cantitate de alcool; se filtrează și se iau 2 lingurițe pe zi, înainte de masa de prânz și înainte de culcare.

Pentru prostatite, se recomandă cure de zece zile pe lună, timp de 6 luni pe an.

Infuzie cu proprietăți pectorale din 4-6 cepe la 1 litru de apă, îndulcită cu 10 g miere, se strecoară și se beau 1-2 căni pe zi, dintre care una dimineața.

Macerat în ulei, dintr-o ceapă mare tăiată mărunt și 4 linguri de ulei, timp de 10 zile, în litiata biliară se iau 2-3 lingurițe pe zi.

Decoct din 3 cepe mari la 1 litru de apă.

În reumatism se ia câte o cană dimineața și seara la culcare.

Cataplasme maturative și revulsive cu o ceapă fiartă, în furunculoze, plăgi, degerături.

Tamponări cu suc de ceapă pentru afte și ulcerații.

Aplicații cu un bulb cald în conductul auditiv pentru calmarea durerilor.

Aplicații repetate cu suc (de 3—4 ori pe zi, timp de 5-6 zile) contra negilor și pistruiilor.

USTUROIUL

ALLIUM SATIVUM L. (FAM. LILIACEAE)

Originar din stepele Asiei Centrale, Usturoiul este printre legumele cele mai vechi în cultură (cu cca 5000-6000 ani înaintea erei noastre).

În Egipt se citează utilizarea Usturoiului în hrana lucrătorilor ce ridicau piramidele de la Gizeh, ca fortifiant și pentru a proteja împotriva pestei.

Talmudul îi recunoaște o proprietate perfect valabilă și azi, aceea de vermifug.

Autorii greci, în frunte cu Aristofan, i-au adus elogii pentru numeroasele sale proprietăți terapeutice.

Dioscoride l-a descris ca fiind un bun vermifug, la fel ca, la romani, Galen.

În acest cor de laudători, singur Horațiu a făcut excepție, scriind că „dacă, într-o zi, un fiu va dori moartea bătrânului său părinte, va putea să-l facă să piară cu Usturoi. Căci chiar și Cucuta e mai blândă ca acesta”.

O relatare anecdotică arată că motivarea era foarte subiectivă: bogatul Mecena, invidios pe Marele Poet pentru succesul pe care Horațiu îl avea în fața frumoasei Lidia și cunoscând că aceasta detestă Usturoiul, 1-a

îmbiat înaintea unei întâlniri pe genialul îndrăgostit la o masă bogat agrementată cu acest odorant condiment. Este lesne de înțeles ce s-a întâmplat apoi...

Arabii l-au recomandat ca antidot contra turbării și mușcăturilor de vipere, iar școala din Salerno i-a recunoscut însușirile antiseptice. În timpul Renașterii, Paracelsus și vestitul chirurg Ambroise Pare îl considerau ca un adevărat panaceu.

Timp de secole a constituit singurul mijloc de combatere a teribilelor epidemii de ciumă care bântuiau lumea depopulând regiuni întregi. Se utiliza pentru aceasta vestitul „oțet al celor 4 hoți”, legat și el de o anecdotă istorică: se spune că în timpul epidemiei din 1628 de la Toulouse, care a secerat în 3 ani 50.000 de vieți, au fost prinși 4 hoți care jefuiau casele celor morți sau muribunzi, fără să se teamă de contaminare.

În schimbul salvării vieții lor, ei au destăinuit rețeta oțetului aromat care conținea și Usturoi în cantități mari.

În medicina tradițională românească, Usturoiul este, de asemenea, mult folosit, frecându-se spre exemplu buzele copiilor cu un cățel de Usturoi pentru a le da forță și a-i apăra de boli, interesantă confluență cu tradițiile populare din alte țări (se citează, de exemplu, că bunicul regelui Henric al IV-lea al Franței a procedat la fel când acesta era mic).

Departate de a scădea, importanța medicinală a Usturoiului este și azi valabilă, servind și ca materie primă pentru medicamente hipotensive.

Desigur, nu credem azi în panacee, însă tabloul recomandărilor terapeutice ale Usturoiului este cu adevărat impresionant, singurul impediment constituindu-l mirosul său penetrant, neajuns ce nu poate fi decât parțial evitat prin igiena repetată a gurii cu paste de dinți puternic mentolate și clătirii cu alcool foarte diluat (la cca 30°), luându-se totodată și 1-2 tablete decărbune medicinal.

Cu toate aceste măsuri de precauție, Usturoiul, datorită tocmai substanțelor active care se elimină prin respirație, în mare parte va rămâne dezagreabil pentru cei care nu l-au consumat cu o zi înainte.

Datorită substanțelor pe care le conține, Usturoiul are o serie de contraindicații, ca de exemplu în cataruri gastrice și intestinale, în simptome congestive pulmonare (tuse seacă, sangvinolentă, stări febrile,

deoarece accentuează starea iritativă; de asemenea, nu va fi administrat mameilor care alăptează, deoarece transmite gustul și mirosul său laptelui, putând duce la „înțărare”.

Din experiența personală, unul dintre autorii acestei cărți (Ovidiu Bojor) recomandă pentru cei care au teamă de mirosul Usturoiului următoarea rețetă de preparare a mujdeiului: „căței” de la o căpățâuă de usturoi, o lingură de sare, o linguriță de zahăr.

Se freacă în piua și se adaugă treptat 2 linguri de ulei comestibil și o lingură suc de lămâie.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Usturoiul conține hidrați de carbon până la 25%, în care predomină inulina, protide, săruri minerale, iod, siliciu, sulf, vitamina C (cca 0,4%), cantități mici de ulei volatil (cca 0,009 g%) format din disulfură de alilpropil (cca 6%), disulfură de alil (cca 60%) și trisulfură de alil (cca 20%) și cantități mici de tetrasulfură de alil.

Alte două substanțe uleioase cu puternice proprietăți bacteriostatice sunt menționate sub numele de alicină și garlicină și sunt responsabile de acțiunea fitoncică (antibiotice din plante superioare), alături de alisatina I și II care acționează puternic asupra stafilococului.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Acțiunea hipotensivă a Usturoiului este o realitate bine fundamentată din punct de vedere științific.

Atât prin acțiunea asupra circulației periferice, cât și asupra contractilității miocardului, preparatele de Usturoi coboară atât minima, cât și maxima presiunii arteriale (presiunea sistolică, respectiv diastolică arterială).

La rândul său, pulsul devine mai rar și se regularizează; concomitent se produce și o dilatare a arterelor coronare.

Ca urmare, diminuează efortul cardiac și se ameliorează tulburările de ritm.

Efectele se extind și asupra aparatului vascular, diminuând spasmele vasculare și reducându-se tulburările circulatorii (inclusiv în varice și hemoroizi).

Usturoiul este totodată antihemoragic, micșorând și riscul de tromboză.

Toate acestea se leagă și de efectul antiaterosclerotic marcat al Usturoiului, prin scăderea nivelului colesterolului în sânge.

Puternica acțiune antibacteriană face ca Usturoiul să fie extrem de util ca antidiareic și antidizenteric.

Îl se atribuie și proprietăți de prevenire a cancerului căilor digestive.

De asemenea, prin consumul de Usturoi, sunt atenuate colicile produse de dispepsiile de fermentație.

El se manifestă și în stimularea apetitului, ca și în tonifierea stomacului.

Contribuind la eliminarea balonărilor, Usturoiul este și carminativ.

De asemenea, stimulează secrețiile biliare (efect coleretic).

Cunoscute bine încă din Antichitate, proprietățile antihelmintice se manifestă îndeosebi asupra limbricilor, oxiiurilor, teniei, fiind în acest sens considerat printre speciile medicinale de bază.

Acțiunea dezinfectantă, combinată cu cea expectorantă și calmantă a spasmelor musculaturii netede, face ca Usturoiul să fie recomandat în bronșite cronice, gripe și rinite.

Se recomandă și în astm (inclusiv în crize), emfizem pulmonar și tuse convulsivă.

Diureza este sporită prin consumul de Usturoi, cu eliminarea accentuată de acid uric și urați.

Usturoiul se dovedește astfel util în litiaza urică, precum și în diateze urice (gută, reumatism, artrism), în afară de oligurie, hidropizie, edeme ale picioarelor.

Extern.

Și în uz extern sunt de mare importanță proprietățile antiseptice ale Usturoiului, fiind folosit în plăgi infectate, ulcerații.

Se citează proprietățile de sedare a unor algii (dureri) de natură reumatică sau ca urmare a unor inflamații ale conductului auditiv extern.

În tratamentul oxiuriazii, tratamentul extern se folosește în clisme, combinat cu cel intern.

În fine, Usturoiul este un remediu util contra bătăturilor și negilor.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat ca atare, zilnic minimum 2-3 bulbili (căței) zdrobiți.

Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți, fierți 15-20 minute în 200 ml apă sau lapte, cantitatea rezultată bându-se în cursul unei zile.

Sirop din 50 g Usturoi fierț în 200 ml apă, se filtrează, se îndulcește cu 50 g zahăr și se iau 2-3 linguri pe zi (în cazul teniei se bea întreaga cantitate dimineața pe stomacul gol, repetându-se mai multe zile la rând, până la expulzarea parazitului).

Tinctură din suc rezultat prin zdrobirea Usturoiului cu o proporție egală de alcool 40°, se iau 2-3 lingurițe pe zi, timp de 10 zile pe lună.

Rețeta de tinctură din medicina tradițională chineză: 350 g bulbili bine zdrobiți se lasă la macerat la loc răcoros timp de 10 zile în 350 ml alcool de 85 centigrade.

După acest răstimp, se filtrează și se mai lasă 3 zile la limpezire.

După decantare, se păstrează în sticle brune, bine astupate, la temperatură moderată.

Se administrează după următoarea schemă:

Doza este exprimată în numărul de picături.

După cum se vede, se merge cu doze progresive, pornind de la o picătură în dimineața primei zile, la prânz două picături, seara 3 picături ș.a.m.d., ajungându-se în ziua a 9-a la 25 picături de trei ori pe zi. Apoi dozele scad treptat până la o picătură în cea de-a 17-a zi, când se reia tratamentul după aceeași schemă, până la epuizarea extractului alcoolic.

Cantitățile menționate se iau în 50 ml lapte sau apă (îndulcite sau nu cu miere), cu 20-30 minute înainte de mesele principale.

Deși modul de administrare este foarte minuțios, chiar dificil pentru noi, europenii, totuși dă rezultate bune în boala hipertensivă și ateroscleroză, iar efectele acestui tratament se păstrează pe timp de 3-5 luni, după care — cine are răbdare poate relua tratamentul.

Macerat la cald, cu efecte vermifuge (contra limbricilor și oxiurilor), din 3-4 bulbili zdrobiți într-o cană cu apă sau lapte în clocot; se lasă peste noapte, iar dimineața se bea întreaga cantitate (pe o perioadă de 3 săptămâni la rând).

Suc, 20 g la 200 ml lapte, cald, băut dimineața, cu efect vermifug.

Câteva picături de suc pe puțin zahăr, luat în momentul crizei de astm.

În prezent există numeroase produse din Usturoi sub formă de capsule sau gelule, cum sunt Herbaforte și Herbastin (Fares Orăștie) etc.

Soluție cu 10% suc și 1-2% alcool pentru dezinfectarea rănilor, ulcerațiilor.

Tampon îmbibat în suc pentru calmarea durerilor de urechi.

Cataplasme cu Usturoi ras aplicat seara și păstrate până dimineața, timp de cca 15 zile, pentru combaterea negilor și bătăturilor.

Aplicații de bulbili fierți, puși cât se pot suporta de calzi pe zona interesată (se repetă de mai multe ori pe zi).

PRAZUL

ALLIUM PORRUM L. (FAM. LILIACEAE)

Originar din bazinul mediteranean, a fost bine cunoscut încă din Antichitate.

Din papirusurile egiptene, de pildă, se cunoaște că faraonul Cheops 1-a recompensat regește pe un medic care 1-a scăpat de o afecțiune urinară cu... „100 de legături de Praz”.

Apreciat în Iudeea, menționat în „Cartea numerelor”, era considerat la greci și romani un veritabil remediu. Hippocrate i-a stabilit astfel numeroase acțiuni, multe fiind valabile și azi.

Acțiunea emolientă, expectorantă și cea pectorală au fost foarte cunoscute.

Detestatul Nero, despre care se știe că ținea să fie considerat un mare artist, folosea intens Prazul pentru curățirea corzilor sale vocale, de unde și porecla sa „Porofagul”.

Prazul a fost foarte apreciat și în timpul Evului Mediu.

În România se cultivă pe mari suprafețe, în special în sudul și estul țării, mai puțin în Ardeal, Banat și Crișana.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Prazul conține 87-90% apă, 52% protide, 4% hidrați de carbon, grăsimi 0,4%, 3 mg% sodiu, 130 mg% potasiu,

50 mg% calciu, 25 mg% fosfor, 0,6% fier, 20 mg% vitamina A, 0,05 u.g % vitamina B1 și B2, 0,3% niacină și 30 mg vitamina C.

Sub formă de microelemente, sunt prezente magneziul, manganul, sulfatul și siliciul.

Conține și un ulei volatil, în cantități mici, format dintr-un compus sulfo-azotat, precum și mucilagii și celuloză.

Valoarea energetică este apreciată la 22 kcal din care cantitatea resorbită este de cca 79%.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern. Ca și în cazul Cepei, la Praz sunt dominante proprietățile diuretice, diurciza făcându-se cu eliminarea masivă a ionului de sodiu (efect declorurant, util pentru suferinzi cardiaci, renali, diminuând edemele, retenția generală de apă în țesuturi), precum și de acid uric și urați, de unde recorhandările în litiaza urică, gută, artrism, azotemie, ateroscleroză etc.

Prazul este un laxativ remarcabil și un calmant al stărilor iritative ale tractului digestiv.

Se citează că radicelele (popular „mustăți”) au proprietăți vermifuge contra limbricilor și oxiurilor.

Deosebit de bun emolient, este util în inflamațiile acute și cronice ale căilor respiratorii, răgușeală, tuse, faringită, traheită.

Este considerat, de asemenea, un adjuvant în ateroscleroză.

Extern.

Prin proprietățile sale calmante și maturative, este cunoscut de mult timp ca fiind util în furuncule, ulcerații supurate, gută, angine.

Aplicațiile calde pe abdomen favorizează emisia urinei în cazurile de retenție, iar prin tamponarea mucoasei nazale, se opresc hemoragiile.

Un remediu din medicina populară contra bătăturilor recomandă aplicații locale cu un macerat de frunze de Praz timp-de o zi în oțet.

Se caută să se țină cât mai mult (6-8 ore) în contact cu zona respectivă și se repetă câteva zile la rând. Are efecte favorabile și contra hemoroizilor externi.

Cosmetică.

Acțiunea sa emolientă, datorată mucilagiilor, și cea decongestivă fac din Praz una din legumele cu efect favorabil asupra tenurilor; de asemenea, este activ în acnee și în atenuarea petelor de roșeață (cuperoză).

În cosmetica părului, Prazul este pentru părul brun ceea ce este Mușețelul pentru părul blond, respectiv are rolul de a-i da reflexe foarte frumoase.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat ca atare. Decoct foarte concentrat; băut regulat, este un foarte bun diuretic. Decoctul servește și pentru clătirea părului brun. Sirop pectoral din decoct foarte concentrat amestecat cu o greutate egală de miere. Se iau 4-5 linguri pe zi. Extern. Conform recomandărilor din text.

GRUPA LEGUMELOR DIN FAMILIA SOLANACEELOR

Aduse din Lumea Nouă de conchistadori (exceptând pătlăgelele vinete), plantele comestibile din familia Solanaceelor au cucerit încetul cu încetul Europa, devenind astăzi legume de bază.

Grupa constituită pe criteriul înrudirii botanice, respectiv al apartenenței la aceeași familie (Solanacee), cuprinde plante de la care se consumă fie tuberculii (cartoful), fie fructificațiile (tomate, ardei, vinete).

Din punct de vedere medical, de interes mai deosebit sunt cartofii și, într-o măsură mai redusă, ardeii și tomatele, în timp ce vinetele au efecte cu totul neînsemnate.

În general, se poate afirma că la această grupă predomină net importanța nutritivă față de cea terapeutică, aceasta din urmă fiind legată în special de aportul de săruri minerale și de vitamine.

CARTOFUL

SOLANUM TUBEROSUM L (FAM. SOLANACEAE)

A fost adus din Lumea Nouă de către conchistadori la ordinul regelui Filip al II-lea.

Prima descriere a sa a fost făcută în 1550 de Pedro de Creza, tovarăș de călătorie al lui Pizzaro, cuceritorul Perului, care face observația că, în zonele înalte și umede de acolo, această plantă, sub denumirea de „papas”, era baza alimentației incașilor.

Răspândirea acestei plante în Europa, cu tuberculi cât o cireașă și cu gust destul de neplăcut, s-a făcut destul de anevoie, din moment ce în anul 1601 Clasius o descria în lucrarea sa „Rariorum plantarum historia” („Istoria plantelor rare”).

În Anglia a fost introdusă, după unii, de vestitul corsar Francis Drake, iar după alții de amiralul Raleigh. A fost cultivată în grădinile de flori și utilizată ca plantă medicinală, ca adevărat elixir de viață lungă, părere împărtășită chiar de Bacon.

Dar meritele ameliorării și răspândirii plantei îi revin farmacistului francez Parmentier (sec. al XVIII-lea), horticultor amator, care obține cartofi cu tuberculi mari, dar care, fiind și psiholog și mizând pe slăbiciunile omenești, a pus o pază puternică în jurul unui teren cultivat cu cartofi, pentru a stimula curiozitatea și... furtul în timpul nopții și, prin aceasta, răspândirea Cartofului.

Cartoful se cultivă astăzi pe scară largă, cu numeroase soiuri, în special în zona temperată. Tuberculii, alături de marea lor valoare nutritivă, au și unele proprietăți medicinale.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conținutul în apă este de 74-75%, în proteine de 2%, în hidrați de carbon între 19-22%, lipide cca 0,15%, sodiu 445 mg%, calciu 13 mg%, fosfor 60 mg%, fier 0,9 mg%, vitamina A 5 ug%, vitamina B1 0,10 mg%, vitamina B2 0,05 mg%>, vitamina B6 0,2 mg%, niacină 1 mg%, vitamina C 20 mg%, acidul pantotenic de 0,3-0,6 mg%, iar cel folic în cantitate de 0,2 mg%.

Dintre microelemente sunt prezente: magneziul, manganul, sulful și cuprul.

Cartoful conține și mici cantități de acid citric și malic.

Sub aspect energetic, cartofii fără coajă conțin 85 kcal pentru fiecare 100 g, din care cantitatea de energie resorbită este de 94%, ceea ce înseamnă că un kilogram de cartofi asigură organismului 800 kcal.

Sub aspect toxicologic, toate părțile verzi ale plantei, în special fructele, conțin solanină, substanță toxică, alături de alți alcaloizi toxici (cachonină, demissină).

Și tuberculii verzi conțin solanină.

Conform unei relatări istorice mai vechi, la început europenii nu știau ce parte din Cartof este comestibilă și au început să consume fructele plantei, ceea ce a dus la intoxicații grave.

Din acest motiv, prin ordin regal, s-a hotărât ca toate culturile de cartofi să fie arse.

Când tuberculii au fost copti în jar, s-a constatat că au un miros și un gust foarte plăcut și că nu produc intoxicații.

De atunci se utilizează numai tuberculii, după cum spune istorioara relatată.

RECOMANDĂRI TEHAPEUTICE

Intern.

Cartoful are proprietăți diuretice utile în litiaza renală și vezicală datorită conținutului ridicat în potasiu, fiind recomandat și în regimul cardiacilor și bolnavilor renali.

Cât privește recormandarea pentru cardiaci, în anumite limite are o acțiune apropiată de a digitalicelor. Se citează că în timpul primului război mondial, în Viena supusă privațiunilor, se recomanda cu succes, în locul digitalicelor, consumul a câte 1 kg de cartofi pe zi.

În regimurile diabeticilor, înlocuirea pâinii cu 1-1,5 kg cartofi copti în apă sau fierți, o zi pe săptămână, are efecte favorabile și duce la scăderea simptomnelor specifice glicozuriei, poliuriei și polidipsiei, datorită conținutului bogat în potasiu, magneziu, acid citric și acid malic. În fitoterapia aparatului digestiv, consumul cartofilor este util în tratarea gastritelor hiperacide, a ulcerului gastric și duodenal, ca și în dispepsii.

Literatura citează că Alexandre Dumas s-a vindecat de o afecțiune gastrică numai cu regim de cartofi. Contra părerilor generale potrivit cărora cartofii îngrașă, aceștia se recomandă în dieta împotriva obezității, îngrășarea datorându-se grăsimilor sau sosurilor cu care, de regulă, sunt consumați cartofii.

Hepaticilor li se recomandă, de asemenea, cura de cartofi, îndeosebi celor cu litiază biliară. Se mai citează utilizarea lor pentru suferinzi de hemoroizi.

Extern.

Cartofii reprezintă un excelent maturativ și calmant în panarițiu și contuzii.

De asemenea, ei sunt un remediu simplu și eficace contra arsurilor și insolațiilor, precum și în unele forme de iritații ale pielii.

Inhalațiile cu aburi de cartofi sunt utile în afecțiuni ale căilor respiratorii însoțite de tuse uscată. În fine, aplicațiile locale dau bune rezultate și în retragerea edemelor pleoapelor.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumați ca atare în preparate culinare ușoare, în special copti sau fierți în coajă.

Suc proaspăt, cu deosebire în afecțiuni gastrice.

Cataplasme cu tuberculi cruzi rași, contra arsurilor și insolațiilor.

Cataplasme cu cartofi fierți, ca maturativ în panarițiu și contuzii.

Pudră din făină de cartofi, presărată pe piele, pentru atenuarea iritațiilor.

Inhalații cu abur de cartofi fierți pentru calmarea tusei.

Observații.

Partea aeriană a Cartofului se folosea odinioară în cataruri pulmonare și nevralgii, practică părăsită astăzi, fiind riscantă din cauza solaninei care este prezentă în lujeri, în mugurii germinați și în părțile verzi ale unor tuberculi.

În uz extern, cataplasmele sunt calmante și emoliente.

TOMATELE

LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL. (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) (FAM. SOLANACEAE)

Planta este originară din Peru, unde era cultivată în grădinile aztecilor, iar numele ei a rămas nealterat: „tomata”.

Sub denumirea de „mere peruviene”, tomatele aduse de conchistadori în Europa au fost primite cu rezerve, fiind folosite la început ca plante ornamentale, cu fructele lor roșii și mici cât cireșele, pentru ca abia spre sfârșitul sec. al XVIII-lea să fie ameliorate și introduse în rândul plantelor alimentare de mare importanță.

Ca și în cazul altor plante, în patria de origine se pare că tomatele au fost folosite inițial în scop medicinal. Totuși, astăzi plasăm tomatele în rândul legumelor cu importanță medicinală moderată.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Tomatele conțin 90% apă, cca 2% protide, 3% hidrați de carbon, 6 mg% sodiu, 285 mg% potasiu, 13 mg% calciu, 25 mg% fosfor, 0,5 mg% fier, 130 mg% vitamina A, 0,03-0,05 mg% vitamina C și mici cantități de vitamina E și K. Conținutul în lipide este redus (0,03%).

Dintre acizii organici sunt prezenți: acidul citric, malic, pectic, precum și oxalați etc.

Microelementele sunt prezente prin: magneziu, zinc, cupru, nichel, cobalt, brom și iod.

Culoarea roșie a tomatelor este datorată prezenței carotenoidului lycopină care este ușor absorbit de organism, fiind un antioxidant eficient care apără corpul de radicalii liberi, în special în asociere cu vitaminele E și C. Valoarea energetică este de 16 kcal la 100 g din care se resoarbe 89%.

RECOMANĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Prin consumul de tomate se realizează o micșorare a vâscozității sângelui și, prin aceasta, o reducere a riscului de tromboză și ateroscleroză, ca și o ameliorare a afecțiunilor vasculare.

Ele sunt utile în hipoaciditate și în atonia stomacului, stimulând secreția de suc gastric și având același efect și asupra secreției pancreatice.

Tomatele sunt ușor laxative și diuretice, cu eliminarea de urați, fiind utile în azotemie și litiază urică.

Având o valoare nutritivă redusă, sunt indicate în curele de slăbire, iar conținutul ridicat în vitamine le face să fie indicate în hipovitaminoze.

Prin conținutul ridicat de oxalati, tomatele sunt contraindicate în tendințe de litiază oxalică și alte diateze oxalice.

Extern.

Tomatele reprezintă un adjuvant util în acnee.

Cosmetică.

În cosmetica tenului, ele se recomandă ca fiind foarte active în curățirea tenurilor grase, cu puncte negre.

De asemenea, se află printre vegetalele cele mai importante în cosmetica mâinilor, catifelându-le și atenuând sau îndepărtând în special iritațiile produse de detergenți.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare.

Suc, în special în dieta de slăbire.

Mască de ten cu fructe zdrobite, ținute cel puțin 20 minute pe față.

Tamponarea obrazului cu felii de tomate, de mai multe ori pe zi, în cure de 3-4 săptămâni, contra acneei.

Lapte nutritiv pentru cosmetica mâinilor: din 50 ml suc de tomate, o linguriță de glicerină și un vârf de cuțit de sare; se lasă cât mai mult să pătrundă în dermă și se masează pielea ușor.

Există și suplimente nutriționale care conțin extract uscat de tomate, cum este produsul Herbaforte (Fares Orăștie), Splendor Ltd, VITA-CAPS.

ARDEIUL

CAPSIUM ANNUUM L. (FAM. SOLANACEAE)

Originar din America de Sud și Centrală, amintit chiar de către medicul lui Columb, Chanca, în timpul celei de a doua expediții din 1494, care arată că, sub numele de Agi, era folosit de indigenii din Hispaniola.

Adus în sec. al XVI-lea în Europa și descris amănunțit de Clusius în 1584, este una din legumele de mare importanță și totodată cu o mare variabilitate.

Cele mai importante varietăți sunt: var. Grossum (L.) Sendter — Gogoșarul, Ardeiul gras; var. longum (DC) Sendter — Ardeiul lung; var. Cerasiforme Willd — Ardeiul cireașă; var. Frutescens L. — Ardeiul iute de Cayenne.

După altă clasificare, Ardeiul gras, Gogoșarul și Ardeiul lung ar intra în subspecia *Macrocarpum*, în timp ce Ardeiul iute, în subspecia *Microcarpum*.

Cel mai important, din punct de vedere medical, este Ardeiul iute, cunoscându-se faptul că Szent Gyorgy a fost răsplătit cu un premiu Nobel pentru obținerea pentru prima dată a vitaminei C tocmai din Ardeiul iute.

În România, se cultivă pe cca 15.000 ha.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conținutul în protide este redus (1 %), iar în hidrocarbonate este de cca 4%.

Dintre glucide, în funcție de soi sau de varietate, ardeii conțin glucoză (7,33% s.p.), fructoză (1,99% s.p.), zaharoză (0,34% s.p.), amidon (1,78-4,40% s.u.), precum și hemiceluloză (0,85-3,14 g% s.u.), substanțe pectice (7,8-9,8 g% s.u.), celuloză 14,83 g% s.u. în fructele verzi și 13,50 g% în fructele uscate. Conținutul în lipide este de 0,33%, iar în carotenoide de 127-284 mg/kg. Se adaugă și mici cantități de ulei volatil (după C. Pârvu, 1997). Conține mici cantități de sodiu (2 mg%), 165 mg% potasiu, 9 mg% calciu, 20 mg% fosfor și 0,6 mg% fier, iar dintre microelemente sunt prezente Mn, Cu, Co. Conținutul în vitamina C este remarcabil, cca 150 mg%, în vitaminele B1 și B2 câte 0,05 mg%, iar în vitamina A 230 ug%. Varietatea iute conține o substanță iritantă, revulsivă: capsicina.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

În afară de proprietățile vitaminizante comune tuturor varietăților de Ardei, celelalte utilizări se datorează proprietăților iritante ale Ardeiului iute.

Prin acestea este un excitant digestiv, util în dispepsii atone, însă reversul este contraindicația pentru gastrite, ulcere, hemoroizi, stări digestive — afecțiuni pe care le agravează.

Foarte interesantă este recomandarea pentru persoanele care vor să se dezobișnuiască de consumul băuturilor alcoolice, tinctura de Ardei iute putând fi recomandată în cure de dezalcoolizare, când apare „nevoia” de a bea.

Extern.

Ardeiul iute, datorită proprietăților iritante, este revulsiv și ruberifiant, fiind recomandat în lumbago, alergii reumatice, crampe musculare, entorse.

Tot prin efectul stimulant se recomandă în oboseala corzilor vocale.

Se citează și utilizarea în angine.

Cosmetică.

Ca energetic tonic capilar, recomandarea tincturii de Ardei iute se bazează pe faptul că, prin efectul revulsiv, circulația sangvină în zonă este stimulată, provocându-se o irigare mai bună, deci o troficitate crescută la nivelul rădăcinii firului de păr.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat ca atare.

Decoct cu 1-2 ardei iuți ia 100 ml apă în gargarisme pentru combaterea oboselii corzilor vocale.

Aplicații pe gât cu ardei iute mărunțit și încălzit, contra anginei.

Principalul preparat este tinctura din 20 g ardei macerați 7-8 zile în 100 ml alcool, utilizată astfel: 1-30 picături într-un ceai amar (de ex. de Lichen de piatră, Anghinare, Unguraș, Schinel, Țintaură), luate, în cura de dezalcoolizare, în locul băuturilor alcoolice.

Extern.

Fricțiuni stimulente energice la rădăcina părului, comprese cu tinctură în combaterea algiiilor, pentru prepararea vatei termogene.

PĂTLĂGELELE VINETE

SOLANUM MELONGENA L. (FAM. SOLANACEAE)

Relativ târziu introduse în cultură (sec. al XV-lea), provenind din India, China și Birmania, unde cresc în stare sălbatică, Pătlăgelele vinete sunt mult apreciate pentru valoarea lor culinară, însă se digeră mai greu, fiind mai puțin recomandate sau chiar contraindicate în afecțiunile stomacale și intestinale.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conțin 92% apă, 1,3% protide, 0,2% lipide, 5,5-6% hidrați de carbon și numeroase săruri minerale: sodiu 5 mg%, 220 mg% potasiu, 10 mg% calciu 15 mg% fosfor, 0,5 mg% fier, 15 mg% sulf, precum și magneziu, mangan, zinc, cupru, iod, ca microelemente. Pătlăgelele vinete conțin cca 4 ug% vitamina A, 0,05 mg% din vitaminele B1 și B2, 0,06 mg% niacină și cca 6 mg% vitamina C. Ca atare (fără ulei), au valoare energetică redusă: 27 kcal la 100 g parte comestibilă.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Pătlăgelele vinete sunt recomandate în bolile cardiovasculare, renale, hepatice, în diabet, în reumatism, gută, iar în afecțiunile pancreatice ca stimulent.

Au și proprietăți ușor diuretice, fiind recomandate în oligurie.

Literatura de specialitate citează și proprietățile sedative și tonice în anemie.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate sub formă de preparate culinare. Frunzele sub formă de cataplasme în arsuri, abcese, hemoroizi.

GRUPA VERZEI

Este o grupă extrem de unitară, formată din plante bianuale aparținând nu numai aceleiași familii (Cruciferae), ci chiar și aceleiași gen (Brassica).

Originare din bazinul mediteranean, ele constituie produse alimentare de bază.

Varza (cu diferitele ei varietăți) are și o mare importanță fitoterapeutică, în timp ce pentru altele (Conopida) nu sunt citate utilizări medicinale.

VARZA

BRASSICA OLERACEA L. (FAM. CRUCIFERAE)

Plantă cultivată de mai bine de 7 milenii în Europa, Varza a fost apreciată pentru proprietățile terapeutice de către Hippocrate, Chrysip, Pliniu cel Bătrân, Galen, ajungându-se a fi considerată un adevărat panaceu, ceea ce l-a făcut pe Caton Cenzorul să afirme că prin folosirea curentă a Verzei de către romani, aceștia se vor putea lipsi de medici pentru mii de ani.

Dar cum imperiile nu durează milenii, nici conceptul de „panaceu” nu a rezistat timpului.

Fitoterapia modernă, mai analitică și mai critică, îi recunoaște însă Verzei o serie de proprietăți foarte importante, care fac din ea un veritabil „aliment-medicament”.

Încă din secolul al XVI-lea se cunoștea proprietatea de-a ameliora ulcerul gastric.

Dintre varietățile de Varză, cele mai importante din punct de vedere medicinal sunt următoarele: var. capitata L. forma albă (Lam.) D.C. — Varza albă; var. capitata L. forma rubra L. — Varza roșie; var. gemmifera D.C. — Varza de Bruxelles.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

În funcție de varietate, Varza conține apă între 85% (Varza de Bruxelles) și 92% (Varza albă).

Și conținutul în protide este diferit: Varza albă conține cca 1%, în timp ce Varza de Bruxelles 4%.
Conținutul în grăsimi este cuprins între 0,2-0,9%, iar cel în hidrați de carbon între 3,5-11,2 (Varza albă).
Conținutul în sodiu este între 6-10 mg% la Varza de Bruxelles.
Conținutul în calciu este de 35 mg%, în fosfor între 20-70 mg%, în fier între 0,4-0,9 mg%.

De menționat este faptul că poluarea mediului determină acumularea unor microelemente ca: Sr, Pb, Cd, Co, Cr, Ni, As, Hg, unele dăunătoare pentru organism.

Deci atenție la proveniență!

Conținutul în vitamina A este de numai 6 ug% la Varza albă, iar la cea de Bruxelles de 65 ug%.

Conținutul în vitaminele B1 și B2 este de 0,05-0,10 mg%, în niacină 0,03-0,05 mg%, iar în vitamina C 36-84 mg%. Mai conține și vitaminele K și F.

Valoarea conținutului în aceste substanțe la Varza roșie se situează între Varza albă și Varza de Bruxelles.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Varza are un efect deosebit asupra gastritelor hiperacide și ulcerului gastric, datorită acțiunii conjugate a vitaminei U (ca protectoare a mucoasei) și vitaminei K — antihemoragice, citându-se experiențele făcute la Universitatea Stanford — USA, conform cărora din 65 cazuri au fost vindecate 62 în timp de 3 săptămâni.

În mod secundar, dă rezultate bune în senzațiile de pirozis, vomismente, catar, dispepsii hepatobiliare. Îndeosebi Varza roșie, datorită acidului lactic, este un dezinfectant al tractului digestiv și stimulentă a digestiei, iar zeama este puternic laxativă, în timp ce Varza ca atare este antidiareică.

Sucul de Varză are acțiune anti-parazitară (antihelmintică) contra oxiurilor și limbricilor.

În privința aparatului respirator, Varza (în special cea roșie) este un bun pectoral în bronșite, laringite, alte forme de catar al căilor respiratorii, cu efecte favorabile și în astm.

Cura de Varză are o acțiune diuretică marcantă, ducând la resorbția edemelor.

De asemenea, se recomandă în litiaza urinară.

Prin diureza crescută, se ameliorează stările de ascită și ciroza.

Principiul hipoglicemiant conținut în Varză, destul de activ, dar instabil, o recomandă, nu ca tratament propriu-zis, ci ca aliment în dieta diabeticilor.

Acțiunea este și mai puternică pentru Varza de Bruxelles.

Un grup de cercetători ai Universității din Texas au preparat din Varza albă un extract numit „glutamină”, care a fost utilizat în tratamentul alcoolismului.

Aceiași cercetători au demonstrat că sucul celular de Varză albă este eficient nu numai în ulcerele gastrice și duodenale, dar și în ulcerul peptic.

Varza este un dezinfectant general, cu efect îndeosebi asupra germenilor Gram-negativi.

Asupra bacilului lui Eberth, agentul febrei tifoide, are o acțiune bacteriolitică remarcabilă, datorită acidului lactic care se formează prin păstrarea Verzei albe crude.

Pentru a încheia acest tablou vast, nu trebuie uitată proprietățile antianemice și sedative, ca și efectul favorabil în artrite (în acest caz asociindu-se cu tratamentul extern).

Extern.

Din medicina tradițională se cunosc recomandările Verzei pentru calmarea durerilor musculare, a nevralgiilor reumatismale (cu efect deosebit în lumbago, sciatică), gutoase, ba chiar faciale și dentare. Proprietățile decongestive, cicatrizante și antiseptice fac din ea un remediu în contuzii, plăgi (chiar pentru cele grave, atone, cu procese cangrenoase, necroze). Aceleași proprietăți, împreună cu cea de regenerare tisulară, fac utilă Varza în ulcere varicoase, arterite, alte afecțiuni vasculare manifestate la vasele superficiale (ca, de exemplu, hemoroizi).

Pentru proprietățile maturative, se folosește în abcese, flegmoane, furuncule, panarițiu. Ajutând cicatricea, producând o intensificare a circulației în zona interesată, Varza se recomandă atât pentru degerături, cât și pentru arsuri, calmând totodată durerile provocate de Zona Zoster.

În afecțiuni dermatologice, are o acțiune pozitivă în diverse tipuri de eczeme și acnee.

Tratamentul extern se poate asocia cu cel intern în colici nefritice, dar mai ales în afecțiuni pulmonare (bronșite, pleurezii) sau cataruri ale căilor respiratorii superioare. Este studiat efectul pe care îl are asupra tumorilor externe, citându-se unele rezultate încurajatoare.

Cosmetică.

Sucul de Varză se utilizează contra acneei.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumată ca atare, în salate de crudități sau preparate culinare ușoare (pentru care se recomandă 300-400 g pe zi).

Cure de suc, un pahar pe zi, între mese.

Odinioară, marele savant rus Mecinikov spunea: „în regiunile unde se consumă multă Varză crudă, longevitatea este mult mai mare.”

Decoct pectoral pentru fluidificarea secrețiilor bronșice, preparat din 60 g la 0,5 l apă, adăugându-se 70 g miere.

Varza fiartă îndelung, cu efecte antidiareice.

Gargarisme cu suc și miere (sau gălbenuș de ou bătut cu suc de Varză).

Aplicații direct pe piele cu frunze strivite (cu o sticlă de 1 litru) pe o masă și curățate de nervura principală, fixate cu un pansament.

Se schimbă de 2 ori pe zi.

Loșionări cu suc proaspăt pentru acnee.

CONOPIDA

BRASSICA OLERACEA VAR. BOTRYTIS SUB VAR. CAULIFLORA

Are proprietăți similare cu Varza.

Sub aspect alimentar, prezintă avantajul că are un conținut mai scăzut în celuloză.

Compoziția chimică este asemănătoare Verzei, diferind doar cantitativ.

în stare proaspătă, Conopida conține 90-94 % apă, 2,2-2,8 g % proteine, 0,3 g % lipide, 3,5 g% glucide, vitamina A (0,04 mg%), B1 (0,1 mg%), PP (0,6 mg%), C (59-135 mg%), vitamina B6 și K în cantități mici. Dintre sărurile minerale sunt prezente: Na (10 mg%), K (420 mg%), Ca (25 mg%), Mg (17 mg%), Fe (1 mg%), Cu (0,14 mg%), P (60 mg%), S (29 mg%), Cl (30 mg%), iar dintre microelemente: Zn, Mn, B, Si, F, I.

GULIA

BRASSICA OLERACEA L VAR. GONGYLODES (FAM. BRASSICACEAE CRUCIFERAE)

Desigur că aducerea din Lumea Nouă, imediat după descoperirea ei, a unor alimente de mare importanță — să nu numim

dintre ele decât Porumbul, Cartoful, Tomatele — a schimbat cu totul ponderea diverselor resurse vegetale în alimentație.

În mod inevitabil, alte legume au cunoscut un recul, acesta fiind și cazul Guliei, legumă bine cunoscută din Antichitatea greacă și romană.

Pliniu cel Bătrân o numește „Varză pompeiană”, iar apoi o găsim menționată în grădinile lui Carol cel Mare, ca și în opera reformatorului agronomiei franceze de la granița secolelor al XVI-lea-al XVII-lea, Olivier de Serres. Provenită din specia spontană Brassica rupestris, originară din zona mediteraneană, Gulia este rudă apropiată cu Varza, având însă particularitatea de a depune în țesutul parenchimatic al tulpinei substanțe de rezervă, aceasta dezvoltându-se foarte mult și reprezentând partea utilizată în alimentație.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Gulia conține cca 89% apă, 1,8-2,5% protide, 5,9% glucide, 0,2% grăsimi, 1,7% celuloză.

Mai conține mici cantități de provitamina A, vitaminele B1 și B2, C și săruri minerale.

Valoarea calorică este de 36 kcal pentru 100 g.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Sub raport terapeutic, Gulia are o valoare mai modestă decât Varza.

Consumul guliilor are o oarecare acțiune diuretică, contribuind și la resorbția edemelor.

Sunt, de asemenea, slab pectorale, utile în bronșite, laringite, alte forme de catar ale căilor respiratorii.

Gulia are proprietăți antidiareice.

Cu maioneză preparată din gălbenuș de ou, untdelemn și suc de lămâie, ea este un aliment nutritiv ușor asimilabil.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumată ca atare sau sub formă de suc în afecțiuni stomacale, ca hiperaciditatea.

Ca antidiareic, un decoct prelungit cu cca 200 g la litru.

Sub formă de supă dietetică.

GRUPA LEGUMELOR DE LA CARE SE CONSUMĂ FRUNZELE

Grupă de plante alimentare cultivate sau provenind din flora spontană. Din punct de vedere botanic, gruparea este eterogenă, speciile respective provenind de la reprezentanți ai familiei Urticaceae (Urzica), Chenopodiaceae (Spanacul, Loboda), Polygonaceae (Ștevia, Măcrișul), Ranunculaceae (Untișorul), Cruciferae (Năsturelul) și Compositae (Andivele, Salata verde), având comun faptul că de la ele se consumă frunzele și porțiuni din părțile aeriene.

Plantele din această grupă arbitrară prezintă avantajul că majoritatea dintre ele apar primăvara timpuriu, fiind principala sursă de vitamine în această perioadă, când celelalte fructe și legume sunt în cantitate mai mică și, prin conservare, își pierd o parte din proprietățile alimentare și terapeutice.

URZICA

URTICA DIOICA L (FAM. URTICACEAE)

Atât Urzica mare (*Urtica dioica*), cât și Urzica mică (*Urtica urens* L.) sunt specii răspândite aproape pe întreg globul terestru.

În unele părți ale zonelor tropicale și subtropicale, planta ajunge la 4 m înălțime și are tulpina lemnoasă ca orice arbust.

Cunoscută de multă vreme, încă din Antichitate, ca plantă textilă, alimentară și medicinală, Urzica mare este întâlnită în comerț ca materie primă farmaceutică sub denumirea de „Herba et Radix Urticae majoris”, iar Urzica mică sub denumirea de „Herba et Semen Urticae minoris”.

De la ambele specii se recoltează în scop alimentar tulpinile foarte tinere și frunzele care apar primăvara devreme.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Urzica conține protide formate dintr-un mare număr de aminoacizi, substanțe de natură glucidică, amine, steroli, hormoni vegetali, enzime, cetone (metilheptenona și acetofenona), ulei volatil, substanțe grase, acid formic și acetic, provitamina A, vitaminele B1, B2, C și K (cca 400 U.I. pe gram), acid pantotenic, acid folic, clorofilă (0,3-0,8%), protoporfirină și coprotoporfirină, beta-caroten, taninuri, săruri de potasiu, calciu, magneziu, fier, siliciu, fosfați etc. Substanța vezicantă pentru piele a plantei proaspete este formată din acid formic, o enzimă și o toxalbumina, substanță puțin definită din punct de vedere chimic. Prin opărire sau prin uscare, aceste substanțe își pierd proprietățile vezicante.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

În literatură veche și în medicina tradițională, gama recomandărilor terapeutice ale Urzicii este mare și variată.

Cercetările mai recente au confirmat o parte din aceste recomandări, care se referă la acțiunea hemostatică (vitamina K și taninuri), astringentă, hematopoetică, ușor hipoglicemiantă, diuretică sau extrem antiseptică și stimulatorie a epitelizării tegumentelor lezate.

Tot experimental, s-a dovedit că extractul apos inhibă dezvoltarea diferiților agenți patogeni din genurile *Shigella*, *Staphilococcus*, *Pasteurella* ș.a.

Acțiunea diuretic-depurativă se manifestă prin eliminarea acidului uric, a clorurilor și a ureei. Pe baza acestei acțiuni este justificată utilizarea empirică în staze, edeme, gută, reumatism și ca depurativ al țesutului conjunctiv.

În stare tânără, când conținutul în substanțe vezicante este extrem de redus, este considerată ca un bun aliment și medicament.

Stimulează pofta de mâncare.

Conținutul mare în secretină o situează pe același plan cu Spanacul.

Stimulând secrețiile gastrice, intestinale și pancreatice, și utilizarea în insuficiența gastrointestinală și pancreatică este justificată.

Prin conținutul ridicat în clorofile, xantofile, fier și vitamina C, accelerează hematopoeza, fiind recomandată în anemia cu deficit de hemoglobină și eritrocite.

Extern.

Pe lângă acțiunea favorabilă de epitelizare a tegumentelor, clorofila extrasă din Urzică este utilizată în industria cosmetică, în compoziția pastei de dinți, a șamponului, precum și în dermatologie.

Tinctura de rădăcină de Urzică se utilizează, în amestec cu alte tincturi din plante, contra căderii părului.

În medicina tradițională la diferite popoare, frunzele de Urzică proaspete se utilizează ca revulsiv în algii reumatismale, lumbago și sciatică.

Nu este de neglijat nici această utilizare, exceptând persoanele care prezintă intoleranță la acest tratament destul de curajos.

MOD DE INTREBUINȚARE

În stadiu foarte tânăr, sub formă de salată asociată cu Păpădie și Lăptucă, cu puțin untdelemn și lămâie, sau sub formă de suc celular obținut prin presare puternică sau la mixer.

Se adaugă apă până la de 5 ori greutatea plantei.

Se beau zilnic 80-100 ml.

Sub formă de mâncare, preparată la fel ca Spanacul (cu Usturoi, după gust) sau sub formă de supă.

Sub formă de infuzie preparată din frunze uscate, cu 1-2 linguri frunze la o cană.

Se beau 2-3 căni pe zi.

Sub formă de decoct (5 minute), 1-2 linguri frunze la o cană de apă. Se beau 3 căni pe zi.

Extern.

Contra căderii părului se prepară un decoct din 250 g rădăcini sau frunze mărunțite la 1 litru apă, lăsând să fiarbă la foc mic în vas bine închis, timp de 1/2 oră, putându-se adăuga câteva linguri de oțet.

Cu loțiunea astfel obținută se spală părul o dată pe săptămână.

Are în prezent numeroase utilizări în produsele cosmetice.

În ulcerul varicos și în tratamentul paleativ al reumatismului se recomandă infuzia din frunze, 40-50 g la 1 litru apă clocotită.

Se lasă acoperită 20-30 minute și se strecoară.

Se fac băi locale sau se aplică sub formă de cataplasme.

Pentru tratarea stomatitelor se utilizează infuzia (2 linguri frunze mărunțite la 200 ml apă clocotită).

După răcire, se strecoară și se face gargară.

Pentru tratarea rănilor și grăbirea cicatrizării, se utilizează tot sub formă de infuzie, 3-4 linguri de frunze mărunțite la o cană cu apă, sub formă de băi locale sau comprese.

În medicina veterinară empirică se utilizează pentru tratarea bolilor digestive respiratorii și renale. (după C. Pârvu, 1997).

SPANACUL

SPINACIA OLERACEA L. (FAM. CHEOPODIACEAE)

Introdus în Europa din Persia pe două căi, prin arabi în Spania și prin cruciați, Spanacul era la mare preț la arabi, care îl considerau „prințul legumelor”.

A fost introdus în cultură încă din secolul al IV-lea.

În prezent se cultivă în zonele temperate și chiar nordice.

Se poate cultiva până la 2000 m altitudine.

În țara noastră există două anotimpuri de producție optime: primăvara devreme și toamna.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conținutul de protide este de 2-14%, iar cel în hidrați de carbon de 3,6%.

Glucidele și mucilagiile pot ajunge până la 7%, iar lipidele sunt în cantitate redusă (0,5%).

Conține clorofile și spinacine (arginină și lizină).

Bogat în săruri minerale: 50 mg% sodiu, 540 mg% potasiu, 85 mg% calciu, 35 mg% fosfor, 5,2 mg% fier.

Este foarte bogat în vitamina A (600 u.g%) și conține 0,5 mg% vitamina B1, 0,20 mg% vitamina B2, 0,5 mg% niacină și 50-60 mg% vitamina C.

Conține și o serie de microelemente ca: magneziu, mangan, sulf, cupru, iod, arsen.

Valoarea energetică nu este prea mare: 18 kcal la 100 g.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Este un excelent remineralizant.

Îl se citează în principiu proprietăți laxative și mai ales depurative (de activare a eliminării toxinelor), foarte importante mai ales în cura de primăvară.

Prin conținutul în săruri minerale, în arginină, lizină, protide și vitamine, Spanacul este deosebit de util ca antianemic, pentru convalescenți și în hemoragii.

Spanacul acționează și ca un activator al secreției pancreatice.

Într-o măsură mai mică, are și rol de tonic cardiac.

Prin conținutul bogat în săruri minerale, vitamine și factori biotici și microelemente absolut necesare organismului, Spanacul combate hipovitaminoza C, elimină toxinele din umori (prin acțiunea diuretică), este ușor hipotensiv, tonifică miocardul, stimulând activitatea inimii, stimulează secrețiile gastrice, pancreatice și biliare și favorizează creșterea.

Pe lângă reclamele comerciale pentru copii, cu Popey Marinarul, preparatele pe bază de Spanac au în același timp, pe lângă valoarea alimentară, și o valoare incontestabilă de medicamente naturale.

Datorită conținutului de oxalați, Spanacul este contraindicat în artrite, litiaze oxalice, reumatism, gută.

Extern.

Frunzele de Spanac dau rezultate bune în plăgi atone și în pecingine.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat ca atare, mai ales în regimul alimentar al copiilor și al persoanelor mai în vârstă.

Suc, câte un pahar în fiecare dimineață, în depresii fizice și psihice.

Vin tonic, din 750 ml vin și 200 ml suc de Spanac; se bea câte un pahărel de 100 g înainte de masă.

Cataplasme cu frunze fierte în ulei.

Observații.

Se recomandă și semințele, sub formă de infuzie cu 2 lingurițe la cană, ca laxative.

LOBODA DE GRĂDINĂ

ATRIPLEX HORTENSIS L. (FAM. CHENOPODIACEAE)

Specie euroasiatică, cu mare vechime în cultura originală din Asia Centrală și Siberia.

După unii autori, provine din specia *Atriplex nitens*, introdusă în cultură.

Principalii constituenți sunt similari cu cei ai Spanacului, având în plus antociani încă neidentificați fitochimic.

În trecut era considerată plantă medicinală, fiind recomandată în afecțiuni hepatice, renale sau în afecțiuni ginecologice.

Semințele ei au efecte vomitive și purgative.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Ca și Spanacul, este o plantă diuretic-depurativă, remineralizantă și vitaminizantă, având recomandări terapeutice asemănătoare.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumată ca atare în salate sau preparate culinare.

MACRIȘUL, ȘTEVIA

RUMEXACETOSA L. R. PATIENTIA L. (FAM. POLYGONACEAE)

Specii perene foarte înrudite, care se găsesc și în flora spontană, cu recomandări terapeutice reduse. Erau cunoscute ca antiscorbutice.

Astfel, iubitorii cărților lui Jules Verne își aduc aminte, poate, de bucuria naufragaților din „Insula misterioasă” care, găsind Măcriș, s-au considerat salvați de scorbut.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Ambele specii conțin cca 1% acid oxalic, grăsimi în cantități reduse, emodine și acid crizofaic (care explică acțiunea laxativă), acid tartric și cantități apreciabile de acid ascorbic (vitamina C).

Dintre minerale sunt prezente cele de calciu, potasiu, fier și magneziu.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Dacă proprietățile antiscorbutice, deși reale, sunt acum mai mult de interes istoric, în schimb proprietățile depurative sunt prețioase pentru cura de primăvară, pentru eliminarea din organism a „deșeurilor” acumulate din cauza alimentației specifice din perioada de iarnă.

Ambele plante sunt ușor diuretice și laxative, tonice și remineralizante.

Există însă și o serie de contraindicații severe — în colici nefritice și litiaze oxalice.

De asemenea, nu se vor consuma de către suferinzii de ulcer sau de gastrită hiperacidă.

Extern.

Ștevia și Măcrișul au proprietăți maturative în abcese și furuncule.

Se citează efecte favorabile în pecingine.

În ultimul timp, la noi Ștevia se utilizează din ce în ce mai mult în locul Spanacului.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare, sub formă de salată în amestec sau în preparate culinare simple.

Infuzie diuretică, depurativă, se prepară cu 20-30 g frunze la litru de apă.

Cataplasme calde cu frunze de Ștevie sau Măcriș și un volum egal de untură (medicina populară).

Se utilizează pentru maturarea furunculelor și abceselor.

Specia Rumex acetosella L. denumită popular Măcriș mărunț, foarte răspândită în întreaga țară, prin pășuni, fânețe, locuri cultivate, nisipoase, turboase sau locuri uscate sărace în calcar, până la 1800 m altitudine, intră în compoziția ceaiului „Essiac Tea” alături de Brusture (Actium lappa) și două plante exotice, fiind mult mediatizat în tratamentul unor boli canceroase.

UNTIȘORUL

RANUNCULUS FICARIA L. (FAM. RANUNCULACEAE)

Specie răspândită în Europa, Caucaz, Siberia de vest și în Asia Centrală. La noi este comună în întreaga țară și crește pe sol umed în păduri, tufișuri, livezi, parcuri și grădini, de la șes până la munte. Se mai numește Grăușor. Frunzele conțin săruri minerale, protide și hidrați de carbon în cantități mici și vitamina C în cantități apreciabile. La maturitate, frunzele și fructul plantei sunt toxice. În trecut, rădăcinile și fibrele tuberizate, frunzele și tulpinile cunoscute sub denumirea de „Radix et Herba Chelidonii minoris” (denumire improprie), erau utilizate în afecțiuni ale pielii, în hemoroizi, scorbut etc. Aceste utilizări sunt astăzi anacronice. În prezent se întrebuințează, numai sub formă de salată, frunzele tinere în cure de primăvară, pentru aportul de vitamina C și săruri minerale.

NĂSTURELUL

NASTURTIUM OFFICINALE R. Br. (FAM. BRASSICACEAE — CRUCIFERAE)

Cunoscut și sub denumirea de Hreniță, Creson, Brâncuță de apă sau Frunza voinicului, Năsturelul este o plantă caracteristică izvoarelor și pâraielor limpezi.

În funcție de sol și altitudine, are înălțimea de la 25 la 90 cm și se recunoaște prin frunzele penatcompuse, cu gust asemănător Hreanului.

Este una din cele șapte feluri folosite la masa rituală a Paștelui evreiesc.

(Se pare că și Iisus s-a hrănit cu ea.)

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Protide și hidrați de carbon în cantități mici, substanțe minerale în cantități apreciabile, în special fier, magneziu, fosfor, iod (45 mg%), calciu (200 mg%) și arsen, cupru, zinc și sulf, sub formă de microelemente. Conține cantități mari de vitamina C (140 mg%), precum și vitaminele A, B1, B2, niacină și vitamina E.

Mai conține un produs sulfo-azotat cu gust de muștar și o substanță amăriră.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Se consumă numai în stare crudă, proaspăt recoltat de pe locuri curate, unde nu pășunează vitele, deoarece poate transmite parazitoze și alte boli.

Recoltate înainte de înflorire, frunzele se spală bine în vederea întrebuințării.

Intern.

Pe lângă utilizarea ca salată de primăvară (la munte se poate consuma și vara), Năsturelul are și o serie de indicații terapeutice: în astenie, anorexie, anemie, tuberculoză, bronșite, litiază biliară, eczeme, reumatism, parazitoze intestinale, diabet și chiar în cancer.

Majoritatea acestor recomandări rămân însă să fie verificate.

Extern.

Se recomandă în alopecie, în plăgi greu vindecabile și în ulcerații cutanate.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat sub formă de salată.

Suc proaspăt 60-150 ml pe zi, îndoit cu apă rece.

Extern.

Sucul proaspăt, sub formă de fricțiune, este utilizat în alopecie, împiedicând căderea părului. În plăgi, se fac comprese cu frunze proaspete sfărâmate.

PĂPĂDIA

TARAXACUM OFFICINALE WEB Syn. T. DEN-LEONIS DESF. (FAM. COMPOSITAE)

Crește spontan în întreaga Europă, în India, în China, în America, în Africa de Nord și în Iran.

Se pare că printre ierburile amare cu care s-a hrănit Iisus, la Cina cea de Taină, se numără și Păpădia. În țara noastră este una dintre cele mai comune specii, începând din câmpie și până în zona montană superioară.

De multe ori invadează culturile lucerniere.

A figurat ca plantă medicinală în unele zone europene în farmacopei.

În Statele Unite și Canada s-a răspândit atât de mult încât cu greu poate fi combătută ca buruiană invadatoare a peluzelor, parcurilor și grădinilor.

Părțile aeriene ale plantei recoltate în timpul înfloririi conțin grăsimi sub formă de gliceride ale acizilor stearic, palmitic, oleic etc, tanin, flobafencolină, glucoză, polioză, ulei volatil, substanțe antibiotice, substanțe protidice, acid tartric, săruri de azot, magneziu, calciu, fosfați, vitaminele A și B, în special în rădăcini și vitamina C, alcoolii triterpenici (amidiol, faradiol), substanțe de natură carotenoidică, xantofile, flavoxantine etc.

Pentru salata de primăvară se recomandă frunzele tinere, recoltate primăvara timpuriu, înainte de formarea tulpinii florifere.

Nu prezintă nici un risc terapeutic, în schimb, tulpinile florifere, din care copiii își fac lăntișoare, pot provoca intoxicații în cazul în care sunt ingerate de aceștia.

Primele simptome de intoxicație se manifestă prin greață, vomă, diaree și modificarea ritmului cardiac.

Ca prim ajutor se recomandă producerea vomiei, apoi spălături stomacale, cărbune activ, medicamente stimulente ale activității cardiace.

Ca plantă medicinală, Păpădia este considerată tonic amar, aperitiv, drenant și stimulent al secreției hepato-biliare, decongestiv și diuretic.

Dintre numeroasele indicații terapeutice, menționăm:

Intern.

În angicolicile cronice, congestia ficatului, insuficiență hepatică și chiar în icter, litiază renală și biliară, hipercolesterolemie, dermatoze, eczeme, acnee, furunculoză.

Se mai recomandă în gută, reumatism, hiperazotemie, oligurie, insuficiență renală, în constipatii și în enterocolite, tulburări circulatorii, hemoroizi, celulite și chiar și în obezitate.

Toate aceste indicații exhaustive se referă la planta întreagă cu frunze și rădăcini.

Fără nici un risc terapeutic, puteți utiliza planta întreagă uscată, folosind 50 g la 1 litru apă sub formă de infuzie (2 minute), apoi lăsată în repaus 10 minute.

Se beau 3 căni pe zi, înainte de mesele principale.

Extern.

Sucul de rădăcină proaspăt se recomandă în verucoză.

Decoctul de tulpini, frunze și butoni florali (10 g la 250 ml apă) se recomandă împotriva opacifierii cristalinului.

Ceea ce trebuie reținut este faptul că, în salatele de primăvară (Lăptuci, Untișor etc), este bine să se includă și câteva frunze de Păpădie.

ANDIVELE

CICHORIUM ENDIVIA L. (FAM. COMPOSITAE)

Specie originară din zona mediteraneană, Andivele sunt foarte apropiate de Cicoare.

Sunt cunoscute încă din vechime, fiind cultivate de către greci, romani și egipteni.

Se consumă frunzele groase, cărnoase, dispuse în rozetă, etiolate (cultivate la întuneric).

În afara proprietăților alimentare, andivele au și unele proprietăți medicinale.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Andivele, la fel ca și Cicoarea sălbatică, conțin aminoacizi esențiali, protide, grăsimi, amidon, o substanță amară, hidrocarbonate, săruri de sodiu, potasiu, calciu, fier, magneziu, mangan, cupru, fosfați etc.

Dintre vitamine sunt prezente vitaminele B1, B2, C, K și P.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Destul de amare, Andivele stimulează apetitul, fiind tonic-aperitive.

Ele sunt totodată diuretic-depurative, ușor laxative, vermifuge.

Se recomandă în anorexie, în insuficiența biliară, în atonii gastrice și digestive, și ca remineralizant.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate ca atare, în salate de cruditate.

SALATA VERDE

LACTUCA SATIVA L (FAM. ASTERACEAE — COMPOSITAE)

Specie euroasiatică, cunoscută de multă vreme în cultură și apreciată în mod deosebit de romani, își are originea în Salata sălbatică (*Lactuca serriola* Torn.) care crește și în țara noastră. O legendă mitologică pomenește de Junona, care a folosit Lăptuca pentru a o naște pe Hebe fără dureri.

Sucul uscat la spate de la specia viroasă, numit „Lactucarium”, era cunoscut de Dioscoride, Columella și Galen ca antispastic, calmant și narcotic asemănător opiului.

Sub numele generic de „salată” sunt mai cunoscute următoarele varietăți: var. capitata — formează o căpățână

densă; var. ongifolia — frunzele nu se acoperă unele pe altele; var. crispa — cu frunze crețe; var.

asparagina — tulpina tânără foarte cărnoasă, originară din China.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Salata verde de cultură conține: 1%-1,4% protide, urme de substanțe grase, 1% hidrați de carbon, cantități mici de sodiu (5 mg%), 150 mg% potasiu, 15 mg% calciu, 25 mg% fosfor, 0,4 mg% fier, 90 mg% vitamina A, câte 0,05 mg% vitamina B1 și B2, 0,3 mg% niacină și până la 50 mg% vitamina C. Conține 2 unități vitamina E.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Salata verde este o excelentă plantă aperitivă, favorizând digestia și fiind totodată ușor laxativă. Ea calmează inflamațiile dureroase ale ficatului, vezicii biliare și intestinelor, având în plus și o acțiune coleretic-colagogă.

Recomandările marilor medici ai Antichității privind acțiunea antispasmodică și calmantă este bine fundamentată azi, Salata fiind utilizată contra palpitațiilor, tusei spasmodice, ca ușor hipnotică, anafrodiziacă, hipoglicemiantă și laxativă.

Proprietățile diuretice sunt completate de cele privind eliminarea masivă a uraților, de unde recomandările în nefrită, litiază urică, dar și în gută și artrită.

Este, de asemenea, depurativă și emenagogă (favorizând reglarea ciclurilor).

Extern.

Se recomandă contra degerăturilor.

Totodată, având proprietăți maturative, este utilă pentru resorbția furunculelor și panarițiului.

Cosmetică.

Salata verde manifestă o acțiune decongestionantă în cuperoză, recomandându-se totodată pentru tenuri uscate.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumată ca atare; folosită abundant în masa de seară, favorizează instalarea unui somn liniștit și combate constipația, provocând evacuarea bolului intestinal în dimineața următoare.

Decoctul este antispastic, calmant și diuretic.

Se prepară din 60-80 g la un litru de apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Cataplasme maturative calde, ale abceselor, cu frunze fierte.

Loșionări ale tenului cu decoct dintr-o salată la 0,5 l apă, fiert îndelung (cca 2 ore).

Observații.

Semințele au și ele proprietăți medicinale, fiind calmante ale tusei, antispastice, sub formă de infuzie cu o linguriță la cană, 2-3 căni pe zi, iar în uz extern, pot fi folosite în igiena oculară pentru blefarite, conjunctivite, sub formă de spălături locale cu decoct preparat dintr-o linguriță la o cană de apă.

GRUPA LEGUMELOR DE LA CARE SE CONSUMĂ PĂSTĂILE, CAPSULELE ȘI SEMINȚELE

Foarte importante sub acest aspect nutritiv, ele au și importanță fitoterapeutică.

Legumele din această grupă fac parte din familia Fabaceae — Leguminoase (Fasolea, Soia, Mazărea, Bobul, Lintea, Năutul), excepție făcând Bamele (fam. Malvaceae).

De la ele se folosesc fructele proaspete (păstăile de Fasole și capsulele de Bame) sau semințele proaspete la unele dintre ele.

Fiind vorba în acest subcapitol și de semințe, nu putem să nu menționăm specia cea mai importantă din familia Graminaceae din zona geografică care intră în alimentația noastră zilnică: Grâul.

FASOLEA

PHASEOLUS VULGARIS L. (FAM. LEGUMINOASE)

Originară din America Centrală și de Sud, adusă de către conchistadori, a fost considerată destulă vreme o legumă vulgară.

Abia la sfârșitul secolului al XVI-lea, botanistul Lonicer indică unele proprietăți medicinale ale acestei legume. Este cert că, sub aspect alimentar, Fasolea reprezintă un aliment energetic, care acționează favorabil ca tonic al sistemului nervos și muscular.

În fitoterapie, o importanță mai mare o au păstăile verzi și uscate, semințele uscate având utilizări mai reduse. În prezent se cultivă aproape pe toate meridianele lumii.

În România se cultivă începând cu secolul al XVIII-lea.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Fasolea uscată are un conținut ridicat de proteine (21%-25%), în hidrați de carbon (56%), în potasiu (1770 mg%), în calciu (195 mg%), în fosfor (420 mg%) și în fier (7 mg%).

Conținutul în vitamina A este remarcabil (250 ng%), în vitamina B1 de 0,5 mg%, în vitamina B2 de 0,4 mg%, în niacină de 3,4 mg%, iar în vitamina C de 20 mg%.

Dintre microelemente, s-au identificat nichelul, cuprul și cobaltul.

Valoarea energetică, bazată pe conținutul ridicat în protide și hidrocarburi, este de 328 kcal la 100 g semințe uscate, din care se resoarbe peste 80%.

Fasolea verde are un conținut de cca 10 ori mai mic în protide și hidrați de carbon, celelalte elemente fiind și ele mai reduse.

Valoarea energetică este de 31 kcal la 100 g.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Ca toate celelalte leguminoase, fasolea-păstăi este diuretică, utilă nu numai în litiaza renală, oligurie, albuminurie, ci și în diateze urice (reumatism, gută).

Datorită efectului diuretic-depurativ, sucul de păstăi verzi (cca 100 ml/zi) este recomandat în acnee, inflamații cutanate la copii și la adolescenți (acnee juvenilă).

Fasolea verde este și un tonic hepatic și pancreatic, citându-se unele efecte în scăderea glicemiei și recomandându-se, deci, diabeticilor.

Tecile de la păstăile uscate au fost experimentate atât pe animale de laborator cât și la om, dovedind reale proprietăți hipoglicemice, utile în diabet.

Foarte interesante sunt proprietățile tonic-cardiace, recomandându-se administrarea lor, ca medicament adjuvant, în pauza de digitalice.

Extern.

Făina de Fasole are proprietăți calmante, utile în eczeme.

Ea acționează ca maturativ, („de coacere”) în abcese și panarițiu.

MOO DE ÎNTREBUINȚARE

Consumată sub formă de fasole verde, în preparate culinare ușoare.

Suc — utilizat ca diuretic-depurativ. Tinctură din 20 g păstăi la 100 ml alcool, macerat 7-8 zile.

Se administrează 70-120 picături de 4 ori pe zi, în pauza tratamentului cu digitală.

Infuzie (două minute) preparată din 2 linguri teci de Fasole verde uscată și fragmentate la 250 ml apă.

Se lasă apoi la macerat de seara până dimineața și se consumă în timpul zilei 2 căni în tratament de lungă durată, în special pentru scăderea glicemiei în diabet și ca tonic hepatic și pancreatic.

Menționăm faptul că valoarea maximă hipo-glicemiantă o au păstăile încă verzi, când se formează primele boabe, care se usucă.

Tecile de fasole uscate toamna la maturitatea boabelor au acțiune hipoglicemiantă foarte scăzută, deși se folosesc în unele produse sau „Ceaiuri antidiabetice”.

Extern.

Se aplică cataplasme din făină de Fasole, preparată cu apă caldă.

SOIA

GLYCINE HISPIDA (MNCH.) MAXIM SIN. SOYA HISPIDA MNCH. (FAM. FABACEAE — LEGUMINOASE)

Specie originară din China și Japonia.

Soia este tot mai răspândită în special ca plantă utilizată în industria uleiului, ca și în alte ramuri ale industriei alimentare și chiar în fitoterapie.

Considerăm necesară o precizare: în prezent se cultivă peste 30 varietăți și soiuri de Soia, în principal Soia furajeră, Soia pentru ulei și Soia alimentară.

În țara noastră se cultivau următoarele soiuri: Osijek (din fosta Iugoslavie), Dobrogeană, Galbenă de Platt (originară din China), Neagră Platt (tot din China), Riede 521 (soi ameliorat la Bod) și Herb 22 (tot soi ameliorat).

În prezent nu știm ce soiuri se mai cultivă, dar multe produse se aduc de peste hotare, cu mici excepții.

În trecutul nu prea îndepărtat, înainte de 1989, Soia a fost compromisă în țara noastră (și a rămas compromisă în memoria noastră), din cauză că în așa-zisul „parizer” se introduceau șroturile de la Soia furajeră sau cele rezultate de la fabricarea uleiului, la recomandarea așa-zisilor „nutriționiști” care propovăduiau „o alimentație științifică” sau o „alimentație rațională”, fără a avea nici o pregătire în acest domeniu.

Acești „consilieri” ai vechiului regim nu cunoșteau elementara compoziție în elemente nutritive a boabelor de Soia, care conțin uneori peste 40% proteine, având toți aminoacizii esențiali, spre deosebire de carne sau alte produse animaliere care conțin în cel mai fericit caz 25% proteine.

Să nu uităm că Soia a salvat de la lipsa de proteine din alimentație cele mai mari populații ale globului (China și India), iar în prezent se cultivă intensiv în Statele Unite ale Americii, în Franța, Germania și în alte țări europene.

Numai în Statele Unite există peste 50 sortimente alimentare pe bază de Soia alimentară, începând de la aperitive, salamuri, șnițele etc. până la torturi și înghețată!

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Făina de soia integrală este foarte bogată în proteine (37-40%) formate din următorii aminoacizi: leucină, izoleucină, cistină, metionină, fenilalanină, treonină, lizină, valină și tiptofan.

Conține 15-22% grăsimi, 26% hidrați de carbon, 4 mg% sodiu, 1870 mg% potasiu, 195 mg% calciu, 555 mg% fosfor, 12,1% fier, 15 u.g% vitamina A, 0,75 mg vitamina B1, 0,30 mg% vitamina B2, 2 mg% niacină și mici cantități de vitamina C, D și E.

Conține și diastaze, lecitină, ceruri, rezine și celuloză.

Valoarea energetică este de 469 kcal la 100 g. După cum am menționat, boabele de Soia conțin 15-22% grăsimi (uneori la anumite soiuri ameliorate, până la 25%).

Foarte importantă este însă compoziția acestui ulei: 85% acizi grași nesaturați, mono-nesaturați: acidul oleic (25%35%), polinesaturați: acidul linoleic (40-50%), linolenic (2%-10%) și arachidonic. Acizii grași saturați (10%15%) sunt formați din acizii stearic, palmitic, arachidic și lignoceric. Datorită bogăției în acizi grași polinesaturați și datorită prezenței acidului arachidonic, uleiul de Soia are proprietăți hipocolesterolemizante, ceea ce este foarte important. Chiar după utilizarea timp de trei săptămâni în alimentație a uleiului de Soia s-a constatat o reducere semnificativă a „colesterolului rău”.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Datorită conținutului ridicat (85%) în acizi grași nesaturați, îndeosebi derivați ai acidului arachidonic, linoleic, linolenic și oleic, uleiul de Soia este recomandat ca hipocolesterolemizant.

Făina de Soia este aliment ideal pentru diabetici, pentru cei care suferă de reumatism, gută și pentru convalescenți.

Este indicată și în astenii nervoase și surmenaj fizic și intelectual.

Preparatele alimentare de Soia sunt ușor de digerat și au o valoare nutritivă foarte ridicată, ceea ce face ca această legumă să fie într-adevăr considerată drept un aliment complet.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Folosirea în alimentație ca grăsime a uleiului de Soia, fără alte grăsimi, cel puțin 2-3 săptămâni.

Sub formă de „lapte de Soia”, pentru sugari și copii.

Laptele de Soia se prepară din 150 g semințe de Soia îmbibate în 1 litera de apă.

Se ține la extras la temperatura camerei o zi și jumătate.

Se decantează lichidul supernatant (partea limpede de la suprafață) și se filtrează.

Se consumă în aceeași zi.

Peste semințe se mai poate pune încă o dată apă și se repetă operația de mai sus.

MAZĂREA

PISUM SATIVUM L. (FAM. FABACEAE — LEGUMINOASE)

Este una din cele mai cunoscute și mai larg cultivate încă din Antichitate. Recomandările fitoterapeutice sunt minore.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Mazărea uscată conține 22% protide, 1% grăsimi, 59% hidrați de carbon, 30 mg% sodiu, 915 mg% potasiu, 45 mg% calciu, 230 mg% fosfor, 5 mg% fier, 20 ug% vitamina A, 0,7 mg% vitamina B1, 0,2 mg% vitamina B2, 3 mg% niacină și numai 1 mg% vitamina C. Valoarea energetică este de 359 kcal pentru 100 g.

Mazărea verde conține 3% protide, 6% hidrați de carbon, 1 mg% sodiu, 120 mg% potasiu, 10 mg% calciu, 50 mg% fosfor, 0,8 mg% fier, 35 ug% vitamina A, 0,1 mg% vitamina B1, 0,05 mg% vitamina B2, 1 mg% niacină și 25 mg% vitamina C. Valoarea energetică este de 37 kcal pentru 100 g.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Mazărea uscată are proprietăți energetice, deoarece conține o cantitate mare de calorii și este bogată în protide și hidrați de carbon.

Pentru organism este o importantă sursă de fosfor și săruri de potasiu.

Are și acțiune ușor laxativă.

Mazărea verde este ușor digerabilă, dar este contraindicată în enterite.

Din mazărea verde s-a izolat o fitohemaglutină care a fost experimentată în tratamentul anemiei aplastice.

Produce stimularea funcției medulare, aducând-o la normal.
În zootehnie, vrejurile și tecile sunt un furaj bogat în proteine.
Mazărea furajeră intră în nutrețuri combinate.

BOBUL

VICIA FABAL L. (FAM. FABACEAE — LEGUMINOASE)

Plantă originară din bazinul mediteranean, Bobul a avut întotdeauna reputația de diuretic.
Este puțin cultivat astăzi în țara noastră, fiind mai sensibil la boli și dăunători.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conține protide și hidrați de carbon în cantități apreciabile, săruri de sodiu, potasiu, fosfor, calciu, fier, magneziu și mici cantități de vitamina A, B1, B2.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Și astăzi sunt atestate proprietățile diuretice ale semințelor de Bob, care sunt în plus și sedative în dureri urinare, cu efecte favorabile și în albuminurie.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Decoct cu 100 g la 1 litru de apă; se bea în cursul unei zile.

Macerat la rece cu o linguriță de pudră la cană, lăsată peste noapte, pentru a se bea dimineața.

Medicina populară recomandă cenușa obținută din semințe ca diuretic.

Observații.

Florile, sub formă de infuzie, sunt calmante în colici nefritice, în afecțiuni renale acute și în inflamațiile vezicale la bolnavii de prostată, în pielonefrite și reumatism.

INUL

LINUM USITATISSIMUM L. (FAM. LINACEAE)

După unele date, se pare că Inul este originar din Egipt.

În sprijinul acestei ipoteze stă faptul că în vechile morminte egiptene s-au găsit semințe și îmbrăcăminte confecționate din In.

Fiind cultivat aproape pe tot globul de multe secole, originea lui certă nu este cunoscută.

Inul și produsele lui (fibre, semințe, ulei) provin în prezent din Europa, Argentina, Maroc, Turcia, India și alte țări.

Semințele de In utilizate în medicina tradițională chineză provin din Mongolia Interioară și din provinciile Heilongjiang, Liaoning și Jilin. Utilizat și în medicina tradițională indiană, Inul este cultivat extensiv în toată India, în special în Bengal, Bihar și în Provinciile Unite.

Este menționat și în Biblie, în Vechiul Testament (Ieșirea, 28, 42) unde se spune: „Și să le faci lor pantaloni de In, ca să acopere goliciunea trupului...”.

Inul a fost utilizat și în Antichitatea greco-romană în scopuri medicinale, probabil inspirate din medicina egipteană.

Pliniu cel Bătrân citează 30 de remedii în care sunt incluse și semințele de In, atât administrate pe cale orală ca laxative, cât și extern, în preparate topice, locale, pentru inflamații locale.

În farmacopeea ayurvedică se recomandă utilizarea externă sub formă de cataplasme în arsuri și carbuncul (antrax), iar intern ca demulgent (calmant) și laxativ.

în medicina tradițională americană utilizările sunt similare.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Semințele speciei de cultură *Linum usitatissimum* conțin 30—45% ulei gras sicativ format din trigliceridele acizilor linoleic, linolenic, oleic, stearic, palmitic și myristic.

Conțin 20-25% proteine, 3-10% mucilagii formate din polizaharide neutre și acide care după hidroliză dau galactoză (8-10%), arabinoză (9-12%), rhamnoză (13-29%), xyloză (25-27%), acid galacturonic și mannuronic cca (30%).

Mai conțin steroli și triterpene (colesterol, campesterol, stigmasterol și sitosterol), glicozizi cianogenici (0,1-1,5%), în special neolinustatină și monoglicozizi ai linamarinei și lotaustralinei, precum și glicozidul saicoizolaricirezinolului, precursori ai lignanelor, săruri minerale.

Turtele rămase după extragerea uleiului conțin mari cantități de proteine (cca 35%), grăsimi (3-6%), săruri minerale, reprezentând o materie prima de bună calitate pentru nutrețuri combinate, dar care trebuie prelucrate rapid pentru a nu râncezi, când devin iritante.

Fibrele conțin celuloză (86-90%), substanțe pectice (1-2%), ceară, substanțe grase și lignină în cantități mai mici.

În cenușa fibrelor au fost puse în evidență calciu (50%), potasiu (17%), siliciu (13%), fier și aluminiu (8%).

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Utilizările semințelor de *Ln* în terapeuica modernă se bazează pe utilizarea multi-milenară a acestora în medicina tradițională, dar și pe studii „in vitro” și „in vivo” pe animale, pe studii cu privire la substanțele nutriționale în dietă la oameni.

În prezent, cercetările sunt îndreptate spre efectele preparatelor pe bază de semințe de *Ln* în carcinogeneză și în tratamentul lupusului asociat cu nefrite, în efectele favorabile în funcția arterială și în agregarea trombocitară.

Comisia E (Comisia oficială a Ministerului Sănătății din Germania pentru avizarea produselor fitoterapeutice) a aprobat utilizarea în uzul intern a semințelor de *Ln* în constipațiile cronice, în afecțiunile colonului în urma abuzului de laxative și purgative, în colonul iritat, în diverticulite (inflamația unor diverticuli ai duodenului, intestinului subțire sau a colonului).

De asemenea, s-a avizat utilizarea ca mucilag în gastrite și enterite.

Extern s-a aprobat utilizarea sub formă de cataplasme pentru tratamentul inflamațiilor locale.

Legat de Comisia E, ne întrebăm când vom avea și noi o astfel de Comisie, cu oameni competenți în domeniul fitoterapiei, produselor naturale și al suplimentelor nutriționale atât de mult folosite în majoritatea țărilor lumii.

În această privință nu am avea decât de câștigat, în special prin valorificarea enormelor resurse naturale pe care le avem pentru sănătatea oamenilor.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

În farmacia casei, semințele de *Ln* se folosesc, pentru combaterea constipației cronice și calmarea colonului iritat, ca atare, cu condiția să nu fie sparte, deoarece se oxidează foarte repede.

Pentru adulți se recomandă 2 lingurițe de semințe întregi, spălate rapid într-un jet de apă.

Apoi se pun într-o cană cu apă la temperatura camerei și se țin 2-3 ore, după care se „administrează” cu totul, preferabil seara, înainte de culcare.

Extern se utilizează sub formă de făină proaspăt râșnită din care se prepară un terci cu puțină apă caldă, care se pune între tifoane și se aplică pe locurile inflamate.

Celor care au pielea mai sensibilă și recurg la cataplasme cu făină de Muștar ca revulsiv li se recomandă un amestec de două părți făină de Muștar și o parte de făină de In, care, având proprietățile emoliente menționate, împiedică iritarea pielii.

CONTRAINDICAȚII ȘI EFECTE SECUNDARE

Nu se recomandă în ocluzii intestinale.

Nu se cunosc efecte secundare și nici contraindicații în timpul sarcinii sau alăptării.

În ceea ce privește interacțiunea cu alte medicamente, ca și alte plante care conțin mucilagii, întârzie absorbția medicamentelor luate concomitent cu semințele de In, ceea ce poate afecta efectele acestora. Deoarece Inul este și plantă nectariferă (nu „meliferă”, cum o denumesc unii, deoarece în flori nu există miere ci numai nectar), pentru apicultori se evaluează că, la un hectar cultivat cu In, albinele pot produce 10 kg miere.

LINTEA

LENS CULINARIS MEDIK. (FAM. FABACEAE — LEGUMINOASE)

Plantă asiatică, cunoscută încă din Antichitate în Europa; ea constituia o importantă plantă alimentară în Sparta, din Linte făcându-se cea vestită „supă neagră”.

Este cultivată pe suprafețe mai restrânse astăzi în țara noastră, deși are o valoare nutritivă remarcabilă. Este citată și în Biblie.

Esau, fiul lui Isaac, își vinde dreptul său de întâi născut pentru „pâine și fiertură de linte”: „Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine și fiertură de linte. Și el a mâncat și a băut și apoi s-a sculat și a plecat. Astfel a disprețuit Esau dreptul său de întâi născut.” (Facerea, 25:34).

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conține 24% protide și 56% hidrați de carbon.

Conținutul în grăsimi este de 1%, de sodiu 4 mg%, de potasiu 810 mg%, de fosfor 410 ug%, de calciu 75 mg%, de fier 6,9 mg%.

Vitamina A este prezentă în proporție de 20 ug%, vitamina B1 0,45 mg%, vitamina B2 2 mg%, niacină 2 mg% și foarte mici cantități de vitamina C.

Sub raport energetic, 100 g Linte furnizează 354 kcal.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Plantă energizantă, Lintea este un reconstituent în stări de cașexie, atrofie musculară, hipotensiune și în convalescență.

Ea este totodată galactogogă, recomandându-se deci mamelor care alăptează.

Extern.

Lintea are proprietăți maturative, în abcese și panarițiu.

MOO DE ÎNTREBUINȚARE

Consumată în preparate culinare.

Cataplasme cu linte fiartă și zdrobită.

Se recomandă înmuierea în apă 12-18 ore, până apar primii germeni, apoi se gătește.

BAMELE

ABELMOSCUS ESCULENTUS L. MNCMSYN. HIBISCUSESCULENTUSL (FAM. MALVACEAE)

Bamele sunt binecunoscute încă din Egiptul antic, preluate apoi de arabi, trecute ca plante medicinale în farmacopeea indiană; botanistul Prosper Alpinus descrie în 1592 și proprietățile lor medicinale.

Se folosesc capsulele verzi.

În prezent sunt cultivate pe scară redusă și la noi, în zonele sudice ale țării.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Cu cantități mai reduse în protide și hidrați de carbon decât celelalte legume, Bamele conțin mucilagii, săruri minerale și vitaminele A, B și C. Sub raport energetic, Bamele furnizează cca 40 kcal la 100 g.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Prin conținutul ridicat în mucilagii, bamele au proprietăți emoliente, atât în afecțiuni respiratorii (laringite, traheite, bronșite) cât și în cataruri ale tractului digestiv.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumate în preparate culinare.

NĂUTUL

CICER AFIIETINUM L. (FAM. FABACEAE — LEGUMINOASE)

Năutul este originar din bazinul mediteranean, cultivat de multă vreme.

La noi este cultivat pe suprafețe mai reduse, citându-se unele proprietăți medicinale pentru semințe.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Năutul conține protide (18-30%), lipide, hidrați de carbon, amidon (47-60%), zaharuri, lipide (6%), săruri minerale — în special potasiu, magneziu, calciu, sodiu, siliciu, fier, arsen, asparagină, vitamine din complexul B și mici cantități de vitamina C.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Năutul este un bun diuretic, util în colici nefritice, dureri ale aparatului urinar, litiază și ca antiseptic urinar.

Diureza este însoțită de o eliminare de acid uric și cloruri, Năutul fiind de aceea util și în diateze urice, ca și în edeme cardiorenale.

Se mai citează utilizarea sa în stări congestive ale ficatului.

Extern.

Aplicațiile cu făină de Năut se pot face în pleurezii, dar numai pentru atenuarea durerilor, fără a avea efecte particulare. Ele se mai recomandă și în răceli, nevralgii.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Decocția diuretică cu 100 g la un litru de apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Cataplasme cu făină de Năut și apă caldă.

GRÂUL

TRITICUM AESTIVUM L. (FAM. GRAMINACEAE)

După foarte mulți cercetători, centrul de origine este situat în Asia Centrală și Orientul Apropiat. Cunoscut încă din Neolitic, Grâul se cultivă în prezent de la tropice spre nord, până la paralela 64° (Canada), iar spre sud, până la paralela 50° (Argentina).

Arealul vast de cultură explică variabilitatea mare a acestei specii: 400 varietăți și peste 4.000 soiuri de cultură.

În România se cultivă de peste 2500 ani.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Boabele de Grâu (cariopsele) conțin, în funcție de soi, 8-24% proteine, substanțe extractive neazotate 61-75%, din care peste 90% amidon, 2,3-5% zaharuri, 2,3% dextrină, 2% grăsimi, vitaminele A, B, E, K, D și PP, fitosteroli și microelemente minerale.

Proteinele conțin următorii amino-acizi: arginină 4-5%, histidină 2%, izoleucină 4%, leucină 5,9%, lizină 2,5%, metionină 0,8%, fenilalanină 5%, triptofan 1%, valină 4%.

Uleiul obținut din germenii embrionali ai cariopselor conține, ca principal component, vitamina E (în special sub formă de alfa-tocoferol), octacosanol, un alcool lipidic cu catena lungă, acizi grași nesaturați dintre care 55-60% acid linoleic.

Din germenii de Grâu a fost izolat un compus cu acțiune de inhibare a alfa-amilazei salivare.

Pe lângă valoarea alimentară deosebită, Grâul încolțit este remineralizant și tonic.

Este folosit ca adjuvant în tratamentul bolilor digestive, cardio-vasculare, ale aparatului respirator, renal, ale sistemului nervos și în tratamentul unor boli de piele.

Este foarte util, în special pentru copii și persoanele în vârstă, pentru valoarea lui tonifiantă și sedativă.

Deoarece Grâul încolțit conține cca 1g% fosfor, 342 mg% magneziu, 71 mg% calciu, vitaminele A, B, E, K, D și PP, proteine, glucide, enzime, diastaze etc, este recomandat ca supliment nutrițional în foarte multe afecțiuni cronice, în cure de 3 -4 săptămâni.

Pentru combaterea constipațiilor cronice, rezultate bune se obțin cu tărâțele de grâu.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

În special sub formă de boabe încolțite.

În acest scop, cariopsele de grâu (netratate chimic) se spală bine și se pun într-o farfurie cu puțină apă, care se acoperă cu altă farfurie.

De obicei, germinează la temperatura camerei în 24-36 ore.

Se consumă ca atare, fie amestecat în salate, fie trecut prin mașina de tocat carne și amestecat cu miere, fie uscat, dar la o temperatură care nu trebuie să depășească 40°C.

Pentru constipații cronice, tărâțele se fierb în apă sau lapte, la fel ca grișul.

Uleiul se poate consuma la salate.

Există și capsule de ulei concentrat care conțin 390-400 mg (cu 0,05% vitamina E).

Se recomandă 4-6 capsule pe zi, conform prospectului.

GRUPA LEGUMELOR DIN FAMILIA CUCURBITACEELOR

În lucrările de horticultură sunt tratate unitar, pe criteriul înrudirii sistematice și de structură.

Unele dintre speciile acestei familii le considerăm legume (Castravetele, Dovlecelul și Dovleacul turcesc), iar altele (Pepene verde și Pepenele galben) le considerăm fructe, ele fiind consumate de obicei ca desert, după masă.

De la toate se consumă fructele de tip bacform (peponidă), iar de la unele și semințele, fie în scop alimentar pentru uleiul pe care-l conțin, fie în scop terapeutic.

CASTRAVETELE

CUCUMIS SATIVUS L (FAM. CUCURBITACEAE)

Originar din India de est și Himalaya, unde crește și astăzi spontan, Castravetele este printre cele mai vechi plante de cultură, întâlnindu-se încă de acum trei milenii în frescele egiptene, iar în Antichitatea greco-romană este pomenit de către Pliniu cel Bătrân, Varro și Columella.

Este consemnat și în Biblie, ca o delicatasă: „Ne aducem aminte de peștele pe care îl mâncam degeaba în Egipt, de castraveti, de harbuzi, de praz, de ceapă și de usturoi.” (Numerele, 11:5).

Se folosesc atât fructul ca atare, precum și semințele (odinioară acestea constituind principalul produs fitoterapeutic).

Dacă în fitoterapie importanța sa este limitată, în schimb în cosmetică este unul dintre produsele naturale mult folosite.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Fructul conține până la 95% apă, cantități reduse de protide (0,70-1.1 %), 1 % hidrați de carbon, 6 mg% sodm, 105 mg% potasiu, 11 mg% calciu, 15 mg% fosfor, 0,4 mg% fier, 21 ug% vitamina A, între 0,01-0,02 mg% vitarninele B1 și B2 și un procent mic de vitamina C.

Valoarea energetică este foarte redusă: 7 kcal la 100 g.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Sucul de Castravete este diuretic-depurativ, diureza fiind însoțită de dizolvarea acidului uric și uraților, deci este util în litiază urică, gută, artratism.

Se consideră că amestecul de suc de Castravete cu cel de Morcov și Ridiche (sau, după alți autori, de Sfeclă) ar fi cel mai puternic litotritic (cu acțiuni de mărunțire a pietrelor).

În fitoterapia aparatului digestiv, Castravetele este ușor laxativ, calmant al colicilor și catarurilor intestinale.

Este greu digestibil.

Semințele sunt un remediu în calmarea tusei.

Extern.

În aplicații externe, Castravetele este antiinflamator în diverse iritații ale pielii, calmând pruritul.

Dă rezultate bune în pecingine.

Cosmetică.

Deosebit de importantă este acțiunea Castravetelui pentru curățirea și catifelarea pielii, atât pentru tenul gras cu pori dilatați, cât și pentru cel uscat.

Acțiunea de catifelare a pielii este completată de cea de îndepărtare a ridurilor.

Rezultate bune se obțin și în cazul pistruiilor.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat ca atare.

Suc, fie simplu, fie în combinație cu cel de Morcov și Sfeclă (sau Ridiche).

Decoctul preparat din o lingură de semințe la o cană are acțiune expectorantă și calmantă.

Se beau din acest decoct 2 căni pe zi.

Aplicații cu felii de castraveți, atât în dermatoze, cât și contra ridurilor.

Loșionări ale tenului cu suc de castraveți (numit și „lapte de Castravete”) în apă caldă — pentru tenuri grase, cu spațiile intercelulare dilatate (după alți autori se recomandă suc de castraveți și alcool diluat).

Loșionări cu suc de castraveți în amestec cu ulei de migdale, pentru tenuri uscate. Loșionări cu lapte, în care se macerează felii de castraveți.

DOVLECELUL

CUCURBITA PEPO L. VAR. OBLONGA SER. (FAM. CUCURBITACEAE)

Dovlecelul, cunoscut și sub numele de Bostan, este originar probabil din Asia Mică, după alți autori, din America, iar după alții, din Africa.

În Europa a fost adus abia în Evul Mediu de către turci.

În timpul Renașterii, Lobelus i-a descris unele proprietăți terapeutice valabile și astăzi.

Pulpa sa, ușor digestibilă, se utilizează în preparate culinare și este indicată în diferite diete.

Celelalte varietăți cu fructul mare se consumă în stare nematură, iar la coacere sunt furaje foarte bune pentru vitele cornute și porcine.

Alte varietăți se cultivă în scop ornamental.

În scopuri medicinale sunt utilizate în special semințele.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Pulpa Dovlecelului conține 1% protide, 4% hidrați de carbon, cantități mici de grăsimi, 1 mg% sodiu, 270 mg% potasiu, 15 mg% calciu, 30 mg% fosfor, 0,6 mg% fier, 230 ug% vitamina A, câte 0,05 mg% din vitaminele B1 și B2, 0,4 mg% niacină și cca 10 mg% vitamina C.

Semințele conțin 35%-45% ulei gras, fitosterine, lecitină, zaharuri, rezine și enzime cu proprietăți antihelmintice.

Semințele Dovlecelului au avantajul că nu sunt iritante, toxice și nu produc reacții adverse.

Conținutul în fitosteroli liberi sau sub formă fixă (legată) este de cca 1%.

Mai conțin pigmenți clorofilici (clorofila b și feofitină).

Pe lângă sărurile minerale menționate, ca microelemente conțin seleniu, zinc și mangan.

Mai conțin 30% pectine și cca 25-51% proteine.

Uleiul gras este format în special din acizi grași (palmitic, stearic, oleic și linoleic), precum și din tocoferolul alfa și beta, carotenoide (luteină și beta-caroten).

Diversitatea compoziției uleiului gras este în funcție de soiurile și varietățile de cultură.

Cercetările din ultimul timp încadrează preparatele pe bază de semințe de Cucurbita pepo în categoria antihelminticelor.

Compușii, cum sunt tocoferolul și seleniul, au o acțiune protectivă împotriva degradării oxidative a lipidelor, vitaminelor, hormonilor și enzimelor.

Fracțiunile proteice din semințe acționează ca inhibitori ai tripsinei. Studii și mai recente asupra activității terapeutice a preparatelor din semințe au demonstrat că acestea inhibă 5-alfa reductaza „in vitro”.

„In vivo” s-au demonstrat acțiunea anti-estrogenică și acțiunea antiinflamatoare (1997).

În ceea ce privește acțiunea în inflamațiile prostatei, reduc numai simptomele neplăcute, fără a reduce hipertrofia.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Semințele de Dovlecel reprezintă un remediu antihelmintic cert, cu acțiune deosebită asupra teniei și ascarizilor. Semințele decojite sunt totodată calmante ale catarurilor intestinale și urinare, dar, mai ales, în ultima vreme, li se atribuie o acțiune favorabilă în inflamații ale prostatei.

Tot prin acțiunea anticatarală se folosesc și ca pectorale, în laringite, traheite, bronșite.

Se citează și proprietăți sedative.

Pulpa dovleceilor tineri este ușor diuretică și laxativă, recomandându-se în regimul bolnavilor cu afecțiuni intestinale și renale, la artrici și reumatici, dar și, în mod special, ca prim aliment solid după diete lichide. Un laxativ și mai eficace îl constituie sucul.

Se recomandă și în dieta diab'eticilor și în afecțiunile cardiace cronice.

Extern.

Pulpa crudă este emolientă, cu utilitate în înțepături, arsuri.

MOD DE INTREBUINȚARE

Consumat ca atare, în preparate culinare obișnuite sau dietetice.

Suc (îndeosebi pentru efectul laxativ).

Seminte (neprăjite, nesărate) cojite și zdrobite, luate dimineața în priză unică 50-60 g pentru adulți, cca 20 g pentru copiii de vârstă școlară și 10 g pentru cei mai mici, fie ca atare, fie cu miere; după 1-2 ore se administrează un purgativ (ulei de ricin, ulei de parafină uz intern, ulei de măsline).

În prostatite, semințe decojite luate ca atare sau decoct cu o lingură la cană, bându-se 2 căni pe zi, timp îndelungat.

Emulsie cu efect sedativ, din semințe decorticate și zdrobite, fierte în apă sau lapte.

Cataplasme calmante cu pulpă crudă zdrobită.

DOVLEACUL TURCESC

CUCURBITA MAXIMA DUCH. (FAM. CUCURBITACEAE)

Originar din America, Dovleacul turcesc, cunoscut și sub denumirea de Bostan moldovenesc, Dovleac alb sau Dudaie, este frecvent cultivat în toate regiunile țării în scopuri alimentare sau ca furaj.

Varietatea maximă, cultivată în special în regiunile nisipoase ale țării (inclusiv în Delta Dunării), cu coajă argintiu-cenușie sau alburie, ajunge, la maturitate, la greutate impresionantă în condițiile pedoclimatice din țara noastră — între 30-100 kg! — fiind pe drept cuvânt denumit „dovleac uriaș”.

Varietatea „Farinae” are semințele fără coajă, fiind o importantă sursă oleiferă care se răspândește tot mai mult și în țara noastră.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Are o compoziție asemănătoare cu Dovlecelul, dar un conținut mai ridicat în hidrați de carbon.

Semințele conțin un ulei comestibil de bună calitate.

Turtele rămase după presarea uleiului sunt bogate în protide și constituie un excelent furaj pentru vite.

Semințele decojite după extragerea uleiului pot fi utilizate la prepararea halvalei.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

În scopuri alimentare, se consumă copt sau fiert, fie ca atare, fie în preparate de patiserie.

Semiințele de Dovleac turcesc, la fel ca și cele de Dovlecel sau Bostan, sunt recomandate în parazitoze, în special în teniaze și ascaridioze.

Se consumă decojite ca atare, la adulți 50-100 g pe zi, iar la copii 15-30 g pe zi, dimineața înainte de mâncare. După mâncare (la 2 ore), se administrează un purgativ.

Această cură se urmează 4-6 zile, după care se face examenul coprologic.

PEPENELE VERDE

CITRULLUS LANATUS (THUNB) MANSF. (FAM. CUCURBITACEAE)

Pepenele verde, Lubenița sau Harbuzul sunt specii originare din Asia de sud-vest și Africa de nord-vest. La noi se cultivă 4—5 soiuri, în special în regiunile calde ale țării.

Apare menționat în Biblie, drept una din cele mai prețuite truffandale, alături de Castravete, de Ceapă, Usturoi și Praz. (Numerele 11:5)

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Miezul Pepenelui verde conține peste 95% apă, 0,3% protide, 1% acizi organici, 3-5% hidrați de carbon, 60 mg% potasiu, cantități foarte mici de sodiu, 4 mg% calciu, 5 mg% fosfor, 0,2 mg% fier, 54 u,g% vitamina A, câte 0,02 mg% din vitaminele B1 și B2, 0,1 mg% niacină și cca 3 mg% vitamina C. Sub aspect energetic, Pepenele verde conține 12 kcal la 100 g miez.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Prin conținutul ridicat în apă, are proprietăți diuretice. Se recomandă în litiaze renale și ale vezicii urinare, în hiperuricemii (gută) prin acțiunea sa diuretică.

În acest scop, se fac cure de sezon, consumând câte 1-2 kg pe zi.

În medicina tradițională, semințele de Pepene verde (și de Pepene galben) se recomandă în litiaza renală și biliară, indicație terapeutică ce pare a fi explicată prin existența în semințe a unei enzime cu acțiune litotritică.

Extern.

Tot empiric, se recomandă aplicații locale cu felii de pulpă în arsuri ușoare și în inflamații.

PEPENELE GALBEN

CUCUMIS MELO L (FAM. CUCURBITACEAE)

Parfumatul Pepene galben, fâni a avea o valoare terapeutică deosebită care să-1 facă să fie recomandat în vreo afecțiune, are unele proprietăți favorabile în cura de fructe de sezon. Originar din Asia Centrală și Estică și Arabia tropicală, era cunoscut din Antichitate și cultivat cu mult înainte de erea noastră. La noi în țară sunt cunoscute peste 12 soiuri care se cultivă în zonele calde ale țării, mai rar în sere. Se consumă miezul cărnos, zemos, parfumat, dulce și înviorător, fie crud, fie sub formă zaharisită sau sub formă de dulceață. În cantitate mare, este greu digerabil.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conține 90-95% apă, 0,6-1% protide, 0,1% grăsimi, 3-6% glucide, 25 până la 3000 U.I. vitamina A, câte 0,03 mg% vitaminele B1 și B2 și mici cantități de vitamina C.

Conține săruri de potasiu (75 mg%), calciu (1 mg%), fosfor etc.

Valoarea energetică este de 30 kcal la 100 g.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Mult mai slab ca efecte terapeutice decât Pepenele verde, este, în schimb, un bun laxativ vegetal, comparabil cu prunele uscate. Se recomandă în anemii, constipație, hemoroizi, litiază urinară, reumatism și tuberculoză pulmonară.

În medicina populară, semințele, sub formă de decoct (o linguriță la o cană), se recomandă ca expectorante și în tratamentul hemoroizilor.

Este contraindicat în diabet, în colite, enterite și dispepsii.

MOD DE INTREBUINȚARE

Consumat ca atare în stare proaspătă sau sub formă de dulceață.

Suc proaspăt cu efecte laxative.

Semințele uscate și pisate ca antivomitiv (în medicina populară).

Extern.

Aplicații locale în arsuri ușoare și inflamații: cataplasme locale cu pulpă zdrobită.

Se recomandă sub formă de măști cosmetice pentru tenurile uscate.

GRUPA LEGUMELOR CU PROPRIETĂȚI CONDIMENTARE

Această grupă de legume reprezintă un exemplu concludent pentru faptul că adesea valoarea terapeutică poate fi mai importantă decât cea alimentară.

Cantitățile în care sunt consumate aceste plante reprezintă un aport nutritiv extrem de redus.

Definind condimentul drept substanța care se adaugă la o mâncare pentru a-i conferi un gust sau o aromă specifică, se atestă principala proprietate a acestora, aceea de tonice aperitive-stomahice, utile în anorexia (lipsa de apetit), gastrite hipoacide și disfuncții digestive.

Senzațiile gustative și olfactive date de ele provoacă, prin act reflex condiționat, o creștere sensibilă a secrețiilor salivare, gastrice și intestinale, cu rol hotărâtor într-o bună digestie.

Grupa aceasta de legume este relativ unitară sub raport sistematic, majoritatea făcând parte din familia Apiaceae — Umbelliferae (Mărarul, Pătrunjelul, Leușteanul, Asmățuiul), iar din familia Compositae — Tarhonul.

Proprietățile lor condimentare se datorează conținutului bogat în ulei esențial. Se utilizează îndeosebi frunzele, dar și semințele, atât în alimentație, cât și în formule specific medicinale.

MĂRARUL

ANETHUM GRAVEOLENS L (FAM. APIACEAE — UMBELLIFERAE)

Originar din nordul Mediteranei, Mararul este menționat ca „plantă cu efecte vindecătoare” încă în vestitul „Papyrus Ebers”, cea mai cuprinzătoare scriere despre plante medicinale din Egiptul antic.

Aprecieri pozitive asupra efectelor sale se întâlnesc în scrierile lui Dioscoride și Paliadius.

Valoare terapeutică au atât frunzele, cât și semințele.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

În funcție de partea de plantă, conținutul în ulei volatil este cuprins între 2,5-4% (în frunze și ramurile tinere) și 3-6% în fruct.

Mărarul conține cantități apreciabile de potasiu, sulf și sodiu, vitaminele A, B1 și C.

Uleiul volatil de Mărar conține între 40-60% carvonă.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Ca toate legumele condimentare, frunzele de Mărar au proprietăți tonic-aperitive și stomahice. Ele stimulează totodată diureza și eliminarea gazelor din stomac.

Semințele de Mărar sunt puternic carminative.

Ele sunt importante și pentru proprietățile emenagoge (de reglare a ciclului).

Totodată sunt sedative nervoase, utile în combaterea insomniilor, precum și antispastice, această proprietate explicând efectele în combaterea sughitului rebel și a vomei, îndeosebi la copii.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Adăugarea frunzelor la preparate culinare.

Infuzie de semințe preparată din o linguriță la cană.

Se beau 2-3 căni pe zi.

Decoct sedativ, cu o linguriță de semințe fierte într-o cană de lapte; se bea seara, înainte de culcare, pentru combaterea insomniei.

PĂTRUNJELUL

PETROSELINUM HORTENSE HOFFM. (FAM. UMBELLIFERAE)

în afara rădăcinilor*, se utilizează în fitoterapie atât frunzele, cât și semințele.

Frunzele sale — simbol al noilor începuturi, căci este una dintre primele plante care răsar primăvara — făceau parte din mâncarea ceremonială a Paștelui evreiesc.

* Proprietățile medicinale ale rădăcinilor sunt prezentate la capitolul despre legumele de la care se consumă rădăcinile.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Conținutul în ulei volatil în părțile aeriene este de cca 0,3%, dar în semințe este mult mai mare.

Uleiul este format din apiol, miristicină, aliletraraetoxibenzen, carburi terpenice, derivați cumarinici etc.

Semințele conțin cca 20% ulei gras format din acizi grași nesaturați, care la rândul lor conțin acid petroselinic și un heterozid flavonic — apiozidul.

Utilizarea semințelor este contraindicată în uzul intern.

Uleiul volatil din frunze conține, pe lângă apiol, și miristicină, felandren, terpineol, B-cimol și alți derivați.

Frunzele mai conțin vitaminele A, B și C și săruri minerale.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Prin conținutul mare în ulei volatil, adaosul frunzelor de Pătrunjel în preparate culinare are efect tonic-aperitiv. Sunt de mult cunoscute proprietățile sale febrifuge, iar sub raportul acțiunii emenagoge (de reglare a ciclului și calmare a durerilor), este una dintre cele mai active plante.

Deși mai moderat decât la rădăcini, și la frunze se manifestă proprietățile diuretico-depurative, de unde și efectul adjuvant în reumatism și hiperuricemie (gută).

Frunzele de Pătrunjel sunt un stimulent general, antianemic și antirahitic, ca și un tonic nervin.

Ca stimulente, ele acționează și asupra musculaturii netede a organelor interne, deci sunt indicate în toate cazurile de atonie digestivă a vezicii biliare — cu efect colagog, precum și a vezicii urinare, calmând colicile acestor organe.

Asupra aparatului circulator, acționează ca vasodilatatoare și în reglarea circulației capilare.

Au efect antihelmintic, în combaterea oxiurilor.

Extern.

Sucul de frunze combate nevralgiile, cu efecte și în nevralgii dentare.

Pentru efectul antiinflamator; se recomandă în iritații ale pielii, contuzii, echimoze, înțepături de insecte, ca și în inflamații ale ochilor.

Se citează și utilitatea sa ca tonic capilar.

Cosmetică.

Frunzele se pot utiliza pentru curățirea tenului și totodată sunt considerate ca un remediu contra pistruiilor.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat ca atare, în adaos la diferite preparate culinare — îndeosebi ca tonic-aperitiv și stomahic.

Infuzie de frunze, cu o linguriță la cană, 2-3 căni pe zi.

Suc proaspăt, cu care se fac aplicații de 2-3 ori pe zi, timp de 15-20 zile, contra pistruiilor.

Suc, în amestec cu alcool de 70° în părți egale, pentru cataplasme aplicate în zonele dureroase; în nevralgii dentare se pune un tampon de vată îmbibat în suc amestecat cu alcool până la tratamentul cariei, care nu trebuie amânat.

Preparatul descris se poate păstra (conserva) în sticle închise, la rece și în locuri ferite de lumină.

Decoct concentrat din frunze (2 linguri la cană) pentru curățirea tenului și ca tonic capilar.

Cataplasme antiinflamatoare cu Pătrunjel proaspăt (inclusiv în mastite).

Spălături vaginale antileucoreice cu decoct concentrat din semințe, din 2 linguri la 100 ml apă.

LEUȘTEANUL

UVISTICUM OFFICINALE KOCK (FAM. APIACEAE — UMBELLIFERAE)

Leușteanul este originar din bazinul mediteranean, unde se întâlnește și azi în stare sălbatică; era cultivat încă din vremea romanilor.

Pentru proprietățile lor condimentare sunt întrebuințate frunzele; însă în scop medicinal — în afară de acestea — sunt recomandate semințele și în mod special rădăcinile.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Toate părțile plantei conțin ulei volatil (0,6-1% în planta ucată), constituit din terpineol și alte terpene, numeroși acizi, între care acidul acetic și benzoic.

În special în părțile subterane sunt prezente grăsimi, gumirezine, taninuri, săruri mincrale și diferiți acizi organici.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Toate părțile plantei, dar îndeosebi rădăcinile, măresc simțitor diureza, favorizând eliminarea clorului și a compușilor azotați, fapt care determină recomandarea lor în edemele cardio-renale.

Leușteanul este și un hipotensiv activ, având și acțiune sedativă în special în tulburările de natură neurogenă. În fitoterapia aparatului respirator, Leușteanul favorizează expectorația iar în cea a aparatului digestiv acționează în normalizarea scaunelor, atât în caz de constipație, cât și în scaunele neregulate.

Este și canninativ*.

Are rol în creșterea secrețiilor salivare și gastrice, deci se recomandă și ca tonic-aperitiv.

Prin reglarea ciclurilor menstruale, manifestă efect emenagog.

* Substanțe active care au proprietatea de a inhiba procesele fermentative din intestin și de a favoriza resorbția sau eliminarea gazelor formate.

Extern.

În special, rădăcinile și semințele se recomandă pentru băi fortifiante, în special pentru copiii debili.

Frunzele sunt utilizate pentru ulceratii, în aplicații locale.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Frunzele consumate ca atare, în preparate culinare.

Infuzie din umbele, 2 lingurițe la o cană de apă, 2 căni pe zi.

Infuzie din semințe cu 1/2 linguriță la o cană de apă, 2 căni pe zi.

Decoct din rădăcini, cu o linguriță la o cană de apă, 2-3 căni pe zi.

Pulbere din rădăcină uscată, 2-3 vârfuri de cuțit pe zi.

Tinctură din 20 g frunze sau rădăcini macerate 10 zile în 100ml alcool de 70°, se iau 20-25 picături de 2-3 ori pe zi.

ASMĂȚUIUL

ANTHRISCUS CEREFOLIUM (L) HOFFM (FAM. APIACEAE - UMBELLIFERAE).

Asmățuiul este o specie eurasiatică cunoscută doar în nordul Moldovei și Ardealului, unde se cultivă pe suprafețe reduse și unde crește și spontan.

Cu aroma sa caracteristică, pe lângă valoarea condimentară, are o valoare medicinală ridicată, fapt cunoscut încă din Antichitate îndeosebi la greci, pentru ca în Evul Mediu să fie mult apreciat.

El a fost trecut și în unele farmacopei europene.

Se utilizează în principal frunzele, iar în scop medicinal și semințele.

Popular se mai numește Asmațuchi, Hasmațuchi etc.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Frunzele conțin cca 0,03 ulei volatil, compus în principal din izoanetol, substanțe amare, vitamine din grupa B, vitamina C, săruri minerale.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Intern.

Prin valoarea sa condimentară și substanțele amare, Asmățuiul este tonic aperitiv și stomahic.

Ca și celelalte Umbelifere, acesta are proprietăți diuretice în retenții urinare, litiază, „hidropizie” (anasarcă).

Fiind o plantă diuretic-depurativă, este utilizat intern în dermatoze și eczeme.

Asupra aparatului digestiv, Asmățuiul are o acțiune ușor laxativă, precum și de stimulare a secreției biliare.

Se citează utilizarea sa în bronșite și afecțiuni pulmonare cronice.

Stimulează, de asemenea, secreția laptelui (proprietăți galactogoge).

Extern.

Tratamentul extern îl poate completa pe cel intern în diverse dermatoze, eczeme și prurit.

Tratamentul intern se asociază cu cel extern.

Extern, Asmățuiul se utilizează în inflamații ale pleoapelor, în blefarite (medicina populară).

Un efect foarte interesant îl are în resorbția nodurilor hemoroidali.

Proprietățile antiinflamatoare sunt completate cu cele cicatrizante, utile în ulcerații.

Cosmetică.

Asmățuiul are rol în eritemul pielii și întârzierea apariției ridurilor.

MOO DE INTREBUINȚARE

Consumat ca atare, în aromatizarea unor preparate culinare.

Infuzia din frunze sau semințe, preparate din o linguriță la cană.

Se beau 2 căni pe zi. Suc de plantă proaspătă (până la 100 ml zilnic).

Cataplasme cu planta proaspătă, zdrobită.

TARHONUL

ARTEMISIA DRACUNCULUS L. (FAM. ASTERACEAE - - COMPOSITAE)

Plantă originară din Mongolia și Siberia centrală.

Cunoscut din Antichitate, Tarhonul a fost târziu introdus în Europa (în sec. al XVI-lea) și utilizat atât în alimentație, cât și în terapeutică.

Ruellius, vestit medic al Evului Mediu, l-a descris în lucrarea „De natura stirpium”, subliniind că salata la care se pune Tarhon nu are nevoie nici de oțet și nici de sare, acesta cumulând gustul ambelor ingrediente.

În aceasta rezidă de fapt importanța pe care o acordăm și azi Tarhonului.

Se utilizează frunzele.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Tarhonul conține în frunze și în rămurelele tinere între 0,1-0,4% ulei volatil format în proporție de 60-70% din metilchavicol.

Conține, de asemenea, taninuri, săruri minerale, urme de iod, vitamina B1 și vitamina C.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Tarhonul are un efect stimulent îndeosebi asupra apetitului și digestiei (deci proprietăți tonice-aperitive și stomahice), fără să irite.

Rolul de stimulent se manifestă și asupra funcției hepatice. El se recomandă pentru dispeptici și pentru persoanele care trebuie să evite regimul sărat.

Frunzele de Tarhon sunt totodată diuretice, utile în anasarcă (hidropizie) și reumatism.

Fluidificând secrețiile bronhice, Tarhonul este un bun expectorant.

Ca acțiune generală, el este tonic și anticataral.

MOD DE ÎNTEBUINȚARE

Consumat ca atare, în salate sau murat în oțet.

Infuzie preparată cu o linguriță la o cană de apă; se ia îndeosebi după mesele principale pentru stimularea digestiei.

ALTE LEGUME PERENE

Din această grupă, proprietăți medicinale mai importante se atribuie Sparanghelului, în timp ce în cazul Reventului, de la care se folosesc pețiolii cărnoși, proprietățile medicinale sunt mai pregnante la rizomi, materie primă medicinală.

REVENTUL

RHEUM SP. (FAM. POLYQONACEAE)

Caravanele aduceau din îndepărtata Chină, atât în Antichitatea greco-romană, cât și mai târziu, în Evul Mediu, alături de baloți de mătase, de splendorile din porțelan și jasp ce purtau pecetea geniului marelui popor din răsărit și o rădăcină misterioasă, foarte căutată pentru proprietățile sale medicinale: Reventul. El este descris și lăudat încă din anul 2700 î. Ch. de către învățatul împărat Shen Nung, apoi produsul medicinal de către Dioscoride în Grecia antică, Pliniu cel Bătrân și Galen la Roma, dar planta ca atare n-a pătruns în Europa decât în sec. al XVI-lea, în culturi.

La noi în țară este cultivat în grădini țărănești mai ales în Transilvania, cu deosebire în zona Brașovului și a Sibiului; în alimentație se utilizează pețiolii foarte îngroșați ai frunzelor, cunoscuți popular sub numele de „rabarbăr” sau „rubarbă”.

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Cantitățile mai mici de acid crizofanic și de derivați antrachinonici pe care le conțin pețiolii de Revent față de rădăcini par suficiente pentru a stimula glandele intestinale și funcția hepato-biliară.

Conțin numeroși acizi organici (citric, oxalic, malic, lactic etc), tanoizi și glu" cogalina, catechina și tetrarina.

Conțin vitaminele A, B1, B2 și C (8-36 mg%) și numeroase săruri minerale de K 3,42 mg%, Ca 1 mg%, Fe 17,2 mg%, P 0,33 mg%, Mn, Zn, Mo etc.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Datorită acidității lor, pețiolii de Revent au proprietăți tonic-aperitive, precum și stomahice, tonifiind în general aparatul digestiv.

Fără a fi la fel de puternic laxativi ca rizomii, pețiolii au această proprietate într-o măsură mai redusă. Manifestă o acțiune netă de stimulare hepato-biliară, fiind un produs coleretic.

Datorită conținutului ridicat în oxalați, Reventul este contraindicat în litiaza oxalică, iar datorită acidității crescute, celor cu hiperaciditate gastrică.

Planta este, de asemenea, iritantă pentru suferinzii de hemoroizi.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Pețiolii consumați ca atare în preparatele culinare specifice (salate — ca tonic aperitiv și stomahic, compoturi și alte preparate de desert).

Suc, 30—40 g înainte de mese, din pețiolii spălați, tăiați în cuburi de cca 2 cm ce se țin cca 2 minute într-un vas cu apa rece, se scurg și se storc.

Pentru păstrarea pe timpul iernii a pețiolilor de Revent, se procedează în felul următor: peste pețiolii bine spălați cu apă fiartă și răcită, puși într-un borcan sterilizat, se pune apă clocotită și se închide borcanul ermetic.

Își păstrează gustul și toate proprietățile mai multe luni.

Observații.

Principala materie primă medicinală de la această plantă o constituie însă rizomii (*Rhizoma Rhei*), unul din laxativele (purgativele) cele mai eficiente datorită conținutului în antrachinone, ele stimulând peristaltismul intestinului gros.

Rizomii au, de asemenea, proprietăți coleretice importante, tonic-aperitive în anorexii, anemii, citându-se și o acțiune vermifugă certă.

Subliniem faptul că, în urma unor cercetări recente, toate purgativele care conțin substanțe active din grupa antracenozidelor trebuie administrate cu prudență, deoarece favorizează dezvoltarea celulelor maligne în carcinomul colono-rectal.

Chiar și la omul sănătos, aceste purgative se vor administra maximum 7 zile pe lună.

SPARANGHELUL

ASPARAGUS OFFICINALIS L. (FAM. LILIACEAE)

Este o legumă originară din Extremul Orient, însă crește și azi spontan în păduri, în locuri umede din Europa, Asia și Africa.

A fost bine cunoscut de către greci și romani, fiind întrebuințat sub ambele aspecte, alimentar și medicinal. Dioscoride, Pliniu cel Bătrân, Galen îl recomandau ca adevărat medicament pentru afecțiuni hepatice și colici nefritice.

Lucrările moderne confirmă, de asemenea, unele proprietăți medicinale importante.

Se consumă lăstarii etiolați (crescuți la întuneric).

PRINCIPALII CONSTITUENȚI

Cantitatea de apă variază între 92-95%, iar cea de protide între 1,5-1,7% grăsimile fiind doar în proporție de 0,1%.

Conținutul în hidrați de carbon este cuprins între 1,6-1,8%, celuloză 0,6%, săruri minerale în special de magneziu, fier și fosfor, iar ca microelemente Ca, K, Cu, F, Br, I, Al, Zn, Si, S, Co.

Vitamina B1 este în cantitate de 0,025 mg%, B2 0,2 mg%, iar vitamina C în cantitate de 25 mg%.

Valoarea energetică este de numai 14 kcal, fapt care îl face recomandabil în cura de slăbire.

Datorită conținutului scăzut în hidrați de carbon, este recomandat în cantități nerestrictive în diabet.

RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

Se considera de bază realele proprietăți diuretice ale Sparanghelului, care mărește considerabil diureza, cu condiția ca persoana care îl consumă să nu aibă leziuni ale căilor urinare, situație în care devine iritant, provocând hematurie.

Pornind de la proprietățile diuretice, se recomandă în litiaze, cistite, nefrite, prostatite, în retenții hidrosodate (edeme), iar la cardiaci, pentru evitarea edemelor membrelor inferioare.

Eliminând produșii de dezasimilație, este un depurativ activ, util inclusiv în dermatoze (îndosebi în eczeme).

Sparanghelul stimulează activitatea hepatică.

Ducând la scăderea glicemiei și a glicozuriei, se recomandă ca adjuvant în diabet.

În bronșite cronice are acțiune expectorantă.

Se folosește ca adjuvant și în tratamentul cu digitalice, ca transportor al acestora, dar i se atribuie chiar și lui însuși o acțiune sedativă cardiacă.

Având o structură filamentoasă, se recomandă pentru cazurile accidentale în care s-au înghițit obiecte ascuțite, Sparanghelul fiert înglobând obiectul, care este eliminat fără a provoca leziuni.

Prin gustul amărui, stimulează apetitul și favorizează digestia, iar datorită fibrelor celulozice stimulează motricitatea tubului digestiv, acționând deci ca laxativ în constipații.

Calmează, de asemenea, colicile intestinale.

MOD DE ÎNTREBUINȚARE

Consumat ca atare, în salate și preparate culinare dietetice (salată de Sparanghel fiert).

Decoct (în special diuretic) din 20 g la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Sirop cu proprietăți sedative cardiace din suc de Sparanghel care se fierbe pe baie de apă cu două părți zahăr până la obținerea consistenței dorite.

Se iau câte 2 lingurițe pe zi, dimineața și seara.

Tinctura din 20 g plantă maceratâ 10-15 zile în 100 ml alcool; se iau câte 5-10 picături contra colicilor.

CAP.6 ROLUL ȘL UTILIZAREA PRODUSELOR VEGETALE PE GRUPE DE AFECȚIUNI

Cum spuneam la începutul acestei cărți, produsele vegetale conțin în structura lor intimă VIAȚĂ.

Fructele, legumele și semințele dețin proprietăți terapeutice remarcabile, fiind adjuvante prețioase în îngrijirea multor boli.

Pe drept cuvânt, datorită substanțelor active cu care sunt înzestrate, ele pot fi considerate „alimente-medicamente”.

Selectând cu discernământ pentru fiecare maladie factorii deficitari, de multe ori declanșatori ai procesului morbid, multe medicamente de sinteză vor putea fi potențate sau chiar înlocuite prin aceste remedii vii.

Depart de noi gândul că utilizând exclusiv aceste roade ale pământului vor fi obținute vindecări miraculoase, indiferent de boală. Dar toate aceste daruri pe care Natura ni le pune la dispoziție cu atâta generozitate contribuie la tămăduirea noastră.

Mai mult decât atât, folosirea lor în alimentația zilnică contribuie nu numai la recâștigarea sănătății, ci și la menținerea ei.

Iată de ce susținem medicina complementară (adică permanenta conjugare dintre medicina clasică, alopată și terapiile neconvenționale, care includ și fitoterapia) ca fiind soluția optimă pentru omul în suferință.

Am socotit deci important să selectăm acele fructe, legume sau semințe beneficătoare care s-ar cuveni incluse în programul luptei noastre cu atâtea și atâtea boli.

Componentele vegetale trebuie să facă parte din dietoterapia noastră cotidiană.

Este suficient să menționăm numai faptul că Tomatele, citricele, tărâța, boabele de Fasole sau Soia scad colesterolul din sânge.

Totodată este incontestabil efectul Usturoiului în boala hipertensivă sau în parazitozele intestinale. Ridichea neagră este un bun coleretic — colagog și diuretic, iar căpșunile și fragile au efecte dovedite antigutoase.

Să nu ne imaginăm însă că tot ceea ce este natural este și inofensiv.

Dacă pentru medicamentele de sinteză este demult instituită „farmacovigilența” (o ramură a farmacologiei care are drept obiectiv supravegherea efectelor secundare ale medicamentelor), nici plantele medicinale nu au scăpat de „furcile caudine” ale acesteia.

Astăzi, sunt „puse la index” aproape 100 de plante sau substanțe active extrase din ele care — în urma unor studii minuțioase — s-au dovedit a fi genotoxice, carcinogene, hepatotoxice etc.

După cum arată și un relativ recent raport ESCOP*, prin metode moderne de investigație, nici un medicament de sinteză, semisinteză sau natural nu rămâne necercetat.

* European Scientific Cooperative on Phytotherapy, European Phytotelegram, Official Newsletter ESCOP, Sixth issue-august 1994.

Un singur exemplu am dori să dăm aici, unicul din grupa fructelor: coaja verde a fructelor de nucă, care, prin naftochinonele conținute (în speță, juglona), are efecte mutagene și posibil carcinogene.

În cele ce urmează, vom prezenta o sistematizare a componentelor vegetale indicate în diverse grupe de afecțiuni, neuitând să atragem atenția asupra importanței pe care o prezintă preventiv și curativ o alimentație echilibrată.

BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR

Afecțiuni cardiace cu substrat funcțional (fără substrat organic identificabil)

Sub această denumire sunt grupate toate tulburările neurovegetative ale inimii, cunoscute și sub numele de nevroză cardiacă (tulburări de ritm cardiac însoțite sau nu de palpitații și de senzație de durere precordială).

În această categorie de afecțiuni se recomandă — cu titlu general — produsele vegetale cu acțiune sedativă generală.

Sparanghelul

cu acțiune sedativă cardiacă și totodată ca adjuvant în tratamentul cu digitalice (unul din medicamentele de sinteză de primă importanță în tratamentul bolilor cardiace), având rolul de transportor al acestora. Consumat ca atare, în salate și preparate culinare dietetice.

Sirop din suc de Sparanghel care se fierbe pe baie de apă cu 2 părți zahăr până la obținerea consistenței specifice, luându-se 2 lingurițe pe zi, dimineața și seara.

Salata

recomandată în acest sens încă din Antichitate de către Dioscoride, Columella și Galen, cu acțiune certă asupra palpitațiilor.

Consumată ca atare, mai ales seara.

Leușteanul

Consumat în preparate culinare.

Decoct din rădăcină (1 linguriță la cană, 2-3 căni pe zi).

Tinctură din 20 g rădăcini macerate 10 zile în 100 ml alcool, câte 20-25 picături, de 2-3 ori pe zi.

Usturoiul

regularizează pulsul (alături de acțiunea sa hipotensoare).

Consumat ca atare (minimum 2-3 bulbili pe zi).

Tinctură din suc cu o canfitate egală de alcool diluat la 40°, din care se iau 2-3 lingurițe pe zi, în cure de 10 zile pe lună.

Ateromatoza și ateroscleroza

Ateromatoza reprezintă un proces complex, caracterizat prin depunere lentă și progresivă în pereții arterelor de colesterol, de grăsimi animale și de săruri de calciu, sub forma unor plăci denumite ateroame (de unde și denumirea de ateromatoză).

Ateroscleroza este o boală degenerativă a arterelor, având ca origine aceste ateroame.

Ateroscleroza este cauza principală a accidentelor vasculare.

Regimul alimentar joacă un rol deosebit în această afecțiune.

Sunt recomandate 5-6 mese pe zi, în cantități moderate, evitându-se mesele consistente, copioase.

Carnea de pasăre, de vită și peștele alb preparat sub orice formă (supe, rasol, grătar, conserve, tocătură etc.) sunt permise de 2-3 ori pe săptămână.

Mai indicate sunt însă produsele lactate, albușul de ou (nu însă și gălbenușul), pastele făinoase, supele de zarzavaturi, ouăle fierte (tari), cartofii copti sau fierți în coajă, salatele de crudități de sezon.

Sarea de bucătărie este permisă, dar în cantitate redusă; dacă afecțiunea este însoțită și de hipertensiune arterială, va fi eliminată complet din alimentația bolnavului, iar lichidele se vor reduce cantitativ.

Aportul de sare indispensabilă vieții se asigură din legumele și fructele consumate.

Cele mai importante produse vegetale indicate în ateroscleroză sunt:

Afinele

Consumate ca atare (până la 500 g pe zi).

Decoct din o linguriță la o cană sau macerat la rece timp de 8 ore, 2 căni pe zi.

Arahidele — datorită proporției mari de acizi grași nesaturați, duc la scăderea colesterolemiei, fiind utile prin aceasta și în ateroscleroză.

Consumate ca atare, după o prăjire ușoară.

Fragii

fructele au proprietăți antiaterosclerotice prin conjugarea acțiunii ușor hipotensoare cu acțiunea diuretic-depurativă și eliminarea de colesterol.

Consumate ca atare, chiar în cure cu 300-500 g până la 1,5 kg pe zi, de preferință dimineața.

Sirop.

Lămâile

prin scăderea colesterolemiei.

Consumate ca atare (îndeosebi cură de suc).

Merele — prin conjugarea acțiunii hipotensoare cu cea de scădere a hipercolesterolemiei.

Consumate ca atare. în „cura lui Kempner”, în prima fază („faza de atac”) cu o durată de 1-3 luni, se consumă zilnic numai 250-300 g orez și mere după dorință.

Prunele

Consumate ca atare.

Strugurii

Cura de must — se începe cu 0,5 litri pe zi, în 3 reprize cu o oră înainte de mese, ajungându-se după cca 2 săptămâni până la cca 2 litri pe zi; se menține acest nivel 2-3 zile, după care se scade până la cantitatea inițială, urmându-se pe toată perioada sezonului strugurilor.

Ceapa

prin fluidificarea sângelui, contribuie la efectul antiaterosclerotic.

Consumată ca atare, minimum 1-2 cepe pe zi.

Soia

deoarece cca 85% din acizii grași sunt nesaturați, uleiul de Soia are un efect hipocolesterolemiant, deci și antiaterosclerotic.

Folosirea în alimentație a uleiului de Soia.

Sparanghelul

Consumat ca atare, în salate și preparate culinare ușoare.

Tomatele

prin micșorarea vâscozității sângelui.

Consumate ca atare.

Usturoiul

duce la scăderea nivelului colesterolului din sânge.

Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili pe zi.

Tinctură din suc cu o cantitate egală de alcool diluat la 40°, din care se iau 2-3 lingurițe pe zi, în cure de 10 zile pe lună.

Rețeta din medicina tradițională chineză (vezi „hipertensiunea”).

Grâul

Sub formă de boabe încolțite, cariopsele de grâu germinând la temperatura camerei în 24—36 ore.

Ca atare, fie amestecat în salate, fie trecut prin mașina de tocat și amestecat cu miere.

Angina pectorală

Este o boală cardiacă manifestată printr-o durere toracică ce poate iradia spre gât, maxilarul inferior sau brațe. Apare ca urmare a ateromatozei și aterosclerozei (descrise anterior) și care determină rigidizarea și îngustarea arterelor coronare (artere care vascularizează mușchiul cardiac).

în consecință, mușchiul cardiac, insuficient irigat, va suferi de ischemie, modificându-și structura morfologică. Acesta este și motivul pentru care angina pectorală, ca entitate medicală, este inclusă într-un grup mai larg de maladii, grup denumit „cardiopatie ischemică”, atestată clinic și electrocardiografic.

În timp, boala poate evolua către un infarct miocardic sau chiar către moarte subită din cauza obturării definitive a unor porțiuni de arteră coronară.

De aceea, se impun pentru bolnav examene periodice clinice și electro-cardiografice, precum și o medicație alopăată specifică.

Tratamentul igienico-dietetic constă în evitarea frigului, a eforturilor fizice și psihice (care pot provoca, de asemenea, o ischemie de scurtă durată a miocardului).

Se impune totodată și renunțarea la fumat.

Sarea, alcoolul și condimentele vor fi consumate în cantități cât mai reduse.

În general, se recomandă un regim alimentar lacto-vegetarian, cu mese mici, dar repetate (de preferință 4-5 mese pe zi).

Dintre legume, și în acest caz, foarte util este Usturoiul, care calmează spasmele vasculare.

Consumat ca atare 2-3 bulbili pe zi.

Tinctură din suc de Usturoi cu alcool de 40°, 2-3 lingurițe pe zi, în cure de 10 zile pe lună.

Rețeta din medicina tradițională chineză (vezi „hipertensiunea”).

Hreanul

are efecte salutare chiar în formele dureroase.

Cura de Hrean cu miere: se face o pastă omogenă din cantități egale de Hrean ras și miere, din care se ia treptat câte o linguriță dimineața, cu o oră înainte de micul dejun, cura durând 30 de zile, cu pauze de câte 2 luni.

Cătina

flavonoidele duc la mărirea forței de contracție a miocardului și la îmbunătățirea circulației coronariene. Infuzie cu 1-2 lingurițe la cană, 2-3 căni pe zi.

Hipertensiunea arterială

Hipertensiunea arterială reprezintă afecțiunea cardio-vasculară cea mai răspândită în masa populației și una dintre problemele cele mai importante de sănătate publică în țările dezvoltate.

Este definită ca o creștere persistentă a tensiunii arteriale sistolice („maximă”) și diastolice („minimă”) peste valorile de 140/90 mmHg.

Fără a fi prin excelență plante medicinale, câteva fructe și legume sunt foarte utile ca hipotensive.

Dintre ele se detașează Usturoiul, a cărui acțiune se manifestă atât asupra circulației periferice, cât și asupra contracției miocardului, preparatele din Usturoi coborând minima presiunii arteriale.

Consumat ca atare (minimum 2-3 bulbili pe zi).

Tinctură din suc și alcool diluat de 40°, în părți egale, luându-se 2-3 lingurițe pe zi, 10 zile pe lună.

Foarte eficientă este o rețetă din medicina tradițională chineză: 350 g Usturoi bine zdrobit se lasă la macerat 10 zile în 200 ml alcool concentrat, după care se filtrează și se mai lasă trei zile la limpezire. După decantare se păstrează în sticle brune, bine astupate, administrându-se după următoarea schemă:

Doza este exprimată în număr de picături, mergându-se progresiv de la o picătură în dimineața primei zile, până la 15 picături în seara celei de a 5-a zile, după care se scade până la sfârșitul celei de-a zecea zile, când se ajunge din nou la o picătură.

În ziua a unsprezecea se administrează dimineața, la prânz și seara „doza de atac” de 25 picături, după care se reia schema ciclic, până la epuizarea preparatului.

Cantitățile menționate se iau în 50 ml lapte (sau apă îndulcită) cu 20-30 minute înainte de mese, citându-se că efectul unei cure se păstrează pe parcursul a 3-5 luni.

Pentru schema tratamentului cu Usturoi a se vedea tabelul din această lucrare.

Hreanul

Este foarte activ.

Infuzie din 15-30 g la 1 litru, care se lasă apoi la macerat 12 ore, luându-se 2 căni pe zi, între mese.

Cură de Hrean cu miere (după rețeta de la „Angina pectorală”).

Leușteanul

Decoct din rădăcină cu o linguriță la o cană, 2-3 căni pe zi.

Sfecla roșie

Consumată în preparate culinare sau ca atare, rasă.

Cireșele și visinele

Consumate ca atare.

Sirop preparat la rece, din suc filtrat, la care se adaugă treptat zahăr, până la suprasaturare (620-640 g la kg).

Merele

Consumate ca atare.

Intră în dura cură a lui Kempner, în care în prima fază, așa-numita „fază de atac”, cu o durată de 1-3 luni, se consumă zilnic numai 250-300 g orez, legume și mere după gust; în a doua fază a dietei se introduce, pe lângă legume, carne și pește, puțină pâine fără sare.

Strugurii

Consumați ca atare sau cură de must.

Lămăile

Consumate ca atare sau sub formă de suc.

Fragii

Fructele de fragi au efecte anti-aterosclerotice prin proprietățile hipo-colesterolemizante.

Se pot consuma ca atare, chiar în cure de 300-500 g până la 1,5 kg pe zi, de preferință dimineața.

Insuficiența cardiacă

În termeni generali, insuficiența cardiacă desemnează acea stare de activitate insuficientă a cordului, având consecință directă imposibilitatea îndeplinirii funcției sale de pompă circulatorie (care activează și întreține circulația sangvină în întregul organism).

Cordul insuficient irigat nu mai poate asigura debitul sangvin adecvat necesităților normale ale organismului, din cauza unei contracții cardiace deficitare.

Din cauza severității bolii și dificultăților terapeutice, tratamentul de atac și cel de fond al insuficienței cardiace sau/și cardio-vasculare, ca și regimul de viață (ceea ce constituie de altfel tratamentul igienodietetic al bolii) trebuie recomandate numai de medic și efectuate sub supravegherea sa în cadrul spitalizării bolnavului sau prin controale clinice periodice, în caz de tratament ambulatoriu.

În afara medicației tonicardiace majore (obținută din celebrele plante medicinale *Digitalis lanata* și *Digitalis purpurea*), un rol adjuvant îl pot avea următoarele produse naturale:

Cătina

datorită flavonelor, mărește forța de contracție a miocardului.

Infuzie din 1-2 lingurițe la o cană, 2-3 căni pe zi. Gem, marmeladă, compoturi din fructe proaspete.

Lămăia

Consumată ca atare sau ca suc, până la 200 g fructe pe zi.

Cartoful

În anumite limite, are o acțiune apropiată de a digitalicelor.

Consumat ca atare în preparate culinare ușoare.

Fasolea verde

se recomandă utilizarea mai ales în pauza de digitalice.

Tinctură din 20 g păstăi macerate 7-8 zile în 100 ml alcool; se administrează 70-120 picături, de 4 ori pe zi.

Consumată ca atare în preparate culinare ușoare.

Hreanul

Pastă omogenă dintr-o lingură de hrean ras și o lingură de miere; se ia treptat, cu lingurița, dimineața cu o oră înainte de micul dejun.

Cura durează 30 zile, repetându-se cu pauze de câte 2 luni, de 4 ori pe an.

Morcovul

Consumat ca atare.

Suc, câte 100 g dimineața.

Spanacul

Consumat ca atare.

Suc, câte un pahar în fiecare dimineață.

Sparanghelul

se folosește ca adjuvant în tratamentul cu digitalice, ca transportor al acestora, având el însuși o acțiune sedativ cardiacă.

Consumat ca atare în salate și preparate dietetice.

Sirop din o parte suc și 2 părți zahăr; se fierbe pe baie de apă până la obținerea consistenței dorite.

Se iau 2 lingurițe pe zi, dimineața și seara.

Usturoiul

Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili pe zi.

Tinctură din suc și alcool de 40° în proporții egale; se iau 2-3 lingurițe pe zi, timp de 10 zile pe lună.

Tinctură din medicina tradițională chineză (vezi „hipertensiunea”).

Edemele de stază cardiacă

Sunt edeme declive (apărute în urma exercitării forței gravitaționale în funcție de poziția corporală), în special ale membrelor inferioare, fiind o consecință a insuficienței cardiace.

Pot fi reduse cu ajutorul următoarelor produse vegetale:

Cătina

prin vasodilatarea produsă la nivel renal, mărește diureza.

Infuzie din 1-2 lingurițe la o cană, 2-3 căni pe zi.

Mărul

prin acțiunea sa diuretică.

Consumat ca atare.

Pepenele verde

un puternic diuretic.

Consumat ca atare.

Pepenele galben

Consumat ca atare.

Cartoful

bogăția în potasiu îl face util în regimul cardiacilor cu edeme.

Consumat în preparate culinare ușoare.

Ceapa

datorită faptului ca diureza este însoțită de o eliminare masivă de clorură de sodiu.

Consumată ca atare, minimum 1-2 cepe pe zi.

Tinctură dintr-o ceapă zdrobită, macerată 10 zile într-o cantitate egală de alcool, 2 lingurițe pe zi, înainte de masa de prânz și înainte de culcare.

Gulia

diuretic moderat, contribuie la resorbția edemelor.

Consumată ca atare.

Pătrunjelul

folosind rădăcinile, diureza este însoțită de un efect declorurant.

Consumat în preparate culinare.

Decoct din 50 g la 1 litru, 2-3 căni pe zi.

Suc 50-100 g/zi.

Sparanghelul

pornind de la proprietățile diuretice, diminuează umflarea membrelor inferioare.

Consumat în salate și preparate culinare dietetice.

Decoct de 20 g la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Țelina

efectul diuretic este însoțit, însă, și de declorurare.

Consumată ca atare.

Suc, câte 100 g înainte de masa de dimineață.

Decoct în 30 g la 1 litru, 2-3 căni pe zi.

Usturoiul

cu efecte favorabile în edeme ale membrelor inferioare.

Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili pe zi.

Tinctură din suc și o cantitate egală de alcool diluat la 40°, 2-3 lingurițe pe zi, timp de 10 zile pe lună.

Varza

Consumată în salate sau preparate culinare ușoare (minimum 300-400 g pe zi).

Cură de suc, un pahar pe zi, între mese.

Afecțiunile vasculare: hemoragiile, varicele, flebita superficială, fragilitățile capilare, arteriale, hemoroizii

Din patologia vasculară, un rol important, atât prin frecvență, cât și prin severitatea evoluției, îl dețin hemoragiile.

În sensul strict al termenului, prin „hemoragii” înțelegem orice evaziune (părăsire) a sângelui din vasele sangvine.

Din punct de vedere al localizării, există:

— hemoragiile externe, cum ar fi: epistaxisul, adică hemoragia nazală;

- hemoptizia, care înseamnă eliminarea orală de sânge aerat în urma unui acces de tuse, provenind din vasele bronhiilor;
- hematemeza — vomă cu sânge de origine digestivă;
- melena — scaune de culoarea păcurii;
- sângerările rectale — cu sânge roșu, ca în cazul hemoroizilor.

— hemoragiile interne apar când, în urma ruperii vaselor sangvine, sângele apare și se adună într-o cavitate naturală, de obicei în peritoneu. Hemoragiile interne necesită asistență medicală de specialitate.

Efecte benefice au în hemoragii:

Afinele

fiind protectoare ale pereților vasculari, se recomandă în hemoragiile datorate fragilității acestora; de altfel, bogăția în tanin face din ele un antihemoragic general.

Cură de afine: 300-500 g zilnic.

Decoct cu o linguriță de afine uscate la cană sau macerat la rece timp de 8 ore cu aceeași cantitate, bându-se 2 căni pe zi.

Cătina

Infuzie din 1-2 lingurițe la cană, 2-3 căni pe zi.

Gutuile

în hemoptizii, hemoroizi, hemoragii uterine.

Consumate ca atare sau produse alimentare (suc, sirop, jeleu).

Decoct dintr-o gutuie mare, rasă, la 1 litru apă, lăsându-se să fiarbă până ce lichidul se reduce la jumătate, cantitate care se bea în cursul unei zile, îndulcindu-se cu 50 g zahăr.

Lămăile

prin conținutul în vitamina C, joacă un rol important în prevenirea fragilității capilarelor, în hemoragiile subcutanate și în hemoragiile gingiilor.

Sunt utile în epistaxis (hemoragii nazale) și în hemoragii digestive în care apar scaune cu melenă.

Consumate ca atare sub formă de suc.

în epistaxis (hemoragii nazale) — tamponarea locală cu un tampon de vată îmbibat în suc.

Poate părea paradoxal, dar renumitul fitoterapeut Jean Valnet recomandă sucul de lămâie chiar și în hemoragiile digestive superioare (scaune cu melenă).

Portocalele

proprietăți similare cu lămăile.

Consumate ca atare sau sub formă de suc.

Nucile

au proprietăți antihemoragice.

Infuzie din 1-1/2 lingurițe la cană, 2 căni pe zi.

Porumbele

datorită bogăției în tanin, sunt antihemoragice generale, cu efecte deosebite în epistaxis (sângerări nazale).

Decoct cu o lingură la cană, 2 căni pe zi.

Tamponări ale mucoasei nazale cu vată înmuiată în suc, în epistaxis.

Morcovul

Consumat ca atare sau ca suc (100 g/zi), dimineața pe stomacul gol.

Urzica

hemostatică, prin conținutul ridicat în vitamina K.

Consumată ca atare (în salate) în cura de primăvară sau ca suc (80-100 ml/zi).

Infuzie sau decoct scurt (5 minute) cu 1-2 linguri de frunze uscate la cană, 2-3 căni pe zi.

Usturoiul

efect antihemoragic, micșorând și riscul de tromboză.

Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili pe zi.

Tinctură din suc și alcool de 40° în proporții egale; se iau 2-3 lingurițe pe zi.

Varicele (dilații permanente ale venelor) se încadrează tot în patologia vasculară, fiind boala cea mai frecventă a venelor.

Cele mai frecvente varice sunt cele de la nivelul membrelor inferioare, cu o simptomatologie determinată mai mult de acumularea de sânge în gambe decât de varicele în sine: crampe, greutate în picioare, furnicături, rar dureri în adevăratul sens al cuvântului.

Una din complicațiile redutabile ale varicelor este flebita superficială, o inflamație acută în jurul varicelor membrului inferior, care se traduce printr-o durere și o modificare a pielii (înroșire, aspect cartonat) în lungimea segmentului varicos.

Fragilitățile capilare, incluse tot în marele capitol al vasculopatiilor (bolile vaselor), se caracterizează printr-o micșorare a rezistenței vaselor capilare consecutiv alterării peretelui lor.

Arteritele sunt leziuni inflamatorii ale unor artere. Se pot întinde într-o manieră difuză sau se pot limita la un teritoriu vascular localizat (de exemplu, arterele membrelor inferioare sau arterele coronare).

Dintre roadele pământului au efecte benefice în tratarea acestor afecțiuni vasculare:

Afinele

utile în varice, arterite, sechele de flebită, afecțiuni coronariene.

Consumate ca atare (până la 300-500 g zilnic).

Decoct cu o linguriță la cană sau macerat la rece timp de 8 ore, 2 căni pe zi.

Castanele

se recomandă celor cu predispoziții la varice și hemoroizi.

Decoție scurtă (2-3 minute) din 15-20 g la 1 litru, 2-3 căni pe zi.

Pireu de castane.

Coacăzele negre

datorită rutozidului solubil, joacă un rol important în prevenirea accidentelor vasculare. Consumate ca atare sau sub formă de suc.

Infuzie din fructe uscate, 1-2 lingurițe la o cană, 2-3 căni pe zi.

Măceșele

datorită conținutului în vitamina P, au rol în reglarea permeabilității și elasticității capilarelor, acționând pentru normalizarea circulației.

Infuzie din o lingură la o cană, 2 căni pe zi.

Cătina

de asemenea cu acțiune asupra circulației capilare.

Lămâile

sunt active în scleroza arterelor, cărora le redau elasticitatea; de asemenea, în afecțiuni vasculare la nivelul membrelor inferioare (varice, flebite).

Consumate ca atare sau ca suc, în salate, limonade etc.

Portocalele

și ele protecoaiie vasculare, în fragilitate capilară, tromboză.
Consumate ca atare sau ca suc.

Pătrunjelul

îndeosebi în reglarea circulației capilare.
Infuzie din frunze cu o linguriță la cană, 2-3 căni pe zi.

Tomatele

Consumate ca atare.

Usturoiul

diminuează spasmele vasculare, contribuind la reducerea tulburărilor circulatorii (inclusiv în varice și hemoroizi), micșorând și riscul de tromboză.
Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili pe zi.
Tinctură din suc cu o cantitate egală de alcool diluat la 40°, din care se iau 2-3 lingurițe pe zi, în cure de 10 zile pe lună.

Varza

în uz extern, în ulcere varicoase, arterite, alte afecțiuni vasculare la nivelul vaselor superficiale (ca, de exemplu, hemoroizii).
Aplicații direct pe piele cu frunze strivite și curățate de nervura principală, fixate cu un pansament; se schimbă de 2 ori pe zi.

Pentru hemoroizi, farmacia naturii are o ofertă extrem de generoasă.
Fructele și legumele citate se recomandă a se folosi atât în uz intern, cât mai ales în uz extern ca decongestive, antiseptice, astringente.

Afinele

Spălături locale sau comprese cu decoct concentrat (2-3 linguri la cană) sau macerat la rece (cu aceeași concentrație).

Gutuile

Decoct dintr-o gutuie mare, rasă, la 1 litru apă, fierbându-se până ce lichidul se reduce la jumătate, cantitate care se bea în cursul unei zile, îndulcită cu 50 g zahăr.

Socul

Cataplasme cu decoct concentrat din 30-50 g fructe coapte la 1 litru.

Asmățuiul

poate duce la resorbția nodulilor hemoroidali.
Cataplasme cu planta proaspătă, zdrobită.

Cartofii

Consumați în preparate culinare ușoare.
Suc proaspăt (până la 150-200 g pe zi).

Dovleceii

Cataplasma calmantă cu pulpă crudă, zdrobită.

Pătlăgelele vinete

Cataplasme cu frunze fierte, aplicate calde.

Usturoiul

influențează favorabil hemoroizii prin acțiunea generală asupra circulației.

Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili pe zi.

Tinctură din suc de Usturoi și alcool de 40° în proporții egale; se iau 2-3 lingurițe pe zi, timp de 10 zile pe lună.

Varza

Aplicații locale cu frunze strivite (cu ajutorul unei sticle de 1 litru) și curățate de nervura principală, schimbându-se de 2 ori pe zi.

BOLILE APARATULUI DIGESTIV. SEGMENTUL BUCOFARINGIAN

ABCESUL DENTAR

Este o colecție purulentă, constituită plecând de la un focar local de infecție.

Fruitele și legumele recomandate sunt numai o soluție de moment pentru diminuarea durerilor, până la prezentarea la medicul stomatolog:

Smochinele

Aplicate calde pe gingie, în dreptul dintelui afectat.

Hreanul

Tinctură din 20 g Hrean ras macerat 2 săptămâni în 100 ml alcool; se pun tamponi îmbibate cu această tinctură în dreptul cariei.

În lipsă, Hrean ras, în aplicații locale.

Pătrunjelul

sucul frunzelor are rol în nevralgiile dentare.

Suc în amestec cu alcool de 70° în părți egale; se îmbibă un tampon de vată care se pune în dreptul cariei.

Ceapa

Aplicați cu Ceapă fiartă, pe gingie, în dreptul abcesului.

AFTELE

Sunt mici ulceratii superfiale, dureroase, apăute pe mucoasa buală.
În tratamentul lor au efecte pozitiv:

Lămâia

prin proprietățe sale astringente și antiseptice.
Tamponarea cu o felie de lămâie.
Badijonări cu suc.
Lăinâie tăiată în felii subțiri se ține în gură cât mai mult, cu miere și apă.

Ceapa

Tamponari cu suc de Ceap.

Usturoiul

Tamponări locale cu suc.

AMIGDALITELE

Sunt inflamații acute sau conice, de origine infecțioasă, ale amigalelor palatine sau linguale.
Pentru vindecarea lor se folosesc:

Gutuile

prin cumulara proprietăților astringente cu cele emoliente.
Gargarisme cu decoct din o gutuie mare, rasă, la 1 litru de apă, lăsându-se să flarbă până ce lichidul scade la jumătate.

Lămâia

Badijonări cu suc.
Lămâie tăiată în felii subțiri; se ține în gură cu miere și apă.

GINGIVITELE

Sunt intamații ale gingiilor

Lămâia

Tamponare cu vată îmbibată cu suc.
Tamponare cu o felie de lămâie.

Portocaele

În mod similar cu lămâile.

Măslinile

Masaje ale gingiei cu ulei de măsline.

Smochinele

Aplicații de smochine calde între gingie și obraz.

Hreanul

Tamponări cu tinctură din 20 g rădăcină de Hrean ras, macerat 2 săptămâni în 100 ml alcool.

PARADONTOZA

Este un proces patologic de retracție a gingiilor și de descoperire a dinților, împotriva căruia se folosesc:

Hreanul

datorită proprietăților revulsive, provoacă un aflux crescut de sânge în zonă.

Mestecarea în fiecare zi a unei rădăcini de Hrean.

Măslinile

Masaje ale gingiei cu ulei de măsline.

STOMATITELE

Sunt inflamații ale mucoasei bucale, caracterizate prin dureri ale cavității bucale (exacerbate prin deglutiție sau prin simplul contact al alimentelor în gură, creșterea salivației etc).

Mucoasa bucală poate prezenta vezicule, afte sau o roșeață difuză.

Pentru contracararea lor se utilizează:

Gutuile

Gargarisme cu un decoct preparat dintr-o gutuie mare, rasă, ce se lasă să fiarbă într-un litru de apă până se reduce la jumătate.

Lămâia

Badijonare cu suc. Tamponare cu o felie de lămâie. Lămâie tăiată în felii subțiri, ținută în gură cu miere și apă.

Portocalele

Badijonare cu suc.

Smochinele

Aplicații cu smochine calde.

Ceapa

Tamponări cu suc.

BOLILE APARATULUI DIGESTIV. SEGMENTUL GASTROINTESTINAL

ANOREXIA

Este diminuarea sau încetarea alimentării prin pierderea poftei de mâncare sau prin refuzul de a se alimenta.

Poate fi combătută folosindu-se:

Ardeiul iute

Prin conținutul în capsaicină este iritant, excitând puternic secrețiile gastrice; util în dispepsii atone, însă contraindicat pentru gastrite, ulcere, hemoroizi, stări catarale digestive.

Consumat ca atare, în cantități moderate.

Hreanul

Consumat ca atare.

Sirop pentru copiii fără apetit, din rădăcină de Hrean tăiată subțire, peste care se presară zahăr; din sucul care se formează se ia câte o linguriță înainte de mese.

Vin tonic prin macerarea a 30 g rădăcină de Hrean ras, timp de 24 de ore într-un litru de vin; se strecoară și se ia câte un pahărel de 50 ml înainte de mese.

Leușteanul

Consumat ca atare, în preparate culinare.

Pătrunjelul

Consumat ca atare, în salate și alte preparate culinare ușoare.

Reventul

Datorită gustului acrișor, pețiolii măresc secrețiile gastrice, însă din cauza conținutului ridicat în oxalați prezintă contraindicații în litiază oxalică, iar din cauza acidității crescute, în hiperaciditate.

Contraindicat și în hemoroizi.

Consumat în salate.

Ridichile

Consumate sub formă de salată (ridichile de iarnă se recomandă rase și cu un adaos de puțin ulei).

Tarhonul

Are și avantajul că este total neiritant.

Consumat ca atare, în salate sau alte preparate culinare ușoare.

Țelina

Consumată ca atare, în salate de crudități.

TONICE APERITIVE

Prin acest termen se înțeleg toate speciile de plante și tipurile de alimente care, datorită substanțelor active pe care le conțin, au proprietatea de a stimula secrețiile salivare și, prin act reflex, secrețiile gastrice și intestinale.

Se „administrează” întotdeauna, în cazul anorexiilor, înainte de masă.

Gutuile Rase, consumate ca atare.

Coacăzele roșii, Agrișele Consumate ca atare sau ca suc, înainte de mese.

Andivele — tonic-aperitive prin gustul lor amarui. Consumate în salate de crudități.

Asmățuiul, Consumat ca atare în preparate culinare.

Măcrișul, Ștevia Consumate în salate de primăvară (contraindicații severe în colici nefritice și litiaze).

Mărarul Frunzele consumate ca atare, în aseasonarea unor salate.

Păstârnacul Consumat în preparate culinare.

Pătrunjelul Frunzele consumate ca atare, în aseasonarea unor preparate culinare.

Salata verde (Lăptucile) Consumată ca atare, la începutul mesei.

Sparanghelul Consumat în salate, la începutul mesei.

Tarhonul — cu atât mai prețios cu cât este complet neiritant și suplinește sarea în regimul desodat.

Consumat ca atare, în salate sau muiat în oțet.

Țelina Rădăcina rasă, consumată în salată de crudități, la începutul mesei.

Usturoiul Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili, cu preparatele aperitive.

VOMA

Poate fi oprită și cu ajutorul următoarelor produse vegetale:

Gutuile

în vomismente cronice.

Consumate ca atare sau ca produse obținute din acestea (suc, sirop, jeleu).

Decoct dintr-o gutuie mare, rasă, la 1 litru de apă, lăsându-se să fiarbă până scade la jumătate; se îndulcește cu 50 g zahăr.

Pepelele galben

Semințele uscate și bine pisate, luate ca atare, cu puțină apă.

Mărarul

semințele sunt sedative nervoase, prin aceasta contribuind la combaterea sughițului rebel și vomei, îndeosebi la copii.

Decoct dintr-o linguriță de semințe fierte într-o cană cu lapte.

Varza

Suc de Varză, băut cu înghițituri mici.

GASTRITELE HIPERACIDE ȘI ULCERUL

Gastritele (infirmații ale mucoasei stomacului) pot fi hiperacide sau hipoacide (chiar anacide).

Gastritele hiperacide apar ca urmare a hipersecreției și hiperacidității sucului gastric, cauzele fiind multiple: alimentația neregulată și nerațională, abuzul de alcool, de tutun, de condimente, de ceai sau de cafea.

Nu în ultimul rând, aceste tulburări apar și ca urmare a stresului, a surmenajului fizic și psihic.

În cele mai multe cazuri, gastrita hiperacidă este un semn premonitoriu pentru ulcerul gastric și în special pentru cel duodenal (care înseamnă distrugerea localizată a mucoasei stomacului și duodenului — segmentul inițial al intestinului subțire).

Cercetări recente au demonstrat însă că la baza producerii bolii ulceroase și mai ales la transformarea malignă, din ulcer în cancer digestiv, un rol important revine unor bacterii denumite *Helicobacter pylori*.

Astfel, medicina alopata își propune actualmente să trateze ulcerul gastric sau duodenal cu medicație antiacidă și hiposecretorie gastrică, dar și cu un antibiotic din familia ampicilinei.

Fitoterapia recomandă următoarele semințe și legume:

Migdalele dulci

având o acțiune foarte complexă, uleiul gras din ele formează o peliculă protectoare pe mucoasa gastrică și, tamponând acidul clorhidric în exces, reduce secreția de pepsină, precum și senzațiile de dureri și arsuri gastrice.

Sâmburi zdrobiți, 30-35 g, de 2 ori pe zi.

Amestec din 30 g migdale dulci zdrobite, în 10 g lapte sau 5 g smântână.

Cartoful

Consumat în preparate culinare ușoare.
Suc proaspăt, câte 100 ml dimineața devreme.

Varza

prin acțiunea conjugată a vitaminei U (iactor antiulceros) și a vitaminei K (antihemoragică); calmează totodată senzațiile de pirozis.
Cure de suc, un pahar pe zi între mese.
Consumată ca atare, în salate de crudități sau preparate culinare ușoare; este necesar consumul a 300-400 g/zi.

SINDROAMELE DISPEPTICE

Acoperă un grup de tulburări digestive oare se manifestă prin grețuri, meteorism abdominal, hiperaciditate sau anaciditate, dureri epigastrice, lipsa poftei de mâncare.
Din punct de vedere etimologic, însuși cuvântul „dispepsie” înseamnă digestie dificilă, tulburată.
În cazul lipsei sau reducerii concentrației de acid clorhidric în sucul gastric, are loc fenomenul de reducere a activității digestive, mai ales în metabolismul proteinelor și în special în ceea ce privește scindarea moleculelor protidice.
De aceea, sunt recomandabile specii medicinale cu un conținut ridicat în substanțe active amare.

Ardeiul iute

prin proprietățile sale gastrosecretoase, este foarte util în dispepsiile atone.
Se va consuma ca atare în cantități moderate.

Toate tonicele aperitive (amare) prezentate la capitolul despre „Anorexie” sunt bine venite în dispepsiile hipo- sau anacide.

Lămăile, portocalele

Consumate ca atare sau ca suc proaspăt.

Strugurii

Consumați ca atare sau sub formă de cură de must.

Hreanul

prin intensificarea secrețiilor gastrice, este util în gastrite hipoacide.
Consumat ca atare, în scopuri condimentare.
Infuzie din 15-30 g la litru, lăsat la macerat 12 ore; se iau 2 căni pe zi, între mese.

Leușteanul

Consumat ca atare, în preparate culinare.
Infuzie de frunze cu 2 lingurițe la cană, 2 căni pe zi.

Tarhonul

foarte util pentru dispepticii care trebuie să evite regimul sărat.
Consumat ca atare, în salate sau murat în oțet.

Tomatele

utile în hipoaciditate și atonia stomacului, stimulând secreția de suc gastric.
Consumate ca atare sau sub formă de suc.

Usturoiul

Consumat ca atare, zilnic minimum 2-3 bulbili zdrobiți.

În tratarea sindroamelor dispeptice un loc important îl ocupă **Stomahicele**, specii de plante care favorizează digestia prin stimularea secreției sucurilor gastro-intestinale:

Castanele

Pireu de castane.

Decoție scurtă (2-3 minute) din 15-20 g la 1 litru, 2-3 căni pe zi.

Coacăzele negre, Coacăzele roșii, Agrișele

Consumate ca atare sau sub formă de suc (100-300 g pe zi), după mesele principale.

Merele

Consumate ca atare.

Porumbele

Decoct cu o lingură la cană, 2 căni pe zi.

Strugurii

Consumați ca atare, în special strugurii albi.

Asmățuiul

Consumat ca atare, în aromarea unor preparate culinare.

Ceapa

Consumată ca atare, minimum 1-2 cepe pe zi.

Hreanul

Consumat ca atare, în scopuri condimentare.

Vin tonic, din macerarea timp de 24 de ore a 30 g Hrean ras la 1 litru de vin;
se strecoară și se ia câte un păhărel de 50 g înainte de mese.

Mărarul

Consumul este indicat în preparatele culinare.

Pătrunjelul

Consumat ca atare în preparate culinare.

Reventul

Compot de pețiolii, consumat după mese.

Este contraindicat în litiază oxalică, hiperaciditate gastrică, suferinșilor de hemoroizi.

Spanacul

Consumat ca atare; este contraindicat copiilor și persoanelor vârstnice suferind de litiaze oxalice, reumatism și gută.

Tarhonul

Infuzie dintr-o lingură de plantă la o cană cu apă; se beau 2 căni pe zi după mesele principale.

Usturoiul

Consumat ca atare, zilnic minimum 2-3 bulbili.

Varza

datorită acidului lactic, varza acră stimulează digestia.

Consum de salate din varză acră tăiată mărunț, cu puțin ulei.

METEORISMUL (BALONĂRILE)

Este definit ca acumularea de gaz în intestin și se traduce prin creșterea în volum a abdomenului.

În tratarea meteorismului au efecte benefice:

Lămâile, portocalele

Consumate ca atare sau sub formă de suc (până la 200 g pe zi).

Ceapa

proprietățile sale carminative (de inhibare a proceselor fermentative din intestin și de resorbție a gazelor formale) se datorează acțiunii antiseptice a fitoncidelor (substanțe active din plante superioare care au proprietatea de a inhiba dezvoltarea germenilor patogeni).

Consumată ca atare, minimum 1-2 cepe pe zi.

Leușteanul

Infuzie din semințe cu 1/2 linguriță la cană, 2 căni pe zi.

Mărarul

semințele sunt printre cele mai puternice carminative.

Infuzie din semințe cu o linguriță la o cană, 2-3 căni pe zi.

Morcovul

de asemenea, utilizate frunzele.

Infuzie dintr-o linguriță la o cană, 2 căni pe zi.

Pătrunjelul

Infuzie din semințe cu 1/2 linguriță la o cană, 2-3 căni pe zi.

Usturoiul

Consumat ca atare, zilnic cel puțin 2-3 bulbili.

Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți, fierți 15-20 minute în 200 ml apă sau lapte, cantitate care se bea în cursul unei zile.

DIAREEA

Evacuarea acută sau cronică de scaune foarte frecvente, care poate fi atenuată sau oprită (și) cu ajutorul produselor naturale:

Afinele

pot fi considerate adevărate medicamente prin acțiunea conjugată a taninurilor, cu puternice proprietăți astringente, a antocianilor (substanțe colorate), care le potențează proprietățile, și a substanțelor fitoncide* care inhibă dezvoltarea colibacililor, având eficacitate deosebită în diareile de fermentație.

* Substanțele fitoncide sunt substanțe active din plante superioare care au proprietatea de a opri dezvoltarea germenilor patogeni.

Cură de afine (300-700 g proaspete sau 100 g uscate pe zi).

Decoct cu o lingură de afine uscate la cană sau macerat la rece cu aceeași cantitate, timp de 8 ore, bându-se 2-căni pe zi.

Afinată sau cidru (băuturi slab alcoolice, din fermentație naturală, consumate în cantități moderate și numai de către adulți).

Arahidele

Consumate ca atare, ușor prăjite.

Caisele

în stare proaspătă sunt astringente (în stare uscată devin, dimpotrivă, ușor laxative).

Consumate ca atare.

Castanele

datorită conținutului ridicat în tanin, sunt utile în diarei benigne și dizenterie.

Pireu de castane.

Decoție scurtă (2-3 minute) din 15-20 g castane zdrobite la 1 litru, 2-3 căni pe zi.

Gutuile

recomandate inclusiv în diareile celor debilitați, a convalescenților, copiilor și vârstnicilor, deoarece acțiunea taninului este atenuată de acțiunea emolientă datorată mucilagiilor.

Consumate ca atare sau sub formă de produse obținute din acestea (suc, sirop, jeleu).

Decoct dintr-o gutuie mare, rasă, la 1 litru de apă, ce se lasă să fiarbă până se reduce la jumătate, cantitate care se bea în cursul unei zile; îndulcit cu 50 g zahăr.

Cătina

Infuzie din 1-2 lingurițe la o cană, 2-3 căni pe zi.

Merele

recomandate îndeosebi în diareile copiilor.

Consumate ca atare.

Mere rase, administrându-se copiilor 1/2-1 kg pe zi, în 5 mese.

Moșmoanele

puternic astringente, cu efecte chiar în diarei dizenterice.

Consumate ca atare sau în compot. Sirop din 1 kg fructe, 800 g zahăr și 500 ml apă, fierbându-se 1 oră la foc mic; se bea dimineața cca 100 g.

Sirop obținut din 1 kg de suc (din. fructe zdrobite și lăsate peste suc lor timp de 24 de ore și 900 g zahăr, fierbându-se până la consistența siropoasă; se iau 3—4 linguri pe zi.

Porumbele

utile în diarei însoțite de dureri și spasme.
Decoct din o lingură la cană, 2 căni pe zi.

Ceapa

Consumată ca atare, minimum 1-2 cepe pe zi.

Guliile

Consumate ca atare.
Decoct prelungit din cca 200 g la 1 litru.

Hreanul

Consumat ca atare, în scopuri alimentare.
Infuzie din 15-30 g la 1 litru, care se lasă la macerat 12 ore; se iau 2 căni pe zi, între mese.

Morcovul

unanim apreciat, în special în diareile sugarilor.
Supă din 500 g morcovi rași, fierți 1/2 oră (sau 1/4 oră în oala sub presiune); se pasează și se completează până la 1 litru de apă fiartă, administrându-se nou-născuților cu biberonul și înlocuindu-se treptat cu lapte.

Urzica

Consumată în preparate culinare ușoare.
Infuzie din 2-3 linguri frunze uscate la o cană, 2-3 căni pe zi.

Usturoiul

antidiareic și antidizenteric datorită puternicei acțiuni antibacteriene.
Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili pe zi.
Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți, fierți 15-20 minute în 200 ml apă sau lapte, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Varza

numai ca varză proaspătă, varza acră fiind, dimpotrivă, laxativă.
Consumată ca atare, în salate sau preparate culinare ușoare (pentru a avea efect, trebuie consumate 300-400 g pe zi).
Varză fiartă îndelung.

ENTEROCOLITELE

Sunt inflamații simultane ale mucoaselor intestinului subțire și, respectiv, colonului.
În tratarea lor se folosesc:

Afinele

având acțiune bacteriostatică, distrug flora patogenă intestinală.
Cură de afine (300-500 g fructe proaspete sau 100 g fructe uscate pe zi).

Decoct din o linguriță de afine uscate la o cană sau macerat la rece cu aceeași cantitate, timp de 8 ore,ându-se 2 căni pe zi.

Afinată consumată în cantități moderate, exclusiv de către adulți.

Castanele

Decoție scurtă (2-3 minute) din 15-20 g castane zdrobite la 1 litru, 2-3 căni pe zi.

Măceșele

Decoție scurtă din 2 linguri de pulpă mărunțită la 1/2 litru de apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Migdalele dulci

prin acțiunea lor antiseptică remarcabilă, sunt utile în colitele de fermentație.

Consumate ca atare sub formă de sâmburi zdrobiți.

Porumbele

eficiente în colitele de fermentație.

Decoct din o lingură la o cană, 2 căni pe zi.

Consumate sub formă de compot (îndulcit cu zaharină).

Napii

Consumați ca atare.

Decoct din 100 g napi tăiați în felii la 1 litru de apă sau lapte.

Usturoiul

prin puternica sa acțiune antibacteriană. Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili pe zi.

Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți, fierți 15-20 minute în 200 ml apă sau lapte, cantitate care se bea în cursul unei zile.

COLICILE

Sunt dureri spasmodice legate de distensia tubului digestiv.

Pentru atenuarea lor se folosesc:

Sparanghelul

Tinctură din o parte Sparanghel mărunțit fin și 2 părți alcool de 70°, macerarea durând 10-15 zile; se iau 5-6 picături, de 2-3 ori pe zi, după mese.

Mărarul și Chimionul

semințele lor sunt recomandate în special pentru combaterea colicilor la copii.

Infuzie din semințe, dintr-o lingură la cană, 2-3 căni pe zi.

Usturoiul

atenuează colicile produse de colitele de fermentație.

Consumat ca atare, zilnic minimum 2-3 bulbili pe zi.

Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți, fierți 15-20 minute în 200 ml apă sau lapte, cantitate care se bea în cursul unei zile.

HELMINTIAZELE

Sunt boli parazitare determinate de infestarea cu anumiți viermi intestinali.

Pentru combaterea helminților (viermilor) se folosesc următoarele plante cu proprietăți vermifuge:

Afinele

cu efect în special în oxiuriază; fiind complet inofensive, se recomandă în special copiilor.

Cură de afine, timp de cel puțin 3 zile consecutiv (minimum 300-500 g zilnic), fără a se consuma nici un alt aliment (cel mult 100 g zilnic sau apă la cerere).

Alunele

se utilizează uleiul ca tenifug.

Ulei de alune, câte o linguriță în fiecare dimineață, timp de 15 zile.

Fragile, căpșunile

cu acțiune în oxiuriază.

Consumate ca atare, câte 500 g dimineața, fără a se mai consuma ceva până la prânz.

Lămâile

semințele sunt un remediu contra oxiurilor.

Macerarea la cald timp de 2 ore a unei lămâi cât mai bogate în semințe, zdrobite, în apă cu miere; se stoarce și se bea seara la culcare, cura durând cel puțin 5-6 zile.

Sâmburi zdrobiți (2 lingurițe) cu miere; se iau 5-6 zile la rând, dimineața pe stomacul gol.

Măceșele

numai pulpa fructului are un bun efect tenifug.

Pulpă mărunțită și amestecată cu miere în părți egale, luându-se 2-3 lingurițe dimineața pe stomacul gol, în cure de 8-10 zile.

Măslinile

uleiul este un adjuvant antihelmintic general.

Ulei de măsline, câte 20-40 ml pe zi, 5-6 zile la rând.

Piersicul

în combaterea oxiurilor sunt utile frunzele și fiorile.

Infuzie din 1-1,1/2 lingură la o cană de apă sau lapte 2-3 căni pe zi, în cure de 5-6 zile.

Spălături locale cu aceeași infuzie.

Dovleacul

semințele sale constituie un remediu antihelmintic cert în combaterea teniei și ascarizilor.

Semințe cojite și zdrobite, luate dimineața în priză unică, 150-250 g pentru adulți, cca 100 g pentru copiii de vârstă școlară și 50 g pentru copiii mai mici, fie cu zahăr, fie cu miere; după 1-2 ore se administrează ulei de Ricin sau ceai laxativ (se procură de la magazinele de produse naturale).

Hreanul

cu acțiune tenifugă puternică.

Consumat ca atare, cel puțin 20-30 g pe zi; se consumă în paralel în cantități mai mari cu ceapă și fructe crude.

Morcovul

are, de asemenea, acțiune tenifugă.

Suc proaspăt, 60-150 ml pe zi, îndoit cu apă, câteva zile la rând.

Pătrunjelul

eficient în combaterea oxiurilor. Infuzie din frunze cu 2 lingurițe la cană, 2-3 căni pe zi, 5-6 zile la rând.

Spălături locale cu infuzie mai concentrată (2 linguri la o cană).

Prazul

datorită proprietăților antihelmintice pe care le au radicele (popular „mustățile”), are eficiență în combaterea limbricilor și oxiurilor.

Decoct din radicele, cu 2 lingurițe la o cană; se bea dimineața 5-6 zile la rând.

Usturoiul

cu acțiune certă în teniase, ascaridioze, oxiuriază (la cea din urmă și în uz extern).

Sirop din 50 g bulbili de usturoi fierți în 200 ml apă; se filtrează, se îndulcește cu 50 g zahăr și se iau 2-3 linguri pe zi; se bea întreaga cantitate dimineața pe stomacul gol; se repetă mai multe zile la rând (util în teniase).

Macerat la cald din 3—4 bulbili zdrobiți la o cană de apă sau lapte în clocot; se lasă peste noapte, iar dimineața se bea întreaga cantitate, 3 săptămâni la rând (în oxiuriază și ascaridioze).

Spălături locale cu 4—5 bulbili zdrobiți în 200-300 ml de apă (pentru oxiuri).

Varza

sucul are efect în combaterea oxiurilor și limbricilor.

Suc 200-300 ml, consumat 5-6 zile la rând dimineața pe stomacul gol.

CONSTIPAȚIA

Inseamnă evacuarea anormal de rară a scaunelor.

Nu se poate vorbi de constipație decât dacă este vorba de trei scaune pe săptămână.

Pentru combaterea ei sunt utile:

Caisele

proprietate laxativă au caisele uscate (cele proaspete sunt, dimpotrivă, astringente).

Consumate ca fructe uscate.

Ciresele, vișinele

Consumate ca atare.

Infuzie din fructe uscate cu 1 lingură la o cană.

Coacăzele roșii, agrișele

Consumate ca atare.

Suc 100-300 g pe zi, în 3-4 reprize.

Fragile, căpșunile

Consumate ca atare; pentru mărirea efectului laxativ se pot consuma 300-500 g dimineața pe stomacul gol.

Merele

Consumate cu coajă cu tot.

Sirop laxativ pentru copii, din suc de mere și zahăr în părți egale, fierbându-se la foc mic până la consistența siropoasă.

Măslinile

uleiul este foarte util, deoarece nu produce colici.

Ulei de măsline, 20—40 ml într-o doză.

Migdalele

Consumate ca atare.

Perele

cu acțiune mai marcantă decât merele cu coajă.

Consumate ca atare (nerecomandate pentru cei cu cataruri digestive, hemoroizi).

Cidrul de pere.

Pepenele verde, Pepenele galben

Se consumă ca atare (acțiune mai marcantă pentru Pepenele galben, comparabil cu prunele).

Suc proaspăt (efect mai puternic decât pulpa integrală).

Piersicile

Consumate ca atare, sub formă de suc sau compot.

Portocalele

Consumate ca atare.

Coaja de la 2 portocale se fierbe 30 minute, aruncându-se apa; se fierbe din nou în apă îndulcită obținută din 20 g zahăr la litru, se scoate și se usucă pe o farfurioară, consumându-se a doua zi dimineața.

Prunele

principalele fructe laxative, cunoscute încă din Antichitatea greco-romană; intră în diverse farmacopei.

Recomandate în constipații cronice, hemoroizi (însă nu atunci când sunt însoțite de colite).

Consumate ca atare, mai ales dimineața sau la începutul mesei (8-20 bucăți).

Decoct din fructe uscate.

Infuzie dintr-o prună și o smochină (lăsate la macerat câteva ore); aceasta din urmă fiind emolientă, se evită iritarea tractului digestiv.

Suc de prune, câte un pahar înainte de mese.

Smochinul

Decoct din rămurile tinere tăiate mărunt (2 linguri la cană).

Socul

Decoct din o linguriță de fructe la o cană; după ce dă în clocot, se storc boabele și se adaugă zahăr; se beau 1-2 căni pe zi.

Strugurii

Consumați ca atare, în special strugurii albi, cu gust mai acid.

Asmățuiul

Consumat ca atare, în aromarea unor preparate culinare.
Infuzie din fructe sau semințe cu o linguriță la cană, 2 căni pe zi.

Castravetele

Consumat ca atare sau sub formă de suc.

Ceapa

Consumată ca atare.

Dovleacul

Consumat ca atare în preparate culinare dietetice.
Suc din dovlecei tineri.

Grâul

Sub formă de tărațe, fie fierte în apă, fie în amestec cu miere, în părți egale: câte 3-4 linguri seara înainte de culcare.
Capsule de ulei concentrat, 4-6 pe zi, conform prospectului.

Leușteanul

Consumat ca atare în preparate culinare.

Mazărea

Consumată în preparate culinare.

Măcrișul, Ștevia

cu contraindicații însă în colici nefritice, litiaze, ulcere și gastrite hiperacide.
Consumate ca atare, în salate sau preparate culinare ușoare.
Infuzie din 20-30 g la litru, 2 căni pe zi.

Prazul

este un laxativ remarcabil, care calmează totodată stările iritative ale tractului digestiv.
Consumat ca atare.

Reventul

pețiolii, deși mai puțin activi decât rizomii, sunt laxativi importanți (contraindicații în litiaze oxalice, hiperaciditate, hemoroizi).
Consumat ca atare.
Suc, 30-40 ml înainte de mese, din pețioali spălați și tăiați în cuburi de cca 2 cm, ținute 2 minute în apă în clocot, apoi scoase, scurse și stoarse.

Salata verde

Consumată abundant la masa de seară, provoacă evacuarea bolului intestinal în dimineața următoare.

Spanacul

Consumat în preparate culinare.
Infuzie din 2 lingurițe de semințe la cană, 2 căni pe zi.

Sparanghelul

Consumat ca atare, în salate și preparate culinare dietetice.

Tomatele

Consumate ca atare sau sub formă de suc.

Varza

Consum de zeamă de varză acră, până la 1 litru pe zi.

Inul

Ca atare, pentru adulți, 2 lingurițe de semințe întregi, spălate rapid într-un jet de apă și lăsate timp de 2-3 ore la temperatura camerei, după care se „administrează” cu totui, preferabil seara, înainte de culcare.

GLANDELE DIGESTIVE ANEXE (FICATUL ȘI PANCREASUL)

HEPATITELE

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale digestiei și totodată locul neutralizării toxinelor și a altor substanțe care ajung în sânge.

În sensul larg al termenului, prin hepatite definim orice boală caracterizată prin inflamația celulelor ficatului.

Hepatita este un concept medical foarte larg ce cuprinde numeroase entități clinice și anatomopatologice: hepatitele acute sunt numai cele virale (virusul A, care se transmite pe cale digestivă, virusul B, transmis prin transfuzii de sânge infectat cu virusul respectiv sau pe cale sexuală, virusul C, cu aceeași cale de transmitere ca și B, virusul D care apare numai dacă există infestarea cu virusul B, virusul E, transmis tot pe cale digestivă, virusul F — „French virus hepatitic”, descoperit relativ recent, virusurile G, B, virusuri ce nu s-au identificat cu nici unul dintre virusurile cunoscute până în prezent etc).

Hepatitele cronice se caracterizează prin suferință hepatică prelungită la mai mult de șase luni, după episodul acut viral sau după expunerea la noxe hepatice toxice (alcool, medicamente — paracetamol, izoniazidă etc, derivați benzenici, lacuri, vopsele, detergenți, insecticide, fungicide etc).

Rezultă de aici importanța hepatotroficelor, a antihepatotoxicelelor și a stimulentelelor funcției hepatice de factură vegetală:

Agrisele

Consumate ca atare sau sub formă de compot, supe sau garnitură cu sosuri albe.

Suc (100-300 ml pe zi) în 3-4 reprize.

Cireșele, vișinele

ajută la regenerarea parenchimului hepatic în sechelele de hepatită.

Consumate ca atare, făcându-se cure cu cel puțin 0,5 kg pe zi pe toată perioada de fructificare.

Cură de suc, cel puțin 200-300 ml pe zi.

Infuzie cu o lingură de cireșe uscate la o cană, 2-3 căni pe zi.

Fragile, căpșunile

Consumate ca atare, putându-se face cure cu minimum 300-500 g pe zi, de preferință dimineața.

Gutuile

Consumate ca atare sau sub forma unor produse obținute din acestea (suc, sirop, jeleu).
Decoct dintr-o gutuie mare, rasă, la 1 litru de apă, lăsându-se să fiarbă până ce lichidul scade la jumătate, îndulcindu-se cu 50 g zahăr; se bea în cursul unei zile.

Lămâile

cu efecte bune în refacerea parenchimului hepatic în hepatite sau chiar în preciroze.
Consumate ca atare sau în limonade, în cure de lungă durată, cel puțin 1-2 bucăți pe zi.
Suc, până la 200 ml pe zi.

Măceșele

Infuzie (sau decoctie scurtă) din 2 linguri la jumătate de litru de apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Măslinile

sub formă de ulei. Administrarea unei linguri de ulei dimineața, pe stomacul gol, eventual în amestec cu sucuri de fructe; se stă culcat 20-25 minute pe partea dreaptă.

Prunele

Consumate ca atare.
Decoct din prune uscate.

Strugurii

utili în hepatite sau chiar în ascitele consecutive unor hepatite.
Consumați ca atare sau sub formă de cură de must.

Fasolea verde

Consumată în preparate culinare ușoare.
Infuzie din 2 linguri de teci de fasole verde uscate și fragmentate în 250 ml apă; se lasă la macerat de seara până dimineața și se consumă în timpul zilei 2 căni în tratament de lungă durată.

Morcovul

stimulent al regenerării parenchimului hepatic. Consumat ca atare.
Suc, câte 100-200 ml consumat dimineața pe stomacul gol, cu 20-25 minute pauză pe partea dreaptă.

Pătlăgelele vinete

Consumate sub formă de preparate culinare.

Reventul

contraindicat însă celor cu litiază oxalică, gută, ca și suferinzilor de hiperaciditate gastrică sau de hemoroizi. Suc de pețiole spălați, tăiați în cuburi de cca 2 cm, ce se țin 2 minute într-un vas cu apă rece, se scurg și se storc; se bea 30-40 ml.

Ridichile

Consumate sub formă rasă (eventual cu mere rase).
Suc (de preferat în amestec cu suc de morcovi), câte 30-40 ml cu cca 15 minute înainte de mese.

Salata verde

Consumată ca atare.

CALCULOZA (LITIAZA) BILIARĂ

Este o boală caracterizată prin prezența calculilor (concrețiuni pietroase care rezultă prin precipitarea anumitor componente — calciu, colesterol — ale bilei).

Acești calculi se formează în vezicula biliară (rezervorul de bilă) și pot migra în căile excretorii biliare (canalele ce ies din veziculă și din ficat), care se reunesc pentru a forma caftalul coledoc.

În calculoza (litiataza) biliară au eficiență:

Cireșele

Consumate ca atare, făcându-se cure pe toată perioada lor, cu cel puțin 0,5-1 kg pe zi.

Infuzie cu 1 lingurița de cireșe uscate la o cană, 2-3 căni pe zi.

Măslinile

sub formă de ulei.

Administrarea unei linguri de ulei dimineața, pe stomacul gol, eventual în amestec cu sucuri de fructe; se stă 20-25 minute culcat pe partea dreaptă.

Cartoful

Consumat ca atare, în preparate culinare ușoare.

Suc proaspăt, 100-200 ml (eventual în amestec cu suc de morcovi).

Ceapa

Macerat dintr-o ceapă mare, tăiată mărunt și 4 linguri de ulei, timp de 10 zile, luându-se 2-3 lingurițe pe zi.

Năsturelul

Consumat sub formă de salată.

Suc proaspăt (60-150 ml pe zi), îndoit cu apă rece.

Ridichea

unul dintre cele mai importante produse vegetale în tratamentul calculozei.

Suc, de preferat în amestec cu suc de morcovi, luat câte 20-40 ml cu cca 15 minute înainte de mese.

Consumate sub formă de ridichi rase (eventual cu mere rase).

COLICILE HEPATO-BILIARE

Calculoza biliară poate avea drept complicație, printre altele, și colica hepato-biliară, care înseamnă o durere intensă prin blocarea unui calcul în canalul coledoc.

În cazul acestei complicații vor fi folosite:

Lămâia

cu rezultate deosebite în calmarea crizelor acute hepato-biliare.

Decoct timp de 20 minute dintr-o lămâie stoarsă și tăiată bucățele mici la 300 ml apă, într-un vas acoperit; se strecoară, se îndulcește și se adaugă sucul stors.

Măslinile

sub formă de ulei.

Administrarea unei linguri de ulei; se stă 20-25 minute culcat pe partea dreaptă.

Pătrunjelul

Infuzie din frunze, cu o linguriță la o cană, 2-3 căni pe zi.

DISCHINEZIA BILIARĂ

Termenul generic de dischinezie desemnează un proces patologic caracterizat prin alterarea mecanismelor de reglare a activității motorii.

Dischinezia biliară reprezintă o alterare funcțională a mecanismului de eliminare a bilei, care se manifestă prin dureri în loja superioară dreaptă a abdomenului, prin grețuri și vărsături.

Tulburarea funcțională afectează fie vezicula biliară și sfincterul său, fie canalul coledoc și sfincterul său (denumit Oddi).

Dischinezia biliară, denumită și distonie biliară, indiferent dacă are la origine atonia sau hipotonia veziculei biliare, reprezintă o tulburare motorie care împiedică evacuarea bilei din vezicula biliară.

În acest tip de afecțiune, sunt indicate produse vegetale cu acțiune colagogă (care favorizează eliminarea secrețiilor biliare din veziculă și căile biliare extrahepatice în duoden) sau/și coleretice (care stimulează secrețiile celulei hepatice, măbind volumul de bilă secretat):

Măslinile

sub formă de ulei.

Administrarea unei linguri de ulei dimineața, pe stomacul gol, eventual în amestec cu sucuri de fructe; se stă culcat 20-25 minute pe partea dreaptă.

Portocalele

prin proprietățile lor coleretice—colagoge ușoare.

Consumate ca atare sau sub formă de suc.

Porumbele

Decoct din o lingură la o cană, 2 căni pe zi.

Strugurii

Consumați ca atare sau sub formă de cură de must.

Asmățuiul

Consumat ca atare, în aromatizarea unor preparate culinare.

Infuzie din frunze sau semințe, cu o linguriță la o cană, 2 căni pe zi.

Pătrunjelul

frunzele acționează ca puternic stimulent al musculaturii netede și au efect colagog.

Consumat ca atare, în adăos la diferite preparate culinare.

Infuzie din o linguriță de frunze la o cană, 2-3 căni pe zi.

Ridichile

Ridiche rasă (eventual în amestec cu măr ras).

Suc (de preferat în amestec cu suc de morcovi), câte 30-40 ml cu cca 15 minute înainte de mese.

Usturoiul

Consumat ca atare, zilnic, minimum 2-3 bulbili zdrobiți.

Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți, fierți 15-20 minute în 200 ml apă sau lapte, cantitate care se bea treptat în cursul unei zile.

INSUFICIENȚA PANCREATICĂ

Privește fie funcția exocrină (secreția în intestin a enzimelor care asigură digestia proteinelor, lipidelor și glucidelor), fie funcția endocrină (secreția în sânge a hormonilor, dintre care cel mai important este insulina).

Diabetul zaharat are drept cauză și această insuficiență a secretării insulinei de către pancreas. Principalele stimulente ale funcției pancreatice în lumea vegetală sunt:

Fasolea verde

Consumată în preparate culinare ușoare.

Infuzie din 2 linguri teci de fasole verde uscate și fragmentate în 250 ml apă; se lasă la macerat de seara până dimineața și se consumă în timpul zilei 2 căni, în tratament de iungă durată.

Pătlăgelele vinete

Consumate sub formă de preparate culinare.

Spanacul

cu contraindicații pentru litiaze oxalice, artrite, reumatism.

Consumat ca atare, în preparate culinare ușoare. Suc, câte un pahar luat dimineața.

Tomatele

Consumate ca atare sau sub formă de suc.

Urzicile

prin conținutul ridicat de secretină, au rezultate bune în insuficiența pancreatică.

Salată de urzici tinere

Suc (cca 20-30 ml), diluându-se cu 5 părți apă.

Infuzie din 1-2 linguri frunze uscate la cană, 2-3 căni pe zi, în cure de cel puțin o lună.

Castravetele amar (Momordica charantia)

relativ recent introdus în cultură în țara noastră.

Se consumă fructele verzi, imature, în diferite preparate culinare.

Tot din fructe verzi, tăiate în felii subțiri și uscate la maximum 40°C, se poate prepara o pulbere fină cu o râșniță electrică.

Din pulberea obținută se iau până la 8 g pe zi, cel puțin 30 zile.

Pe baza acestei plante în combinație cu alte specii este în curs de preparare un medicament după un brevet românesc.

BOLILE APARATULUI GENITAL

APARATUL GENITAL FEMININ. DISMENOREELE

(MENSTRELE DUREROASE) ȘI CICLURILE MENSTRUALE NEREGULATE

Smochinul

Frunzele lui au rol în reglare a ciclurilor (proprietăți emenagoge).
Infuzie din 20-30 g la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Leușteanul

Infuzie de semințe cu 1/2 linguriță la o cană, 2 căni pe zi.

Mârarul

Infuzie din 1 linguriță la o cană, 2-3 căni pe zi.

Păstârnacul

Consumat în preparate culinare. Decocție din 1 lingură de rădăcini uscate la o cană, 2-3 căni pe zi.

Pătrunjelul

rădăcinile, dar în special frunzele sunt printre cele mai active.
Consumul frunzelor și rădăcinilor în preparate culinare.
Decoct din 50 g rădăcini la 1 litru, fierte 20 minute; se strecoară și se îndulcește, bându-se 2-3 căni pe zi.

Salata verde

Consumată ca atare.
Decoct din 60-80 g la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

APARATUL GENITAL FEMININ. LEUCOREEA

Cunoscută sub denumirea de pierdere albă vaginală („poală albă”), se manifestă printr-o creștere exagerată a secrețiilor vaginale normale.
Este însoțită adesea de o iritație locală, de arsuri, de mâncărimi și de dureri în timpul raporturilor sexuale.
Poate fi combătută și cu ajutorul plantelor:

Nucul

Frunzele, bogate în tanin, au proprietăți antileucoreice.
Spălături locale cu decoct concentrat din 50-80 g la 1 litru.

Pătrunjelul

Spălături locale cu decoct concentrat din semințe, cu 2 linguri la 100 ml apă.

APARATUL GENITAL MASCULIN. PROSTATITELE

Reprezintă infecții acute sau cronice ale prostatei.

Sunt afecțiuni genito-urinare frecvente, care afectează bărbații de toate vârstele, cu o frecvență deosebită la adulții tineri.

Părul

prin creșterea diurezei produse de frunze, urina devine clară, iar frecvența micțiunilor se diminuează. Infuzie din 100 g frunze proaspete sau 25 g frunze uscate la 1 litru apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Ceapa

ameliorează simțitor starea bolnavilor; este utilă în pregătirea acestora pentru intervenții chirurgicale, mai importantă fiind însă acțiunea sa preventivă.

Tinctură dintr-o ceapă zdrobită, macerată 10 zile într-o cantitate egală de alcool; se filtrează și se iau 2 lingurițe pe zi, înainte de masa de prânz și înainte de culcare, în cure de 10 zile pe lună, timp de 6 luni pe an.

Dovleacul

se folosesc în acest scop semințele decojite.

Semințe decojite, luate ca atare, câte 2 linguri pe zi.

Decoct din semințe zdrobite, cu o lingură la cană; se beau 2 căni pe zi, în cure de lungă durată.

Varza albă

Aplicații repetate cu frunze pe regiunea lombară și pe partea inferioară a abdomenului.

Floarea-soarelui

Semințe decojite, 2-3 linguri pe zi.

BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

TUSEA

Este un act reflex, destinat să împiedice pătrunderea corpi străini în căile aeriene și, pe de altă parte, să provoace expulzarea mucozităților și secrețiilor acumulate în bronhii.

Tusea poate avea origini foarte diverse: bronho-pulmonare, otorino-laringologice, pleurale, cardiace sau digestive.

Există mai multe tipuri de tuse, clasificată după caracterul său, dintre care amintim două:

- tusea uscată, cu timbru sec, neurmată de expectorație;
- tusea convulsivă (tusea „măgărească”): apare în accese paroxistice, care încep cu o inspirație profundă, după care survin sacade scurte și rapide, până la golirea aerului din plămâni.

Pentru tusea cu diferite etiologii, farmacia naturii recomandă:

Coacăzele negre

Sirop din 250 g fructe la 1 litru apă, fierbându-se până scade la jumătate; se strecoară, se adaugă o cantitate egală de zahăr și se fierbe din nou până la jumătate.

Se ia câte o linguriță la 2 ore.

Gutuile

Infuzie din o linguriță la o cană, câte 2 căni pe zi.

Strugurii

cei stafidiți au proprietăți antitusive.

Stafidiți, consumați câte 100-200 g minimum pe zi.

Cartofii

Inhalații cu aburi de cartofi fierți.

Ceapa

Infuzie din 4-6 cepe la 1 litru de apă, îndulcită cu 100 g miere sau zahăr; se strecoară și se beau 2 căni pe zi, din care una dimineața.

Napii

Decoct din 100 g napi tăiați în felii la 1 litru apă sau lapte.

Prazul

Sirop din decoct concentrat (200 g la 1 litru apă), amestecat cu miere în cantitate egală; se iau 4-5 linguri pe zi.

Ridichile negre

Sirop din ridichi tăiate felii, peste care se presară zahăr; după 24 de ore se strânge siropul care s-a lăsat, administrându-se 3-4 lingurițe pe zi.

La o ridiche scobită, se umple scobitura cu zahăr (sau miere) și hrean; se coace, apoi se strânge sucul care se lasă, bându-se 3-4 lingurițe pe zi.

Țelina

Decoct din cca 30 g la 1/2 litru; se beau 2-3 căni pe zi.

Suc, câte 100 g dimineața înainte de masă.

TUSEA SPASTICĂ ȘI CONVULSIVĂ

pot fi utilizate:

Migdalele

Decoct din 50 g coajă de migdale la 1 litru de apă, cantitate care se bea în cursul zilei, de preferință îndulcit cu miere.

Piersicul

florile, prin proprietățile lor antispastice, calmează tusea convulsivă.

Infuzie din 1-1.5 lingură de flori la o cană de apă sau lapte; se iau 2-3 căni pe zi.

Sirop din infuzie concentrată de flori și frunze (cu 100 g la litru), cu o greutate egală de zahăr sau miere, fierbându-se la foc mic până la consistența siropoasă; se iau 20-30 g pe zi.

Salata verde

prin proprietățile sale antispastice.

Decoct din 60-80 g la litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Usturoiul

Decoct din 3-4 bulbili zdrobiți, fierți 15-20 minute în 0.5 litri apă sau lapte, cantitate care se bea în cursul unei zile.

LARINGITELE ȘI FARINGITELE

Laringitele sunt inflamații ale mucoasei laringiene, care se integrează de obicei într-un tablou inflamator complex, care cuprinde întreg arborele respirator superior (mucoasa nazală, faringe, laringe, trahee). Deseori, laringitele se confundă cu faringitele (poate și din cauza asemănării lor verbale).

Diferențierea dintre cele două se face pe baza simptomatologiei: dacă, în cazul faringitelor, simptomul dominant este durerea spontană cu sediul în „gâtlej” și iradieri spre zona auriculară (a urechilor), laringitele sunt centrate simptomatologic pe răgușeală și tuse iritativă, însoțite sau nu de dispnee. În tratarea laringitelor și faringitelor se poate face apel la:

Coacăzele negre

Sirop din 250 g fructe la 1 litru de apă, fierbându-se până scade la jumătate; se strecoară, se adaugă o cantitate egală de zahăr și se fierbe din nou până scade la jumătate. Se ia câte o linguniță la 2 ore.

Gutuile

Infuzie din o lingură la o cană, câte 2 căni pe zi.

Merele

Sirop din suc de mere și zahăr în părți egale, fiert la foc domol până la consistența siropoasă; se iau câte 2 linguri înainte de masă.

Smochinele

Decoct din 2-3 fructe la o cană, 2 căni pe zi.

Sirop din 500 g la 1 litru la care se adaugă 250 g miere; se ia câte o linguriță de 2-3 ori pe zi.

Murele

prin astringența lor sunt utile în laringite.

Sirop dintr-un litru de suc (obținut din fructe zdrobite și lăsate peste sucul lor 24 de ore), la care se adaugă 900 g zahăr; se fierbe până la consistența siropoasă.

Se utilizează atât în uz intern, cât și în uz extern sub formă de gargarisme.

Ardeii iute

îndeosebi în oboseala corzilor vocale; se citează și utilizarea în angine.

Pentru combaterea oboselii corzilor vocale, gargarisme cu decoct dintr-un ardei iute la 100 ml apă.

Pentru angine, aplicații pe gât cu ardei iute mărunțit și încălzit.

Bamele

Consumate în preparate culinare.

Ceapa

Infuzie din 4—6 cepe la 1 litru apă, îndulcită cu 100 g miere sau zahăr, se strecoară și se beau 2 căni pe zi, din care una dimineața.

Gulia

Consumată ca atare.

Prazul

deosebit de bun emolient, fiind util în toate formele de faringită, laringită, traheită.

Sirop din decoct concentrat (cu 200 g la litru), amestecat cu o cantitate egală de miere; se iau 4—5 linguri pe zi.

Varza

îndeosebi cea roșie, atât în uz intern cât și în uz extern.

Decoct din 60 g la 0,5 litri apă, îndulcit cu 70 g miere; se bea în cursul unei zile.

Gargarisme cu suc și miere (sau gălbenuș de ou bătut cu suc de varză).

BRONȘITELE

Sunt infirmații acute sau cronice ale bronhiilor, care se asociază deseori cu traheitele — inflamații acute sau cronice ale mucoasei care tapetează interiorul traheei.

Semnele clinice sunt: tuse în accese, răgușeală, expectorații, febră.

Farmacia verde recomandă următoarele remedii:

Curmalele

favorizează expectorația. Consumate ca atare. Infuzie din 50 g la 1 litru, 2-3 căni pe zi.

Gutuile

semințele fiind puternic emoliente. Infuzie cu o linguriță de semințe la cană, 2 căni pe zi.

Merele

cu proprietăți pectorale bine cunoscute în medicina populară, favorizând expectorația; se recomandă mai ales la copii.

Sirop din suc de mere și zahăr în părți egale, fiert la foc mic până la consistența siropoasă; se iau câte 2 linguri înainte de fiecare masă.

Smochinele

Decoct din 2-3 fructe la o cană, 2 căni pe zi.

Sirop din 500 g la 1 litru de apă, fierbându-se pe baia de apă până se reduce la jumătate; se strecoară și se adaugă 250 g miere, luându-se câte o linguriță de 2-3 ori pe zi.

Infuzie din frunze, cu 20-30 g la litru, 2-3 căni pe zi.

Socul

Decoct dintr-o linguriță de fructe (proaspete sau uscate) la o cană, 1-2 căni pe zi.

Suc, 50-100 ml pe zi.

Asmățuiul

Consumat ca atare, în aromatizarea unor preparate culinare.

Infuzie din frunze sau semințe, cu o linguriță la o cană, 2 căni pe zi.

Bamele

Consumate în preparate culinare.

Ceapa

Infuzie din 4-6 cepe la 1 litru apă, îndulcită cu 100 g zahăr sau miere; se strecoară și se beau 2 căni pe zi, din care una dimineața.

Dovleacul

Consumat ca atare, în preparate culinare ușoare sau ca suc (100-200 g pe zi).

Gulia

ușor pectorală. Consumată ca atare.

Hreanul

util atât în uz intern, precum și în uz extern, deoarece proprietățile revulsive ale hreanului ras fac ca aplicațiile locale să ducă la o decongestionare a aparatului respirator.

Consumat ca atare în scopuri condimentare.

Infuzie din 15-30 g la 1 litru, care se lasă apoi la macerat 12 ore; se iau 2 căni pe zi, între mese.

Cataplasme cu hrean ras aplicate pe torace.

Leușteanul

Infuzie din frunze cu 2 linguri la o cană; 2 căni pe zi.

Infuzie din semințe cu 1/2 linguriță la o cană, 2 căni pe zi.

Morcovul

Consumat ca atare.

Suc, câte 100 g dimineața devreme.

Napii

sunt mult apreciați în medicina populară pentru proprietățile pectorale.

Decoct din 100 g napi tăiați în felii la 1 litru apă sau lapte.

Năsturelul

recoltat numai de pe locuri curate, unde nu pășunează vitele.

Consumat sub formă de salată.

Suc proaspăt (60-150 ml pe zi), diluat cu apă rece în cantitate egală.

Ridichile

Sirop din ridichi tăiate felii peste care se presară zahăr, iar după 24 de ore se strânge siropul care s-a lăsat, administrându-se 3-4 lingurițe pe zi.

La o ridiche scobită se umple scobitura cu zahăr (sau miere) și hrean; se coace, apoi se strânge sucul care se lasă, bându-se 3-4 lingurițe pe zi.

Sparanghelul

cu acțiune expectorantă. Consumat ca atare, în salate și în alte preparate culinare diuretice.

Tarhonul

fluidifică secrețiile bronșice. Consumat ca atare, în salate sau alte preparate culinare.

Infuzie, din o linguriță la o cană; 2 căni pe zi, ca expectorantă și calmantă a tusei.

Consumat ca atare în preparate culinare.

Suc, câte 100 ml dimineața înainte de mâncare.

Decoct din cca 30 g la 1 litru; se beau 2-3 căni pe zi.

Usturoiul

prin acțiune dezinfectantă, combinată cu cea expectorantă și de calmare a spasmelor musculare netede. Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili pe zi.

Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți, fierți 15-20 minute în 200 g apă sau lapte, cantitatea rezultată bându-se în cursul unei zile.

Varza

îndeosebi cea roșie, asociindu-se și în tratamentul de uz extern.

Decoct cu 60 g la 0,5 litri apă, adăugându-se 70 g miere; se bea în cursul unei zile.

Aplicații de frunze de varză strivite (cu un făcăleț sau cu o sticlă de 1 litru) și curățate de nervura principală.

PNEUMONIILE

Sunt infecții ale plămânului, provocate de o bacterie sau de un virus.

Simptomele, cu apariție bruscă, asociază o febră ridicată (39-40°C), frisoane intense și adesea o durere toracică ce se amplifică la inspirație.

Tratamentul de elecție în aceste afecțiuni este cel antiinfecțios și se bazează pe antibiotice și chimioterapie, produsele vegetale având de cele mai multe ori doar un rol adjuvant:

Smochinele

Decoct din 2-3 fructe proaspete la o cană cu apă; 2 căni pe zi.

Hreanul

Pentru proprietățile sale revulsive, provocând la locul de aplicare o congestionare și, prin compensare, o decongestionare la nivelul organelor interne, se poate folosi și în uz extern.

Cataplasme cu hrean ras aplicate pe torace.

Ridichile negre

Aplicații locale pe torace cu ridichi rase.

ASTMUL BHONȘIC

Este afecțiunea caracterizată prin crize de dispnee (jenă respiratorie) paroxistică siflantă (șuierătoare), care atestă o contracție brutală a mușchilor care comandă închiderea și deschiderea bronhiilor.

În tratamentul bolii astmatice, între crize, se recomandă un regim igienic-dietetic prin care se evită factorii alergici (posibili declanșatori ai crizelor de astm bronșic, care vor trebui identificați în prealabil prin numeroase teste alergologice).

Hreanul

Infuzie din 15-30 g la 1 litru, care se lasă apoi la macerat 12 ore; se iau 2 căni pe zi, între mese.

Morcovul

Suc, câte 100-200 ml luat dimineața.

Ridichea

Sirop din felii de ridichi peste care se presară zahăr; după 24 de ore se strecoară siropul strâns, administrându-se 3-4 lingurițe pe zi.

Ridiche scobită, care se umple cu zahăr (sau miere) și hrean; se coace, apoi se strânge sucul care se lasă, bându-se 3—4 lingurițe pe zi.

Salata verde

semințele fiind calmante ale tusei astmatice.

Usturoiul

util în astm, inclusiv în crize.

Suc, câteva picături pe pușin zahăr, luat în momentul crizei.

Varza

îndeosebi cea roșie. Decoct pectoral cu 60 g la 0,5 l apă, adăugându-se 70 g miere (sau zahăr).

BOLILE ALE APARATULUI URINAR

LITIAZA ȘI COLICA RENALĂ

Litiază renală este o afecțiune ce se caracterizează prin prezența calculilor care se formează în rinichi și care pot migra în uretere și în vezica urinară.

Atunci când unul din acești calculi migrează prin caile urinare, apare colica renală care constă în repetarea de episoade dureroase foarte violente, întretăiate de perioade de acalmie.

Pentru tratamentul colicilor renale se folosesc antispastice obținute din plante, produși de semisinteză sau produși obținuți prin sinteză chimică în industria chimico-farmaceutică.

Din rândul componentelor vegetale, recomandăm:

Părul

frunzele reunind proprietăți diuretice certe cu proprietăți ușor sedative și dezinfectante renale.

Infuzie din 100 g frunze proaspete sau 25 g frunze uscate la 1 litru apă, bându-se în cursul crizei de colici renale.

Năutul

Decoct din 100 g la 1 litru, bându-se în cursul crizei de colică renală.

Pătrunjelul

Infuzie din o linguriță de frunze la o cană, 2-3 căni pe zi.

Varza

în colici putându-se asocia tratamentul intern cu cel extern.

Suc de varză proaspătă, 100-200 g, în mai multe reprize.

Aplicații direct pe piele în dreptul rinichilor cu frunze strivite (cu o sticlă de 1 litru) și curățate de nervura principală, ușor încălzite.

Pentru a combate aceste redutabile colici, este necesar să prevenim cauza lor, adică litiază renală. Iată principalele „alimente verzi” care au proprietăți antilitiazice:

Agrişele

prin eliminarea de urați și acid uric, în litiaza urică.

Consumate ca atare, în compot, supe.

Suc, 100-300 ml pe zi, în 3-4 reprize.

Alunele

considerate de unii autori antilitiazice (fără a se baza pe experimentări științifice).

Consumate ca atare sau măcinate în amestec cu miere (50-100 g pe zi).

Cireșele

Consumate ca atare, în cure pe tot sezonul acestor fructe.

Infuzie din 1 lingură de cireșe uscate la o cană sau compot.

Coacăzele negre, coacăzele roșii

diureza fiind însoțită și de o eliminare masivă de acid uric, sunt foarte active în litiaza urică (în cazul Coacăzului negru sunt extrem de utile în același scop și frunzele).

Consumate ca fructe proaspete sau ca suc.

Infuzie din 1-2 lingurițe de fructe uscate la o cană, 2-3 căni pe zi. Infuzie din 2 lingurițe de frunze la o cană, 3 căni pe zi, între mese.

Fragii, căpșunile

producând diureză însoțită de eliminarea de acid uric.

Consumate ca atare în tot cursul sezonului, 300-500 g (chiar până la 1,5 kg) pe zi.

Lămâile, portocalele

Suc, până la 200 g pe zi.

Măceșele

fiind utile în acest scop achenele (popular „semințe”).

Decoct din 1-2 lingurițe achene la o cană, 3-4 căni pe zi.

Merele, perele

cu acțiune puternic urolitică, împiedicând depunerea uraților.

Consumate ca atare (cel puțin 0,5 kg pe zi).

Suc, 2-3 pahare pe zi, înainte de mese.

Decoct din 40-50 g fructe uscate („poame”) la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Migdalul

Sirop din 500 g sâmburi dulci, 150 g sâmburi amari, 125 ml apă și 750 g zahăr, ocomponentele frecându-se până se obține o pastă care se fierbe la baia de apă cu 1,5 l apă rece și 0,5 kg zahăr.

Se beau 2-3 căni pe zi, diluat cu apă în proporție de 1/10.

Moșmoanele

prin eliminarea de urați, utile în litiaze urice (contraindicate pentru cei cu tendință la constipație).

Consumate ca atare sau în compot.

Pepenele verde

atât pulpa, dar în special semințele, în ele fiind depistate enzime cu acțiune litotritică.

Cure de pepeni (1-2 kg pe zi, în tot cursul sezonului).

Decoct din 1 lingură de semințe zdrobite la o cană, 2-3 căni pe zi.

Asmățuiul

Infuzie dintr-o linguriță de frunze sau semințe la o cană, 2 căni pe zi.

Suc, până la 100 g pe zi.

Cartofii

adjuvant prețios, prin conținutul ridicat în potasiu.

Consumați ca atare, în preparate culinare ușoare.

Suc proaspăt (100-200 g pe zi), de preferință în amestec cu suc de morcovi.

Castravetele

diureza provocată este însoțită de dizolvarea acidului uric și uraților.

Consumat ca atare.

Suc ca atare, dar mai ales în combinație cu cel de morcovi sau sfeclă (sau ridichi), considerat printre cele mai eficiente litotritice, câte 200-300 g pe zi.

Ceapa

diureza este însoțită de eliminare de acid uric și urați.

Consumată ca atare, minimum 1-2 cepe mari pe zi.

Tinctură dintr-o ceapă zdrobită, macerată 10 zile într-o cantitate egală de alcool; se filtrează și se iau câte 2 lingurițe pe zi, înainte de masa de prânz și înainte de culcare.

Fasolea verde

cu eliminare de urați.

Suc, 100-200 ml pe zi.

Hreanul

contraindicat însă în afecțiuni renale acute.

Infuzie din 15-30 g la 1 litru, lăsat la macerat 12 ore; se iau 2 căni pe zi între mese.

Morcovii

ajută la eliminarea masivă de acid uric. Consumați ca atare.

Suc, 100-200 g pe zi, ca atare sau în amestec cu suc de castraveți și sfeclă roșie (sau ridichi), considerat un litotritic foarte eficient.

Napii

Consumați ca atare, în preparatele culinare ușoare.

Infuzie din o lingură de pulbere de napi uscați la 0.5 litri apă, cantitate care se consumă într-o zi.

Năsturelul

recoltat numai din locuri curate, unde nu se pășunează.

Consumat sub formă de salată.

Suc, 60-150 ml pe zi, îndoit cu apă rece.

Prazul

diuretic activ, cu eliminare de acid uric și urați.

Consumat ca atare.

Decoct foarte concentrat din 200 g la litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Ridichile negre

alături de frunzele de Mesteacăn și rădăcinile de Roibă, formează „triada de aur” a fitoterapiei litotritice.

Suc, de preferință în amestec cu suc de morcovi și castraveți, până la 100-200 g pe zi, în trei reprize, cu 15 minute înainte de mese.

Salata verde

cu eliminare masivă de urați.

Consumată ca atare.

Decoct din 60-80 g la litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Sfecla roșie

Suc, simplu sau în amestec cu suc de morcovi și castraveți, câte 100-150 g; băut dimineața.

Sparanghelul

Consumat ca atare, în salate și preparate culinare dietetice.

Decoct din 20 g la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Tomatele

utile în litiaze urice, dar contraindicate în litiaza oxalică.

Consumate ca atare sau sub formă de suc.

Usturoiul

produce o diureză sporită cu eliminare accentuată de acid uric și urați.

Consumat ca atare, zilnic minimum 2-3 bulbili zdrobiți.

Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți la 200 ml apă sau lapte, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Varza

Cură de suc, un pahar pe zi, între mese.

AFECȚIUNI INFLAMATORII ALE RINICHILOR ȘI CĂILOR URINARE

Vegetalele care se recomandă în inflamațiile țesutului renal (nefrite), ale bazinețului (pielite), ale uretrei (uretrite) sunt în special cele cu proprietăți antiinflamatorii și emoliente:

Agrisele

Consumate ca atare, sub formă de compot sau de supă.

Suc, 100-300 ml pe zi, în 3-4 reprize.

Părul

proprietățile antiinflamatoare le au în special frunzele.

Infuzie din 100 g frunze proaspete sau 25 g frunze uscate la 1 litru apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Dovleacul

semințele decojite sunt calmante ale catarurilor căilor urinare.
Semințele luate ca atare (1-2 linguri pe zi) sau decoct din o lingură la o cană, 2 căni pe zi.

CISTITELE

Sunt inflamații acute sau cronice ale mucoasei vezico-urinare.
Se manifestă adesea brutal, printr-o durere sîmprăpubiană, dureri la micțiuni (urinat), micțiuni frecvente și prin nevoia imperioasă de a elimina doar câteva picături de urină.

Părul

sunt recomandate frunzele, care au conținut de arbutozid.
Infuzie din 100 g frunze proaspete sau 25 g frunze uscate la 1 litru apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Napii

Consumați ca atare.
Infuzie din o lingură de napi mărunțiți și uscați la 0,5 litri apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Sparanghelul

cu condiția să nu existe leziuni ale căilor urinare, deoarece provoacă hematurie.
Consumat ca atare, în salate și preparate culinare dietetice.
Decoct din 20 g la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Foarte utile în această afecțiune sunt și produsele vegetale cu valoare de dezinfectante urinare:

Afinele

prin conținutul în taninuri, acizi organici și substanțe antibacteriene, sunt dezinfectante și pentru aparatul urinar.
Decoct dintr-o linguriță de afine uscate la o cană sau macerat la rece timp de 8 ore din aceeași cantitate; se beau 2 căni pe zi.

Părul

datorită taninurilor, dar în special arbutozidului, frunzele sunt dezinfectante.
Infuzie din 100 g frunze proaspete sau 25 g frunze uscate la 1 litru apă, cantitate ce se bea în cursul unei zile.

ENUREZISUL

înseamnă emisia involuntară și inconștientă a urinei în pat sau în lenjeria de corp, atât ziua, cât mai ales în cursul nopții, la copiii trecuți de vârsta de 3 ani (vârsta la care trebuie să se instituie controlul nervos al funcției sfincterului vezical).

Ca remediu vegetal, este recomandat:

Nucul

fiind citate în acest sens frunzele. Infuzie din 1 lingură frunze la o cană; 2 căni pe zi.

SINDROMUL DE RETENȚIE AZOTATĂ (AZOTEMIE, UREMIE)

Prin termenul de retenție azotată cu uremie se înțelege creșterea, atât în sânge cât și în urină, a ureei sangvine și a diferitelor substanțe azotate (neproteice).

Anglo-saxonii dozează chiar în locul ureei azotul total neproteic format în proporții egale din uree și azot rezidual.

Cauza principală a retenției azotate este incapacitatea rinichilor de a elimina compușii toxici rezultați din metabolismul celular.

De altfel, sinonimul pentru sindromul de retenție azotată este insuficiența renală, care se poate instala fie brusc — caz în care este vorba de insuficiența renală acută (șocuri traumatice sau arsuri întinse), fie lent — insuficiența renală cronică, în special în cazurile de hipertrofie a prostatei, a tuberculozei renale și a altor boli grave ale aparatului urinar.

Din punct de vedere clinic, sindromul de retenție azotată se manifestă de regulă cu stare de excitație nervoasă, sughiț repetat, contracții musculare, dispnee cu respirație profundă, senzație de amețeli, de vomă, stare de astenie (slăbiciune).

Uremia este o afecțiune extem de gravă; de aceea, trebuie evitate toate improvizațiile terapeutice. În cele mai multe cazuri, e nevoie de o spitalizare îndelungată.

Regimul vegetarian fără proteine este cel mai indicat.

Trebuie reținut însă că fitoterapia devine adjuvantă, mai ales în formele cronice de boală.

Vom cita astfel câteva din aceste vegetale ajutătoare:

Bobul

Decoct din 100 g la 1 litru apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Ceapa

Consumată ca atare, minimum 1-2 cepe pe zi.

Decoct din 3 cepe mari la 1 litru de apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Tinctură dintr-o ceapă zdrobită, macerată 10 zile într-o cantitate egală de alcool; se filtrează și se iau 2 lingurițe pe zi, înainte de masa de prânz și înainte de culcare.

Tomatele

Consumate ca atare sau sub formă de suc.

DIURETICELE

În general, se poate considera că diureticele, având la bază substanțele active din plante, nu se adresează unei anumite afecțiuni; majoritatea diureticelor utilizate în fitoterapie sunt utile în toate afecțiunile aparatului urinar și, în special, în cele cronice.

Recomandăm o serie de diuretice, care vor mări volumul de urină excretat, îndepărtând astfel excesul de lichide din organism:

Afinele

Decoct dintr-o linguriță de afine uscate la o cană sau macerat la rece, timp de 8 ore din aceeași cantitate; se beau 2 căni pe zi.

Agrişele

Consumate ca atare sau în compot și supe.

Suc, 100-300 ml pe zi, în 3-4 reprize.

Coacăzele negre

Consumate ca atare.

Infuzie din 1-2 lingurițe fructe uscate la o cană, 2-3 căni pe zi.

Fragile, căpșunile

Consumate ca atare, 300-500 g (chiar până la 1,5 kg pe zi) sau sub formă de sirop.

Măceșele

fiind active în acest sens achenele (popular „semințele”).

Decoct din 1-2 lingurițe de achene („semințe”) la o cană, 3-4 căni pe zi. Se filtrează prin tifon dublu.

Merele

Consumate ca atare, până la 1 kg pe zi sau sub formă de compot.

Decoct din mere uscate („poame”) și bine mărunțite, o lingură la o cană, 3—4 căni pe zi, îndulcite.

Moșmoanele

cu contraindicații însă pentru cei cu tendință la constipație.

Consumate ca atare sau sub formă de compot.

Perele

Consumate ca atare.

Decoct din 40-50 g pere uscate („poame”) la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Cidru din pere (nu se va lua de către copii).

Pepenele verde, Pepenele galben

Se consumă ca atare; cure pe tot sezonul, cu 1-2 kg pe zi.

Pepenele galben până la 1/2 kg pe zi.

Piersicile

Consumate ca atare.

Prunele

Decoct din 40-50 g prune uscate la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Smochinele

Decoct din 2-3 fructe la o cană, 2-3 căni pe zi.

Decoct din 2 linguri de rămurile tinere, tăiate mărunț, la o cană, 2—3 căni pe zi.

Strugurii

Consumați ca atare, 0.5-1 kg pe zi în tot cursul sezonului.

Cură de must cu minimum 0.5 litri pe zi, în trei reprize, cu o oră înainte de mese, ajungându-se apoi la cantitatea inițială, care se administrează progresiv în 2 săptămâni până la 2 litri pe zi, revenindu-se în continuare, în tot sezonul strugurilor, la 0.5 litri pe zi.

Sucul de aguridă are proprietăți diuretice deosebite. Se consumă 300-500 ml pe zi.

Zmeura

Consumată ca atare.

Asmățuiul

Consumat ca atare, în aromatizarea unor preparate.

Infuzie din 1 linguriță de frunze sau semințe la o cană, 2 căni pe zi.

Bobul

având și proprietăți sedative în dureri urinare.

Decoct din 100 g la 1 litru apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Macerat la rece dintr-o linguriță de pudră la o cană, lăsată peste noapte, pentru a se bea dimineața.

Cartoful

Consumat în preparate culinare ușoare.

Suc proaspăt, 100-200 ml pe zi, consumat dimineața.

Castravetele

Consumat ca atare.

Suc, fie simplu, fie în combinație cu cel de Morcov, Sfeclă (sau Ridichi).

Ceapa

Tinctură dintr-o ceapă zdrobită macerată 10 zile în aceeași cantitate de alcool; se filtrează și se iau 2 lingurițe pe zi, înainte de masa de prânz și înainte de culcare.

Dovleacul

Consumat ca atare, în preparate culinare ușoare.

Fasolea verde

Consumată în preparate culinare ușoare.

Suc de păstăi verzi (cca 100 ml/zi).

Guliile

Consumate ca atare, precum și în preparate culinare ușoare.

Hreanul

datorită excitației manifestate și asupra parenchimului renal; contraindicat însă în afecțiuni renale acute.

Infuzie din 15-30 g la 1 litru, lăsată apoi la macerat 12 ore; se iau 2 căni pe zi între mese.

Leușteanul

toate părțile plantei, dar în special rădăcinile, sunt puternic diuretice.

Infuzie din 2 lingurițe de frunze la o cană, 2 căni pe zi.

Infuzie din 1/2 linguriță de semințe la o cană, 2 căni pe zi.

Decoct dintr-o linguriță de rădăcină la o cană, 2-3 căni pe zi.

Din rădăcini se prepară un decoct folosind 100 g plantă la 1 litru apă; se beau 2-3 căni pe zi.

Măcrișul, Ștevia

cu contraindicații pentru suferinzi de litiază oxalică.

Consumate sub formă de salată sau preparate culinare ușoare.

Infuzie din 20-30 g frunze la 1 litru, cantitate care se consumă în cursul zilei.

Morcovul

duce până la dublarea volumului de urină.

Consumat ca atare.

Suc, câte 100-200 g dimineâța devreme.

Năutul

Decoct din 100 g la litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Pătlăgelele vinete

ușor diuretice în oligurie (diminuare a secreției urinare).

Consumate sub formă de preparate culinare.

Păstărnacul

Consumat în preparate culinare.

Pătrunjelul

proprietăți majore au rădăcinile; în măsură mai mică, sunt diuretice și frunzele.

Decoct din 50 g rădăcini la 1 litru de apă; se beau 2-3 căni pe zi.

Infuzie dintr-o linguriță de frunze la o cană, 2-3 căni pe zi.

Prazul

cu efect declorurant deosebit și o acțiune aparte și în uz extern, pentru stimularea diurezei.

Decoct din 200 g la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile; se fac cure de cel puțin 20-30 zile.

Aplicațiile calde pe abdomen favorizează emisia urinei în cazurile de retenție.

Sfecla roșie

Suc de sfeclă roșie, simplu sau în combinație cu cel de morcovi și castraveți, câte 100-150 g dimineța.

Sparanghelul

cu condiția ca acela care îl consumă să nu aibă leziuni ale căilor urinare.

Decoct din 20 g la 1 litru, cantitate care se bea în cursul zilei.

Tarhonul

cu avantajul de a fi complet neiritant.

Infuzie dintr-o linguriță la o cană, 2 căni pe zi.

Tomatele

ușor diuretice, cu eliminare de urați, însă contraindicate în litiaze oxalice.

Consumate ca atare sau sub formă de suc (250 ml pe zi).

Țelina

rădăcinile sunt foarte active, fiind totodată și declorurante.

Suc, câte 100 g înainte de masa de dimineată.

Decoct din 30 g la 1 litru de apă; se beau 2-3 cani pe zi.

Urzicile

cu eliminare de compuși urici și a clorurilor.

Salate de primăvară sau alte preparate culinare ușoare.

Infuzie sau decoct scurt (5 minute) din 1-2 linguri la o cană, câte 3 căni pe zi.

Usturoiul

sporește diureza, cu eliminare masivă de acid uric și urați.

Consumat ca atare, minimum 2-3 bulbili pe zi.

Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți la 200 ml apă sau lapte, cantitate care se consumă în cursul unei zile.

Varza

Consumată ca atare, în salate de crudități sau preparate culinare ușoare (300-400 g pe zi).

Suc, câte un pahar pe zi între mese, în cure de lungă durată.

AFECȚIUNI DERMATOLOGICE

ACNEEA

Este o afecțiune foarte răspândită în rândul adolescenților, care se caracterizează printr-un flux sebaceu exagerat, apărând cu predilecție în anumite arii bogate în glande sebacee, unde provoacă apariția unor leziuni cutanate denumite comedoane, sub formă de noduli cenușii sau roșietici, cu sau fără mici colecții purulente în vârful leziunilor.

Deoarece acestea sunt supuse suprainfecțiilor cu diverși microbi, pot fi și sub formă de pustule gălbui care, dacă nu sunt tratate la timp și corect, pot lăsa cicatrice pe față.

Există foarte multe remedii vegetale, în special legume, pentru această afecțiune; unele dintre acestea sunt utilizate intern, prin efectele lor depurative, altele sunt de uz extern — ca emoliente și decongestive.

Fasolea verde

în uz intern, prin efectele sale depurative.

Consumată ca atare în preparate culinare ușoare, dar mai ales ca suc (100-200 g pe zi).

Napii

datorită proprietăților diuretice.

Consumați ca atare, sub formă de salată.

Infuzie din o lingură de napi uscați și bine mărunțiți la 0.5 litri apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Prazul

în uz extern, datorită proprietăților emoliente și decongestive.

Cataplasme cu frunze fierte, aplicate călduțe pe locul dureros.

Tomatele

în uz extern. Tamponarea obrazului cu felii de tomate, de mai multe ori pe zi, în cure de 2-3 săptămâni.

Varza

de asemenea în uz extern. Loșionări repetate cu suc proaspăt, pe parcursul mai multor zile.

CONTUZIILE

Prin noțiunea de „contuzie” înțelegem orice lovitură însoțită de vânătăie, fără ruperea pielii și fără fracturarea oaselor.

O contuzie poate fi de o gravitate variabilă și poate fi însoțită de hematom (colecție de sânge într-un organ sau țesut) și de leziuni interne.

Sunt recomandate următoarele remedii vegetale:

Cartofii

Cataplasme cu cartofi fierți, bine pasați.

Pătrunjelul

datorită efectului antiinflamator al frunzelor.

Cataplasme cu frunze de Pătrunjel bine mărunțite.

Varza

frunzele fiind decongestive, cicatrizante și antiseptice.

Aplicații direct pe piele cu frunze strivite (cu o sticlă de 1 litru) pe o masă și curățate de nervura principală, fixate cu un pansament; se schimbă de 2 ori pe zi.

Inul

Sub formă de făină proaspăt rășnită din care se prepară un terci cu puțină apă caldută, care se pune între tifoane și se aplică pe locurile infiamate.

Pentru a împiedica iritarea pielii, se recomandă un amestec de două părți făină de Muștar și o parte făină de In.

ARSURILE

Sunt leziuni ale pielii sau ale mucoaselor, provocate de expunerea la o căldură intensă sau prin contact cu un agent fizic sau chimic.

Arsurile pot fi cauzate de către lichide în fierbere, de către solide calde sau în combustie, de către agenții chimici (acizi, baze, fosfor), de către electricitate sau de către agenții radioactivi (radiații X).

În cazul arsurilor locale mai ușoare, tratamentul fitoterapeutic este exclusiv extern, bazat pe produse vegetale care conțin substanțe active antiseptice, capabile să grăbească cicatrizarea țesutului lezat.

În continuarea tratamentului extern se apelează la unguente și uleiuri preparate pe bază de plante:

Măslinile

sub formă de ulei.

Aplicații cu ulei de măslină în amestec cu albuș de ou.

Migdalele dulci

prin acțiunea lor emolientă și trofică.

Migdalele mărunțite și făcute pastă cu puțin lapte sau smântână.

Pepenele galben

Aplicații locale cu pulpă zdrobită în arsuri ușoare.

Socul

Cataplasme cu decoct concentrat, din 30-50 g fructe la 1 litru de apă.

Cartofii

unul din cele mai la îndemână remedii în acest caz.

Dovlecelul

Cataplasme cu pulpă crudă, zdrobită.

Pătlăgelele vinete

Cataplasme cu frunze zdrobite.

Varza

datorită favorizării cicatrizării, produce o intensificare a circulației în zona interesată.

Frunzele sub formă de comprese.

Aplicații direct pe piele cu frunze strivite (cu o sticlă de 1 litru) pe o masă și curățate de nervura principală, fixate cu un pansament; se schimbă de 2 ori pe zi.

În cazul arsurilor grave, primul ajutor acordat accidentatului constă în administrarea unui calmant (durerile sunt atroce în asemenea accidente) și în transportarea lui la o unitate sanitară de profil chirurgical.

Dacă bolnavul este în stare de șoc, se va apela la un serviciu de terapie intensivă, tratamentul fiind în exclusivitate alopatic.

DEGERĂTURILE

Sunt leziuni grave ale țesuturilor, cauzate de frig. Se produc în unele circumstanțe favorizante: imobilitate prelungită, îmbrăcăminte prea jilavă, vânt.

Toate regiunile corpului pot fi afectate, dar degerătura gravă afectează mai ales extremitățile (degetele de la mâini și picioare, nasul, urechile).

Din punct de vedere clinic, se manifestă printr-o senzație de pișcătură, apoi printr-o amorțire treptată — un important semn de alarmă, deoarece victima nu mai simte în continuare nimic.

Pielea este albă și rece, apoi devine violacee și umflată.

În formele cele mai grave și netratate apar flictene (bășici conținând puroi), apoi gangrena.

Prima intervenție constă în luarea bolnavului din frig, desfacerea hainelor (fără însă a i le scoate) și înfașurarea lui într-o pătură.

Pentru degerături mai severe se recomandă încălzirea părților degerate cu apă caldă, dar apa mai caldă de 40-42°C este contraindicată.

Fitoterapia recomandă plante care stimulează circulația sângelui la nivelul țesuturilor:

Castanele comestibile

Băi locale sau cataplasme cu decoct scurt (2-3 minute) din 15-20 g la 1 litru, după care se lasă la infuzat încă 15 minute

Lămâile

Fricționări ușoare cu suc ale porțiunilor afectate.

Ceapa

Cataplasme cu ceapă fiartă pe zona afectată.

Hreanul

Aplicații cu 2 linguri de hrean ras, macerat o oră în 0.5 litri lapte fierbinte.

Morcovii

Cataplasme cu morcovi rași.

Napii

Aplicații cu napi fierți, apoi masare ușoară, pentru a-și lăsa sucul.

Salata verde

Cataplasme calde cu frunze fierte.

Țelina

reprezintă unul din principalele remedii.

Băi locale cu decoct prelungit (45 minute) dintr-o țelină cu tot cu frunze, tăiată mărunt, la 2 litri apă.

Se țin părțile degerate în decoctul cât se poate de cald, reîncălzindu-se, pentru a se folosi de 3 ori pe zi.

Tratamentul durează 3-5 zile.

Varza

Aplicații direct pe piele cu frunze strivite (cu o sticlă de 1 litru) pe o masă și curățate de nervura principală, fixate cu un pansament; se schimbă de 2 ori pe zi.

PANARIȚIUL

Este o infecție acută a unui deget de la mână sau, mai rar, de la picior.

Este o afecțiune frecventă, ce decurge din inocularea într-un deget a unui germene, de cele mai multe ori un stafilococ, de către o așchie, o înțepătură sau printr-o plagă.

Farmacia verde are soluții optime în cazul panarițiului:

Cartofii

Cataplasme maturative cu cartofi fierți, bine zdrobiți.

Fasolea

fâina de fasole este și ea utilă ca maturativă.

Cataplasme din făină de fasole preparată cu apă caldă.

Lintea

Cataplasme cu linte fiartă și zdrobită.

Salata verde

Cataplasme calde cu frunze fierte.

Varza

Aplicații pe zona interesată a unor frunze strivite (cu o sticlă de 1 litru) pe o masă și curățate de nervura principală, fixate cu un pansament; se schimbă de 2 ori pe zi.

RĂNILE (PLĂGILE)

Sunt rupturi ale țesuturilor provocate de un accident sau de o intervenție chirurgicală.

Plăgile accidentale trebuie să fie examinate cu atenție, deoarece ele pot fi pline de corpi străini (pământ, fragmente de sticlă) și, în acest caz, pot fi contaminate cu agenți infecțioși (există chiar riscul de tetanos).

Pentru dezinfectarea plăgilor, există următoarele antiseptice naturale:

Lămăile

Tamponări locale repetate cu suc.

Usturoiul

Tamponarea repetată cu o soluție apoasă cu 10% suc, 1-2% alcool.

Natura oferă și numeroase cicatrizante pentru răni:

Lămâile

Tamponări locale repetate cu suc.

Măslinile

uleiul calmează durerile și ajută la o cicatrizare rapidă.

Aplicații locale cu ulei.

Asmățuiul

Cataplasme cu planta proaspătă, zdrobită.

Morcovii

Cataplasme cu morcovi rași.

Năsturelul

Comprese cu frunze proaspete, zdrobite.

Urzica

cu acțiune favorabilă de epitelizare a tegumentelor, în principal datorită clorofilei.

Aplicații cu decoct scurt (5 minute) din 2 linguri la o cană de apă.

Varza

Aplicații pe plagă cu frunze strivite și curățate de nervura principală, fixate cu un pansament, schimbându-se de 2 ori pe zi.

În natură există, de asemenea, rețete simple și eficiente pentru rănilor purulente și ulceratii:

Ceapa

Aplicații locale cu suc. Cataplasme cu o ceapă fiartă.

Leușteanul

se utilizează frunzele, fiind bogate în ulei volatil cu proprietăți antiseptice. Aplicații locale cu frunze zdrobite.

Morcovul

Cataplasme cu morcovi rași.

Prazul

Cataplasme cu frunze fierte, aplicate calde.

Spanacul

Cataplasme cu frunze fierte în ulei.

Usturoiul

Aplicații locale cu o soluție apoasă cu 10% suc și 1-2% alcool.

BOLI DE NUTRIȚIE ȘI METABOLISM

Este un fapt binecunoscut astăzi că bolile de nutriție sunt consecința unei alimentații dezechilibrate în principii nutritive (proteine, glucide, lipide), în celuloză, vitamine, enzime, săruri minerale și oligoelemente (existente cu preponderență în legume și fructe).

În general, legumele și fructele sunt sărace în proteine, iar multe dintre ele și în lipide.

Excepție fac semințele, care aduc organismului o serie de lipide sau/și proteine.

Foarte puțini știu, de exemplu, că Soia și Lintea au un conținut mult mai ridicat în proteine decât carnea, iar unele semințe (arahidele, Floarea-soarelui, Inul, Rapița) constituie principala sursă de lipide existente în regnul vegetal.

În ceea ce privește aportul de glucide, multe fructe au un conținut ridicat dintr-un anumit glucid (fructoza), mult mai ușor asimilabil decât zaharoza, glucidul care este esența zahărului rafinat.

O sursă importantă de glucide o reprezintă și cerealele, care constituie baza alimentației umane.

DIABETUL ZAHARAT

Este cea mai frecventă suferință pancreatică, fiind definit ca o tulburare cronică a metabolismului de reglare glicoreglator, determinată de insuficiența sau lipsa secretorie a celulelor B din insulele pancreatice care trebuie să controleze metabolismul glucozei.

Din punct de vedere clinic, este caracterizat printr-o triadă de simptome constant întâlnite: polifagie (bolnavul mănâncă foarte mult), polidipsie (bea multă apă) și poliurie (urinează abundent).

Există două mari forme clinice de diabet:

- diabet zaharat tip I (insulino-dependent). Este forma specifică în general la copii;
- diabet zaharat tip II (insulino-independent).

În cazul primei forme de diabet, tratamentul este substitutiv (cu insulină sau cu sulfamide anti-diabetice) pentru toată viața bolnavului.

Totodată, bolnavului i se instituie un regim de viață și mai ales o dietă severă, de respectarea căreia poate depinde evoluția stării lui de sănătate.

Cea de-a doua formă clinică de diabet este cel dobândit și denumit de tip II (insulino-sensibil); apare în general după vârsta de 50-55 ani, afectează ambele sexe și se datorează epuizării funcției insulino-secretoare a pancreasului endocrin.

De cele mai multe ori, se tratează numai printr-un regim alimentar bine controlat; rareori se poate ajunge și la necesitatea administrării de insulină injectabilă.

Natura îi poate ajuta pe suferinzii de diabet zaharat să-și completeze tratamentul cu o serie de produse naturale:

Afinul

efecte hipoglicemizante au și fructele, dar în special frunzele, care sunt considerate, datorită conținutului în mirtilină, cel mai important produs al Farmaciei Naturii, ca adjuvant în cazuri de glicemie ușor crescută care nu au devenit insulino-dependente.

Infuzie din 2 lingurițe frunze la o cană de apă, 2 căni pe zi în cure de întreținere.

Cură de afine (300-500 g zilnic), pe toată perioada sezonului.

Decoct sau macerat la rece timp de 8 ore din o linguriță de afine uscate la o cană, 2 căni pe zi.

Alunele

energizante pentru diabetici.

Consumate ca atare.

Fragile, căpșunile

deoarece zahărul conținut este levuloza, fără a fi un remediu, pot fi consumate în dieta diabeticilor.

Consumate ca atare, fără a depăși 300 g pe zi.

Lămăile

ducând la scăderea glicemiei, pot intra prioritar în regimul diabeticilor.

Consumate ca atare, în limonade, cu zaharină, în salate, în ciorbe.

Merele

citate de autori elvețieni ca fiind utile în regimul diabetului infantil, împreună cu tomatele.

Cură de mere, asociată cu cură de tomate, separat.

Perele

datorită conținutului ridicat în levuloză, fără a constitui un remediu, sunt printre fructele ce pot fi consumate de către diabetici.

Consumate ca atare.

Cartofii

înlocuind pâinea în regimul diabeticilor, duc la eliminarea unor simptome specifice (glicozurie, poliurie).

Consumați ca atare, în preparate culinare ușoare (cca 1-1.5 kg pe zi), copti sau fierți în coajă.

Ceapa

Consumată ca atare, minimum 1-2 cepe pe zi.

Fasolea

sunt utile tecile.

Infuzie din 2 linguri de teci la o cană, lăsându-se la macerat de seara până dimineața, câte 2 căni pe zi în cure de lungă durată.

Morcovii

Consumați ca atare.

Suc, câte 100-200 ml consumat dimineața devreme.

Năsturelul

Consumat în salate. Suc proaspăt (60-150 ml pe zi), îndoit cu apă rece.

Soia

Făina de soia este alimentul ideal pentru diabetici.

Țelina

Consumată ca atare, în preparate culinare. Suc câte 100 ml dimineața înainte de masă.

Urzicile

Infuzie sau decoct scurt (5 minute) din 1-2 linguri la o cană, 2-3 căni pe zi.

Varza

cu o substanță hipoglicemiantă activă dar instabilă; acțiunea este și mai puternică pentru Varza de Bruxelles. Consumată ca atare, în salate de crudități sau preparate culinare ușoare. Cure de suc, un pahar pe zi, între mese.

GUTA

Este o boală metabolică ce rezultă dintr-un exces de acid uric în sânge.

Afectează de cele mai multe ori bărbatul de vârstă matură.

În general, există o predispoziție genetică pentru „fabricarea” unui exces de acid uric.

Prezent în exces în organism, acidul uric precipită și cristalizează în articulații (cel mai des la baza degetului mare de la picior, dar și la glezne, genunchi, uneori la încheietura și degetele mâinii).

Acesta provoacă crize acute de dureri vii (crize de gută), care pot împiedica pacientul să pună piciorul pe pământ.

În absența tratamentului de fond, articulațiile se deformează, apoi se distrug după câțiva ani de evoluție, iar acumulările de acid uric de sub piele fac să apară tumefacția (tofii gutoși) pe ureche, tendoane, țesuturi moi.

În general, fructele, legumele și semințele sunt recomandate în uz intern, acționând prin eliminarea masivă de acid uric și urați; câteva din ele sunt utile și în uz extern, prin aplicații locale cu efect antiinflamator.

Agrisele

Consumate ca atare, în compoturi, supe. Suc, 100-300 ml pe zi, în 3-4 reprize.

Cireșele, vișinele

Consumate ca atare.

Coacăzele negre, coacăzelele roșii

În cazul Coacăzului negru sunt foarte active și frunzele.

Consum de fructe ca atare.

Suc, 100-300 ml pe zi, în 3-4 reprize.
Infuzie din fructe uscate, 1-2 lingurițe la o cană, 2-3 căni pe zi.
Infuzie din 2 lingurițe de frunze la o cană, 3 căni pe zi, între mese.

Fragile, căpșunile

Consumate ca atare, în cure de 1-1.5 kg pe zi, timp de 7-14 zile.

Lămâile, portocalele

Consumate ca atare sau sub formă de suc.

Merele, perele

Consumate ca atare, în cure de lungă durată, până la 1 kg pe zi.

Moșmoanele

cu contraindicații pentru cei cu tendință de constipație. Consumate ca atare sau în compot.

Pepenele verde

Consumat ca atare, în cure de 1-2 kg pe zi, pe toată durata sezonului.

Porumbele

Decoct din o lingură la o cană, 2 căni pe zi.

Strugurii

în special cei care provin de pe soluri calcaroase. Consumați ca atare sau sub formă de must.
în uz extern, cataplasme cu turte rămase de la pasarea strugurilor; sunt antiinflamatoare în umflături gutoase.

Zmeura

Consumată ca atare.

Ceapa

Consumată ca atare, minimum 1-2 cepe pe zi.
Decoct din 3 cepe mari la 1 litru apă; se beau 2 căni pe zi, dimineața și seara.

Dovlecelul

Consumat ca atare, în preparate culinare obișnuite sau dietetice.

Fasolea verde

Consumată în preparate culinare ușoare. Suc, 100-200 ml pe zi.

Hreanul

Macerat timp de o oră din 2 linguri hrean ras la 0.5 litri lapte fierbinte, băndu-se în cursul dimineții.

Napii

Consumați ca atare. Infuzie din o lingură de napi uscați și mărunțiți la 0.5 litri apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Pătrunjelul

proprietăți deosebite având rădăcinile, fiind însă utile și frunzele.

Țelina

Decoct consumat în preparate culinare. Decoct din 50 g rădăcini la 1 litru de apă, 2 căni pe zi.

Suc de rădăcini, 50-100 g pe zi.

Infuzie din 1 linguriță de frunze la o cană, 2-3 căni pe zi.

Prazul

atât în uz intern, cât și extern.

Decoct foarte concentrat din 200 g la 1 litru de apă, consumat în cursul unei zile.

Salata verde

Consumată ca atare. Decoct din 60-80 g la 1 litru de apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Soia

Făina de Soia este indicată ca aliment de bază în gută.

Decoct din 30 g la litru de apă, 2-3 căni pe zi.

Urzica

Infuzie sau decoct scurt (5 minute) din 1-2 linguri la o cană pe zi.

Usturoiul

Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți, la 200 ml apă sau lapte, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Varza

în uz extern calmează durerile gutoase.

Aplicații în zona interesată cu frunze strivite și curățate de nervura principală, fixate cu un pansament; se schimbă de 2 ori pe zi.

OBEZITATEA

În ultimii ani, obezitatea a devenit pentru societatea modernă o problemă majoră de sănătate.

Statisticile estimează că o cincime din populația de sex masculin, respectiv o treime din femeile planetei suferă de obezitate.

Obezitatea se caracterizează prin crearea unui surplus ponderal de peste 20% față de valorile normale ale mediei indivizilor de același sex și aceeași vârstă, cu implicații asupra condiției estetice, psiho-sociale și biologice a bolnavului.

Doi sunt factorii principali care favorizează obezitatea: primul este cel exogen (abuzul alimentar, lăcomia), iar cel de-al doilea este de origine endogenă și se datorează unor predispoziții genetice sau unor dereglări endocrine (glandulare), la care se adaugă sedentarismul.

Întâlnită în toate zonele geografice ale lumii și la toate vârstele, obezitatea afectează o treime din adulții americani și 21% din persoanele având vârsta între 12-19 ani.

În ciuda unei industrii dietetice de 40-50 milioane \$ pe an, obezitatea a câștigat proporții epidemice, ca rezultat al reducerii activității fizice, al

timpului tot mai mare petrecut în fața televizorului și al cantităților crescute de alimente consumate.

În medicina clasică, tratamentul constă în scăderea aportului caloric (alimentație hipocalorică) și în mărirea consumului caloric (prin exerciții fizice) cu sau fără administrare concomitentă de extracte tiroidiene sau de hormoni sexuali, în funcție de caz.

În privința îndepărtării factorilor etiologici, se pune accentul pe corectarea hipofuncției cortico-suprarenale, a insuficienței tiroidiene, ovariene etc.

Un rol important îl ocupă și reechilibrarea nervoasă, în special prin înlăturarea condițiilor psiho-fizice care influențează negativ starea de sănătate.

Alimentele vegetale fac parte din dietoterapia obezității.

Deși utile, produsele „verzi” nu pot avea efecte miraculoase; de aceea, se recomandă asocierea remediilor medicinei clasice cu exercițiile fizice, cu dieto și fitoterapia.

Iată ce ne propune natura pentru lupta cu obezitatea:

Cireșele, vișinele

prin aportul lor caloric redus și efectul ușor laxativ.

Consumate ca atare, făcându-se cure pe toată perioada sezonului, chiar rezervându-li-se în exclusivitate o zi pe săptămână.

Merele

Cure de mere, cu „zile de mere” în care să se consume câte 1 kg pe zi, fără alte alimente.

Socul

prin cumularea acțiunilor diuretică, ușor laxativă și sudorifică; sunt utile în acest scop florile, dar și fructele.

Decoct din o linguriță de fructe proaspete la o cană; după ce dă în clocot, se storc boabele; se beau 1-2 căni pe zi.

Fructele de soc trebuie să fie bine coapte, altfel sunt toxice.

Decoct din fructe uscate, cu o linguriță la o cană, 2-3 căni pe zi.

Infuzie cu 1-1/2 linguriță de flori la o cană, 2-3 căni pe zi.

Strugurii

acțiunea lor se explică prin efectul favorabil asupra metabolismului.

Consumați ca atare, 2 zile pe săptămână doar 1-2 kg struguri zilnic, fără alte alimente.

Cartofii

Consumați ca atare în preparate culinare ușoare.

Tomatele

au valoare nutritivă redusă. Consumate ca atare.

Țelina

Consumată ca atare în preparate culinare.

AFECȚIUNILE REUMATISMALE

Prin reumatism înțelegem orice afecțiune dureroasă, acută sau (de cele mai multe ori) cronică, ce stânjenește buna funcționare a aparatului locomotor. În exprimarea curentă, dar și în limbajul medical, acest termen acoperă boli foarte diverse.

Reumatismele pot fi: infecțioase (artrite, cauzate de prezența unui agent infecțios în articulație), inflamatorii (observate în cazul bolilor de sistem), microcristaline (cauzate de prezența microcristalelor în articulație — guta, de exemplu), degenerative (artroze, provocate de degenerescența și uzura unei articulații).

Fructele și legumele recomandate se utilizează atât în uz intern (adjuvante ca depurative, cu eliminare de acid uric și urați), precum și în uz extern, ca decongestive și pentru calmarea durerilor.

Agrisele

Consumate ca atare. Suc, 100-300 ml pe zi, în 3-4 reprize.

Cătina

Infuzie din 1-2 lingurițe la o cană, 2-3 căni pe zi.

Cireșele, vișinele

Consumate ca atare, putându-se face adevărate cure în artratism (chiar cu rezervarea unei zile pe săptămână).

Coacăzul negru

fiind utile atât fructele, cât și frunzele.

Fructele proaspete se consumă ca atare sau sub formă de suc.

Infuzie din fructe uscate, 1-2 lingurițe la o cană, 2-3 căni pe zi.

Infuzie din 2 lingurițe de frunze la o cană, 3 căni pe zi, între mese.

Lămâile

Consumate ca atare, în limonade, salate, ciorbe.

Merele, perele

Consumate ca atare, până la 1 kg pe zi.

Decoct dintr-o lingură de fructe uscate („poame”) și mărunțite la o cană, 3-4 căni pe zi, îndulcite după gust.

Strugurii

atât în uz intern, cât și în uz extern.

Consumați ca atare sau sub formă de must, în cure pe durata întregului sezon.

Cataplasme, în zonele dureroase, cu turte rămase de la pasarea strugurilor.

Ardeiul iute

prin proprietățile sale revulsive este recomandat în lumbago, dureri reumatice, în fricțiuni.

Comprese locale cu tinctură din 20 g ardei iute macerat 8 zile în 100 ml alcool de 70°.

Ceapa

Decoct din 3 cepe mari la 1 litru apă, 2 căni pe zi, dimineața și seara la culcare.

Dovleceii

Consumați ca atare, în preparate culinare dietetice.

Fasolea verde

Consumată ca atare, opărită, sub formă de salată sau alte preparate culinare dietetice.

Suc, cca 100 ml pe zi.

Hreanul

util și în tratamentul intern, completat cu cel extern, având proprietăți revulsive.

Macerat timp de o oră cu 2 linguri hrean ras la 0,5 litri lapte fierbinte, cantitate care se bea dimineața, după micul dejun.

Băi locale sau generale, asemănătoare celor cu Muștar; se toarnă apă caldă de 35-45° peste un săculeț de tifon cu făină de Hrean, socotindu-se cca o lingură cu vârf la 1 litru apă. Săculețul se agită în apa de baie, baia durând 20-30 minute.

Fricțiuni ale zonei inflamate cu tinctură din 20 g hrean ras macerat 2 săptămâni în 100 ml alcool.

Năsturelul

recoltat numai din locuri curate, unde nu pășunează vitele.

Consumat sub formă de salată. Suc proaspăt, 60-150 ml pe zi, îndoit cu apă.

Păstărnacul

Consumat în preparate culinare.

Pătrunjelul

sunt utile atât rădăcinile, cât și frunzele.

Decoct din 50 g rădăcini la 1 litru de apă, 2-3 căni pe zi.

Salata verde

Decoct din 60-80 g la 1 litru, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Soia

Făina de Soia reprezintă un aliment de bază pentru dieta reumaticilor.

Tarhonul

Infuzie dintr-o lingură la o cană; 2 căni pe zi.

Țelina

Suc, câte 100 g dimineața înainte de masă. Decoct din 30 g la 1 litru de apă, 2-3 căni pe zi.

Urzicile

folosirea în uz intern este completată cu practici populare de folosire în uz extern.

Infuzie sau decoct scurt (5 minute) din 1-2 linguri de frunze la o cană, 2-3 căni pe zi.

„Biciuirea” cu un mănunchi de urzici proaspete, cu efect revulsiv în alergii reumatice, lumbago și sciatică.

Usturoiul

atât în uz intern, cât și în uz extern.

Decoct din 2-3 bulbili zdrobiți, în 200 ml apă sau lapte, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Aplicații locale pe zona interesată cu bulbili fierți, puși cât se pot suporta de calzi.

Varza

în artrite, tratamentul intern completându-se cu cel extern.

Cure de suc, un pahar pe zi, între mese, 2-3 săptămâni.

Aplicații în zona interesată cu frunze strivite și curățate de nervura principală, fixate cu un pansament; se schimbă de 2 ori pe zi.

RESTABILIREA UNOR FUNCȚII GLANDULARE

STIMULAREA SECREȚIEI GLANDULARE MAMARE (EFECT GALACTOGOG)

Alăptarea maternă (alăptarea la sân) este alimentarea de elecție pentru nou-născut, întrucât laptele de mamă este cel mai bine echilibrat pentru sugar (conținutul în grăsimi, elemente minerale, oligoelemente și vitamine).

Laptele îi aduce sugarului anticorpi indispensabili pentru a lupta împotriva infecțiilor.

Pentru stimularea secreției lactate, farmacia naturii propune următoarele soluții:

Socul

Decoct dintr-o linguriță de fructe bine coapte, proaspete sau uscate la o cană; după ce dă în clocot, se storc boabele și se adaugă zahăr. Se beau 1-2 căni pe zi.

Suc, 50-100 g pe zi sau compot.

Asmățuiul

Infuzie dintr-o linguriță de semințe la o cană, 2 căni pe zi.

Lintea

Consumată în preparatele culinare.

Morcovul

proprietăți în acest sens au atât rădăcinile, cât și fructele.

Consum de morcovi ca atare sau sub formă de suc, câte 100-200 g dimineața devreme.

Infuzie dintr-o linguriță de fructe la o cană, 2 căni pe zi.

Anasonul

Infuzie dintr-o linguriță la o cană cu lapte; se bea treptat în cursul zilei.

STIMULAREA FUNCȚIEI GLANDELOR SUPRARENALE

Glandele suprarenale, glande endocrine (cu secreție internă), situate la polul superior al fiecăruia dintre cei doi rinichi, sunt formate fiecare din două părți: corticosuprarenală și medulosuprarenală.

În cazul în care echipamentul enzimatic al corticosuprarenalei este incomplet, acest lucru se manifestă la femeie prin sterilitate și hirsutism (pilozitate exagerată).

Insuficiența suprarenaliană cronică (boala lui Addison) e de origine autoimună sau consecutivă unei tuberculoze.

Se manifestă prin oboseală fizică și psihică, resimțite mai ales seara, pigmentarea maronie a pielii, hipotensiune arterială, anorexie, tendință la hipoglicemie.

Deși tratamentul este predominant alopatic, produsele vegetale sunt binevenite ca adjuvante:

Telina

Consumată ca atare, în preparate culinare (mai ales în salate de crudități).

Suc, câte 100 ml dimineața, înainte de masă.

Deoarece carența în vitamina C contribuie la insuficiența cortico-renalei, toate fructele și legumele cu conținut ridicat în această vitamină (în principal Cățina, măceșele, lămâile, portocalele, coacăzele negre etc.) vor avea efect favorabil asupra acesteia, măbind implicit capacitatea de apărare a organismului în boli infecțioase.

AFEȚIUNILE SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC ȘI CENTRAL

Bolile sistemului nervos periferic. Zona Zoster

Este o boală infecțioasă, provocată de reactivarea virusului varicelei.

Boala debutează printr-o febră moderată, urmând ca după câteva zile să apară o erupție de mici pete roșii, pe teritoriul unui nerv senzitiv; de cele mai multe ori, zona atinsă este un nerv intercostal, simptomele declanșându-se în acest caz.

Această erupție este însoțită de o exacerbare a durerii, care devine adesea greu suportabilă.

Se poate întâmpla ca durerile să persiste timp de ani de zile, fiind adesea greu de eliminat. Farmacia verde propune Varza în uz extern, drept calmantă a acestor dureri.

Se pot face aplicații direct pe piele în zona interesată, cu frunze strivite și curățate de nervura principală, fixate cu un pansament.

Frunzele se vor schimba de 2 ori pe zi.

Bolile sistemului nervos central O dată cu dezvoltarea civilizației, cu apariția ritmurilor de viață trepidante, cu alterarea relațiilor interumane, cu apariția stării de stres, bolile sistemului nervos central au devenit tot mai frecvente.

Pe de altă parte, stările nervoase și stresul pot declanșa unele afecțiuni (așa-numitele boli psihosomatice), cum ar fi ulcerul, colita, unele boli cardiovasculare, renale, metabolice (diabetul zaharat) etc.

Tot în acest capitol se integrează și delicatele probleme ale vieții sexuale (impotența sexuală și frigiditatea), precum și bolile neuropsihice cu substrat anatomic-lezional.

Deși în multe dereglări ale funcțiilor nervoase superioare — și în special în cele asociate cu alterarea psihicului — este suficientă scoaterea bolnavului din mediul care i-a favorizat îmbolnăvirea (stres, conflicte la locul de muncă sau în familie, suprasolicitare psihică), consultarea medicului este absolut necesară, după care și intervenția unui psihoterapeut i-ar fi benefică bolnavului.

Susținem, de aceea, ca tratamentul psihoterapeutic, alături de consultul psihologic, să-și ocupe locul meritat și în sistemul sanitar din țara noastră.

Fitoterapia oferă în bolile sistemului nervos numeroase remedii, dintre care unele de bază, iar altele doar adjuvante.

Pentru a putea fi recomandate, este necesar ca toate aceste remedii naturale să fie studiate în detaliu; iată de ce ne propunem să le prezentăm clasificate în funcție de acțiunea lor.

NEUROTROFICE

Arahidele

reconstituante în astenii și surmenaj. Consumate ca atare, după o prăjire ușoară.

Caisele

utile în astenii, stări depresive, nevroze. Consumate ca atare, suc, compot, fructe uscate.

Coacăzele negre

prețios remediu adjuvant în surmenajul intelectual.

Consumate ca fructe proaspete, suc.

Infuzie din 1-2 lingurițe de fructe uscate la o cană, 2-3 căni pe zi.

Migdalele

prin compoziția lor complexă, sunt reconstituante ale sistemului nervos.

Sâmburii zdrobiți, câte 30-35 g de 2 ori pe zi.

Prunele

Consumate ca atare. Decoct de prune uscate.

Pătrunjelul

sunt utile atât rădăcinile, cât și frunzele.

Suc din rădăcini, 50-100 g pe zi.

Decoct din 50 g la 1 litru de apă, 2-3 căni pe zi.

Infuzie din o linguriță de frunze la o cană, 2-3 căni pe zi.

Soia

reconstituantă în astenii nervoase, surmenaj intelectual.

Folosirea în alimentație a uleiului de Soia și făinii de Soia.

Grâul

Ca atare, fie amestecat în salate, fie trecut prin mașina de tocat și amestecat cu miere.

Sub formă de boabe încolțite, cariopsele de Grâu germinând la temperatura camerei în 24-36 ore.

SEDATIVE NERVOASE GENERALE

Cireșele

Consumate ca atare, în întreg sezonul.

Infuzie din o lingură de cireșe uscate la o cană.

Mandarinele

efectul se explică prin conținutul ridicat în brom. Consumate ca atare.

Merele

Consumate ca atare, mai ales seara înainte de culcare.

Piersicul

se folosesc florile, foarte utile și în același timp foarte plăcute pentru copiii cu nervozitate crescută.

Infuzie din o lingură la o cană, 2-3 căni pe zi.

Sirop dintr-o infuzie concentrată (100 g flori la 1 litru) cu o greutate egală de zahăr sau miere, fierbându-se până la consistența siropoasă. Se iau 20-30 g pe zi.

Porumbarul

sunt recomandate florile, în special pentru copiii cu iritabilitate crescută dublată de constipație. Infuzie din 1—1/2 linguriță la o cană, 2-3 căni pe zi.

Prunele

pentru copiii ușor irascibili.

Infuzie dintr-o prună și o smochină la 100 ml apă, cantitate care se administrează zilnic copiilor irascibili.

Mărarul

semințele sunt sedative nervoase generale precum și antispastice, ceea ce explică și efectele în combaterea sughitului rebel, îndeosebi la copii.

Decoct din o linguriță de semințe fierte într-o cană de lapte, care se bea în cursul unei zile.

Pătlăgelele vinete

Consumate în preparate culinare.

Salata verde

Consumată ca atare, folosită abundant mai ales la masa de seară.

Decoct din 60-80 g la 1 litru de apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Varza

Cure de suc, un pahar pe zi între mese.

AFRODIZIACE

Usturoiul

Are, pe lângă multiplele sale proprietăți curative, și efect afrodisiac.

Pentru acest ultim efect, se folosește sub formă de mujdei pe friptură sau pește, „stropite” cu 250 ml vin negru sau cidru de coacăze, consumate de fiecare dintre cei doi parteneri de cuplu.

Țelina Este celebră ca afrodisiac, în special în țările europene.

Fără a demitiza importanța pe care europenii o acordă acestei plante, de fapt rădăcinii ei, dorim să subliniem că, în Orientul îndepărtat, nu rădăcina de Țelină este utilizată în scop afrodisiac, ci semințele plantei, fie masticate ca atare, fie preparate sub formă de decoct.

După indicațiile medicinei tradiționale extrem-orientale, se prepară un decoct din 20 g semințe de Țelină și 10 g Piper negru la 250 ml apă.

Se fierbe timp de 15 minute, se lasă 10 minute în repaus, apoi se filtrează, se beau 2—3 linguri înaintea actului sexual.

Sparanghelul

Observații recente arată că, pentru obținerea efectelor afrodisiace, se recomandă consumarea, sub formă de salată crudă, cu puțin ulei de floarea-soarelui, cu suc de lămâie sau cu oțet, cu puțină sare și piper pisat.

Salata va constitui o garnitură la un grătar din carne de vacă (preparată în sânge) sau de porc, după care se bea un pahar de vin negru.

Avocado și Bananele

Fructul de Avocado, prin conținutul mare de bromcriptină și bananele, prin excesul de potasiu, par să aibă efecte afrodisiace.

Porumbul

O constatare recentă, în urma unor experiențe pe animale, vine să susțină o ipoteză cel puțin curioasă, și anume că mămliga din Porumb are un ușor efect afrodisiac, atât la animalul de experiență, cât și la om.

ANAFRODIZIACE (CALMANTE ALE HIPEREXCITAȚIEI SEXUALE)

Salata verde

Este recomandabil a se consuma ca atare, fiind folosită abundant mai ales la masa de seară.

Se mai poate prepara și un decoct din 60-80 g la 1 litru de apă, cantitate care se bea în cursul unei zile.

Cu acțiune ușor anafrodiziacă sunt creditate și pătlăgelele roșii (tomatele) și cartofii.

Se pare că și citricele, prin conținutul lor bogat în vitamina C, ar avea asemenea efecte.

HIPNOTICE

Dintre produsele verzi care favorizează instalarea somnului (efect hipnotic), amintim:

Caisele

Consumate prioritar în insomnii (ca atare, suc, compot, fructe uscate).

Merele

Consumate seara înainte de culcare (1-2 mere).

Ceapa

Consumată ca atare, 1-2 cepe pe zi (mai ales la masa de seară).

Mărarul

sunt utile semințele. Decoct din o linguriță de semințe fierte într-o cana cu lapte; se bea seara, înainte de culcare.

Salata verde

Consumată ca atare, folosită abundant mai ales la masa de seară.

Decoct din 60-80 g la 1 litru de apă, cantitate care se bea în cursul unei zile (dar obligatoriu o cană seara înainte de culcare).

BOALA CANCEROASĂ

Conform dicționarului Larousse de medicină (ediția 1997), definiția generică a maladiei canceroase ar fi următoarea: „boală care are ca mecanism o proliferare celulară anarhică, necontrolată și neîntreruptă”.

Se pare că această activitate anarhică celulară se produce prin activarea unor seturi de gene existente în toate celulele nonnale, numite protooncogene.

Atunci când aceste protooncogene sunt activate de agenții cancerigeni, ele devin oncogene, transformând celula normală într-o celulă canceroasă. Agenții cancerigeni pot fi grupați, în funcție de natura lor, în:

- * agenți fizici (radiațiile X și gamma, ultravioletele, traumatismele repetate)
- * agenți chimici (fumul, tabagismul — cea mai redutabilă cauză de malignizare chimică), alcaloizii pirazolidinici, derivații benzenului de orice natură, solvenții chimici, coloranții și aromele artificiale, uneori compuși chimici utilizați ca îngrășăminte pentru cereale, legume sau fructe, ierbicidele, pesticidele, azbestul, aflatoxina
- * agenții chimio-terapici, utilizați de multe ori chiar în tratamentul bolii canceroase)
- * agenți biologici (virusul hepatitei B crește riscul de cancer hepatic, iar virusul Epstein-Barr este asociat cu apariția limfomului Burkitt).

Tabel adaptat după Dr. Kedar N. Prasad — „Vitaminele în prevenirea și tratamentul cancerului”

Agenți cauzali (alimentație și mod de viață)	Tipuri de cancer (organe afectate)
Exces de lipide (grăsimi)	prostată, sân, stomac, colon, rect, pancreas, ovare
Exces de proteine	sân, endometru, prostată, colon, rect, pancreas, rinichi
Exces de calorii	majoritatea tipurilor de cancer
Exces de alcool	esofag, cavitate bucală, creier, gât, sto-mac, ficat, colon, rect
Tabagism	plămâni, laringe, gură, esofag
Exces de alcool și tabagism	cavitate bucală, laringe, esofag, plămâni
Exces de alcool, tabagism și exces de cafea	pancreas, plămâni, ficat, cavitate bucală, laringe, esofag
Exces de zaharină (înlocuitor al zahărului)	vezică urinară
Exces de cafea și ceai	vezică urinară, pancreas, stomac
Exces de carne afumată, pește afumat, carne prăjită pe cărbuni, produse în saramură	stomac
Alimentație deficitară în fier	stomac și esofag
Alimentație deficitară în iod	tiroidă
(Tabel adaptat după Dr. Kedar N. Prasad — „Vitaminele în prevenirea și tratamentul	

Nu mai puțin importantă este evitarea stresului (produs fie de suprasolicitarea fizică, fie de cea psihică), a traumatismelor psihice ca rezultat al relațiilor inter-umane tensionate, inclusiv cele sociale și familiale.

Gândurile negative, pesimismul au un rol notabil în inițierea proliferărilor celulare maligne.

În ultimul timp, din ce în ce mai mulți autori consideră însă că bolile canceroase sunt, în primul rând, o problemă a igienei alimentare.

Într-o recentă lucrare, profesorul Grigore Maltezeanu, reputat oncolog și autor a numeroase studii de specialitate, afirma: „Este timpul să adâncim cercetarea și în această direcție (a alimentației, n.n.) care, astăzi, este, uneori, numai predictivă și insuficient exploatată, cea a unor produși nutritivi, dar și nenuitritivi, mai ales din domeniul plaritelor medicinale, acest domeniu ce dă o speranță de stabilitate și perenitate în anumite momente ale sănătății ființei umane”.

În legătură cu acest subiect, autorul american dr. Kedar N. Prasad (1994) stabilește corelații interesante între alimentație, modul de viață și tipul de cancer incriminat.

Pe lângă elementele prezentate mai sus, se mai poate aminti și sodiul, care, dacă e consumat în exces (prin sarea de bucătărie), poate declanșa cancerul de stomac (gastric). O dovadă în acest sens o reprezintă prezența crescută a cancerului gastric în țările unde se consumă multe alimente sărate.

Totodată deficitul în alimentație al ionului de magneziu poate crește riscul în unele cancere. Interesant este însă faptul că și anumiți produși bioactivi endogeni (interni) sunt suspectați că ar contribui, prin metabolizii lor, la creșterea riscului apariției sau declanșării cancerului. Un exemplu l-ar constitui acizii biliari (acidul cholic, deoxicholic, chenadeoxicholic, lithocholic), a căror sinteză de către celula hepatică este realizată prin utilizarea moleculei de colesterol.

Deoarece acizii biliari sunt implicați în procesul de digestie a lipidelor, rezultă că o creștere a consumului de lipide în alimentație face să crească frecvența cancerului (în special al celui cu realizare în colon, deoarece acizii biliari produc o proliferare de suprafață a criptelor intestinale).

Dacă există componente alimentare implicate în carcinogeneză, fără îndoială că există și foarte multe elemente anticancerigene ce sunt fie parte constitutivă a nutriției umane, fie complementară acestora. Mai mult decât atât, acești compuși pot avea rol nu numai în prevenție, ci și în terapia adjuvantă a bolii canceroase.

În acest sens, s-au făcut numeroase tentative de „constituire a strategiilor împotriva cancerului” (Gr. Maltezeanu, 2002), în care alimentația să aibă o funcție esențială.

În primul rând, este necesar ca pentru hrana noastră să alegem glucidele complexe (amidonul, făinoasele, leguminoasele, legumele, rădăcinoasele) și nu pe cele care se resorb rapid și ridică brutal nivelul glucozei în sânge (favorizând astfel proliferarea malignă): zahărul, mierea sau dulciurile.

În privința proteinelor (deci a aminoacizilor necesari tuturor proceselor celulare), este recomandabil să se consume cu preponderență produse cu o concentrație mai slabă de proteine (cum sunt proteinele vegetale) și mai rar cele de origine animală (cu un conținut bogat în proteine raportat la volum).

Pe lângă grupele mari de constituenți naturali, există (după cum menționam la începutul acestei cărți) și alte substanțe active terapeutice, cum sunt vitaminele, sărurile minerale, oligoelementele sau fibrele alimentare.

Referitor la consumul de grăsimi, trebuie excluse lipidele animale sau sintetice și înlocuite cu uleiuri vegetale.

Se evidențiază astfel importanța alimentației fără grăsimi animale, care trebuie înlocuite cu grăsimi vegetale bogate în acizi grași nesaturați.

După cercetări recente, trebuie acordată o mare importanță unuia dintre acizii grași esențiali.

Este vorba de acidul gama-linolenic (A.G.L.), care a fost obținut din semințele de Luminiță (*Oenothera biennis* L), din semințele unor Boraginacee și Scrofulariacee și în special din semințele de Coacăz negru (*Ribes nigrum* L) și care, probabil, există și în semințele de struguri.

Din ce în ce mai multe studii atestă importanța — până acum presupusă — a vitaminelor în prevenirea și tratamentul cancerului.

Mecanismele prin care acestea reduc proliferarea celulelor canceroase nu sunt încă suficient cunoscute, dar se pare că acestea acționează la nivelul membranelor celulare, care devin mult mai permeabile în cazul celulelor maligne, favorizând astfel asimilarea unor cantități mai mari decât dozele absorbite în mod normal.

Dar, atenție! Nu putem consuma vitamine după bunul plac, oricând și oricât!

O serie de vitamine și provitamine (vitamina A, beta-carotenul — unul din precursorii vitaminei A, vitamina E și C), cunoscute pentru efectele lor antioxidante, sunt considerate protectori de prim rang (privind riscul în cancer), având rol de contracarare a radicalilor liberi organici sau anorganici.

Ce sunt acești radicali liberi?

Sunt „produși intermediari secundari ai unor reacții metabolice celulare sau împotriva altor produși ai oxigenului, ai dezactivării formelor sale moleculare active ce produc alterări celulare funcționale și structurale” (Maltezeanu).

Totodată, se pare că și vitamina D 3 (calciferol) are un efect antiproliferativ, de inhibiție a celulelor maligne, în schimb, efectul anticanceros al vitaminelor din grupul B este destul de slab, iar unele din ele ar putea avea chiar un efect de promotor (vitaminele B2, B6, B12).

În esență, se poate susține cu date concrete, bazate pe numeroase studii efectuate pe grupe de indivizi, că vitaminele și provitaminele (dintre care carotenoizii, retinoizii, vitaminele C, E și D), precum și corespondentul lor natural din legume și fructe au efect preventiv pentru anumite localizări ale bolii canceroase (intestin gros, glandă mamară, plămân, vezică urinară, prostată, stomac, ficat, pancreas). (După Gr. Maltezeanu, op. cit.)

În continuare, vom prezenta principalele surse alimentare bogate în vitaminele importante în terapia anticanceroasă (Prasad):

Beta-carotenul

Legume — sfeclă, broccoli (conopidă italiană), morcovi, dovlecei, Spanac, cartofi dulci (batate), Varză, lăptuci, cereale, fructe — cantalup, caise, mango.

Vitamina A

Ficatul, ouăle și laptele constituie surse excelente pentru această vitamină.

Menționăm că, în fructe și legume, vitamina A se află sub formă de beta-caroten pe care organismul îl transformă în vitamina A.

Vitamina C

Vegetale: Varză de Bruxelles, Conopidă, Mazăre, Varză, ardei iuți și verzi.

Fructe: portocale, lămâi, ananas, zmeură, căpșuni, grape-fruit și, în special, pseudofructele de Măceș.

Vitamina E

Cele mai bogate surse în această vitamină sunt uleiurile vegetale, nucile, cerealele.

Legume: Spanac, Pătrunjel, Muștar, frunze de Nap, Sparanghel, roșii, castraveți.

Fructe: coaja merelor, banane.

Semințe (achene): pseudofructele de Măceș.

Produse animale: carne de pește și de pui.

În privința sărurilor minerale, s-a constatat că ionul pozitiv (cationul) de potasiu are un efect protector în fața bolii canceroase. Or, fructele și legumele, în majoritatea lor, sunt bogate în potasiu.

În legătură cu ionii de calciu și magneziu, este dovedit faptul că diminuează riscul de declanșare a cancerului colo-rectal.

Există oligoelemente care par a diminua riscul de cancer.

Dintre acestea, amintim

* cuprul (element utilizat în tratamentul unor boli infecțioase sau metabolice prin efectul de scădere a colesterolului și de catalizator a numeroase activități enzimatice)

* zincul (cu dovezi certe de prevenție a bolii canceroase, prin implicarea sa în reacții imunologice), seleniul (în doze mari, poate fi cancerigen, însă în doze mici poate fi protector împotriva efectului a numeroși cancerigeni chimici).

În consecință, se poate afirma că, după terminarea definitivă a unui tratament convențional, cu scop curativ sau paleativ, terapia adjuvantă anticanceroasă se bazează, în momentul actual, pe suplimentarea hranei zilnice cu unele vitamine, împreună cu sărurile minerale sau oligomineralele benefice.

Consumul de fibre alimentare (cunoscut încă din Antichitate ca tratament al constipației) poate avea un impact pozitiv de protecție împotriva cancerului de colon și chiar a cancerului de glandă mamară. Oncologul Gr. Maltezeanu citează în acest sens cazul femeilor finlandeze, cu o incidență scăzută a cancerului mamar, în ciuda alimentației bogate în grăsimi, dar cu un consum extrem de mare de legume și fructe, mai ales de fructe de pădure.

De-a lungul timpului, au fost propuse nenumărate diete în cadrul terapiei anticanceroase.

Iată, de exemplu, regimul prescris de doctorița daneză Kristine Nolfi în tratamentul cancerului de sân, cu rezultate remarcabile.

Este un tratament bazat exclusiv pe crudități: dimineața și seara numai fructe, la prânz numai legume.

Niciodată nu se vor consuma legume și fructe în același timp; totodată, se interzice și consumul concomitent de sucuri de fructe, pentru a conserva capacitatea naturală a acestor alimente.

Toate alimentele de origine vegetală trebuie să fie bine spălate și bine mestecate, bineînțeles dacă dentiția o permite.

În cazul în care există deficiențe în acest sens, se recomandă ca fructele sau legumele să nu fie date prin răzătoare, ci să fie tăiate cu un cuțit inoxidabil în bucățele mici.

În orice situație este indicată însă masticarea cât mai îndelungată a acestor alimente.

Același medic propune completarea regimului vegetarian din când în când cu unt, lapte pasteurizat (nu lapte proaspăt, nefiert), precum și cu alte produse lactate.

De asemenea, recomandă germeni de cereale sau grăunțe înmuiate în apă, fructe oleaginoase, în special nuci de Cocos, miere în cantități mici și câteva ouă pe săptămână.

Sunt benefice băile de aer și lumină (nu direct prin expunerile la soare), exercițiile de respirație.

în continuare, vă prezentăm câteva sugestii și recomandări proprii în legătură cu dietoterapia în maladia canceroasă.

Fără a avea pretenția de a vindeca toate formele acestei boli, propunem totuși începerea tratamentului natural de dezintoxicare (inclusiv de medicamente) a organismului, după cum urmează:

1. Sucuri de fructe și legume proaspete, consumate separat și neamestecate.
2. Legume și Salatâ verde, Varză albă sau roșie, Sfeclă roșie, Ridichi negre etc.
3. Fructe și legume coapte în coajă (mere, cartofi, fulgi de Ovăz, Grâu încolțit).
4. Zahărul alb rafinat se va înlocui cu zahăr brun sau, mai bine, cu miere.
5. Pâine de Secară sau de Grâu (integrală) cu cât mai puțină sare (se recomandă puțină sare de mină, grunjoasă, măcinată fin sau sare din apa de mare).
6. Supa lui Hippocrate.

Mod de preparare:

Într-un vas smălțuit, de 2 litri, se pune o țelină de mărime mijlocie sau o gulie, o rădăcină de Pătrunjel, tăiate în felii (nu rase), o jumătate de kilogram de tomate (sau echivalentul în suc sau pastă), jumătate de kilogram de cartofi bine spălați, cu coajă cu tot (ca și celelalte zarzavaturi, necurățate de coajă). Se acoperă cu apă și se pun la fiert la foc domol timp de 2 ore, completând apa care se pierde prin evaporare. Apoi se pasează.

Se poate varia gustul, adăugând 2-3 căței de Usturoi, frunze de la diferite legume sau plante aromate, exceptând condimentele puternic picante.

Această supă se consumă zilnic, în cantitate de 0.250-0.500 litri pentru o persoană.

Se poate prepara pentru 2 zile, menținând-o la frigider proaspătă.

În prima lună, sunt interzise următoarele alimente:

- toate proteinele animale (carnea de orice fel, peștele, laptele, brânza sărată, ouăle);
- sarea fină sau extrafină (se admite doar sarea grunjoasă până la 1 g pe zi); deoarece majoritatea legumelor conțin săruri minerale în cantități suficiente pentru organism, se va evita adaosul de sare; pentru gust se vor adăuga plante aromate uscate (Cimbru, Mărar, Pătrunjel, frunze de Țelină, Mentă etc)
- fructele de tipul bacă (cu boabe) sau drupeolă (cu sămburi): prune, zmeură, mure, afine, caise, cireșe, piersici
- alcoolul și toate neuroexcitantele (tutunul, cacao, cafeaua, condimentele tari sau iuți, sucurile răcoritoare din comerț etc)

Pentru gătitul sau fiertul legumelor în abur sunt indicate vasele de inox, oalele smălțuite sau din lut smălțuit, vasele de sticlă (Jena, Pyrex), în nici un caz de aluminiu, deoarece s-a constatat că aluminiul este unul din factorii care pot declanșa proliferarea celulelor canceroase.

Rămân interzise timp îndelungat:

- toate neuroexcitantele menționate
- sarea, toate condimentele exotice, bicarbonatul de sodiu
- medicamentele de sinteză
- zahărul alb rafinat și toate preparatele de cofetărie sau patiserie care conțin zahăr; zahărul va fi înlocuit cu cel existent în fructe și cu miere
- făina albă și derivatele ei

- grăsimile, în special cele animale, margarina, cremele, smântâna, uleiul de Soia (consumat cu moderație, din cauza concentrației mari de fitohormoni). Este permis consumul de ulei de Floarea-soarelui. Cel mai bun ulei este cel obținut la rece prin presarea sâmburilor de Coacăz negru sau de struguri
- castraveții, dovleceii, ananasul, fructele cărnoase (cum ar fi strugurii sau afinele, exceptând coacăzele)
- toate conservele de orice fel, mezelurile, afumăturile
- ciupercile.

Pentru ilustrare, vom da un exemplu de meniu pentru o zi.

La micul dejun:

- o porție de fulgi de Ovăz (cca 250 g);
- pâine neagră sau intermediară prăjită, cu miere sau dulceață, 2-3 felii
- o farfurie de supă călduță sau un pahar de suc din fructul preferat sau din legume.

La ora 10:

- 2 pahare de suc din fructul preferat, preparat proaspăt.

La prânz:

- o farfurie cu supă de legume
- 1-2 cartofi mari (sau 4 mici) copti sau fierți în coajă, cu puțin unt
- 2 farfurii cu legume de sezon fierte în abur, completate cu brânză dulce, slabă, sana sau iaurt
- crudități și salate.

Meniul se poate completa cu suc de fructe proaspete sau salată de fructe.

Seara:

La fel ca la prânz, cu excepția cartofilor.

În timpul nopții: — suc de fructe sau ceai de plante.

În pledoaria noastră pentru o viață mai lungă bazată pe o alimentație specifică, echilibrată, pentru prevenirea și tratamentul bolilor canceroase care fac în fiecare an milioane de victime, ne permitem să facem câteva remarci:

- în domeniul chimioterapiei bolilor canceroase nu s-au înregistrat, din păcate, progrese remarcabile în sensul vindecării durabile a acestor boli
 - Dacă admitem ipoteza virală a bolii, trebuie să avem în vedere doi factori:
 1. Acțiunea nefastă a virusurilor poate surveni pe un teren deja sensibilizat de agenții fizici, chimici sau genetici, dar nu pe un teren sănătos
 2. Cercetările științifice actuale încearcă să obțină substanțe antivirale, la fel ca și în cazul antibioticelor. Or, această direcție a cercetărilor este bazată pe o concepție insuficient fundamentată filozofic, la fel ca și cea a antibioticelor.
- Orice ființă vie, de la virus, bacterie și până la Homo sapiens, are dreptul la existență. Accentul trebuie pus pe substanțe biotice, care să întărească organismul și capacitatea lui de autoapărare.

FRUCTELE, LEGUMELE ȘI SEMINȚELE UTILIZATE IN COSMETICĂ

Din timpuri străvechi, pe lângă alte produse naturale, în special unele fructe și legume au fost utilizate sub diferite forme pentru întreținerea pielii, îndeosebi a tenului.

O dată cu apariția industriei cosmetice, bazată în special pe chimicale, cosmetica naturală a fost dată uitării.

Abia în ultimele decenii s-a revenit la produsele naturale, dar prelucrate prin diferite procedee care nu protejează întotdeauna structurile chimice cu adevărat naturale.

Din această cauză, am inclus în acest subcapitol al lucrării noastre utilizarea fructelor, legumelor și semințelor ca atare, neprelucrate, cel mult diluate tot cu produse naturale.

Avantajul este că anumite substanțe importante cum sunt vitaminele, enzimele, fitohormonii, factorii biotici etc, existente în plante, nu suferă prelucrări care diminuează valoarea lor terapeutică în cazul în care nu se aplică tehnologii adecvate care sunt costisitoare și ridică foarte mult prețul produselor cosmetice comerciale.

Deoarece ne-am referit și la semințe, ele conțin în special acizi grași saturați sau nesaturați, dintre care numeroși acizi grași esențiali. Dintre cele mai utilizate uleiuri de bază nutritive, atât în aromaterapie cât și în cosmetică, sunt: uleiul de măsline cu Jojoba, uleiul de migdale dulci, uleiuri obținute din semințe prin presare la rece, uleiul din alune, avocado și, mai nou, uleiul obținut din semințe de Boraginaceae, de Luminiță, de semințe de Măceș etc.

COSMETICA FEȚEI

În cosmetica feței prin mijloace naturale (nu "naturiste", termen care apare în broșurile de vulgarizare a cosmeticii) se pune accentul pe menținerea tenului normal și pe "corectarea" deficiențelor în cazul tenurilor uscate, grase sau ridate.

Tenul normal este caracterizat printr-o granulație fină, spații intercelulare (numite "pon" în termeni vulgari) abia vizibile chiar la lupă și nu prezintă exfoliere.

La palpate, pielea se simte catifelată și elastică și prezintă un grad redus de iritabilitate, fiind foarte puțin supusă infecțiilor, acneei, cuperozei etc.

În cazul tenurilor normale, pH-ul pielii este ușor acid, normal, dar poate fi schimbat prin folosirea multelor tipuri de săpunuri sau șampoane care conțin detergenți, sodă.

La fel de dăunătoare pentru tenul normal sunt numeroasele machiante și demachiante comerciale. Să nu uităm că tenul normal este în același timp oglinda stării bune de sănătate a organismului.

De mare importanță pentru menținerea unui ten normal este și gradul de hidratare generală, care se asigură printr-un consum zilnic de lichide de 1.5-2 litri de apă de izvor sau apă de bună calitate, fără clor și metale grele, prin sucuri proaspete de fructe și legume, supe de zarzavaturi etc, nici într-un caz prin băuturi comerciale care au căpătat atâta popularitate la noi.

Majoritatea acestor băuturi conțin coloranți, edulcoranți, conservanți și arome artificiale dăunătoare organismului.

Tenul gras este unuros, pielea este de culoare gălbuie și nu este netedă, întinsă, iar la palpate ea prezintă granulații neregulate.

Excumarea pielii nu se observă, datorită sebumului în exces. Sebumul în exces la tenul gras împiedică respirația normală a pielii și favorizează depunerea sărurilor prin transpirație, având ca rezultat formarea comedoanelor (ridicături mici albicioase ale dermului, centrate cu un punct negru), care nu trebuie „stoarse”, deoarece „stoarcerea” poate duce la infecții, la apariția „coșurilor” care, după vindecare, pot lăsa cicatrice.

Tot la cei care au ten gras este frecventă seboreea pielii păroase a capului, ca și formarea mătreții (exfolierea celulelor moarte ale pielii).

Tenul slab și ridat este caracterizat printr-o piele mată, având spațiile intercelulare reduse, cute fine, cu exfoliere superficială.

La palpare, pielea este iritabilă, lipsită de elasticitatea normală.

Cauzele uscării pielii sunt multiple, interne și externe.

În cazul deshidratărilor generale, prin ingerarea insuficientă de lichide, în stări febrile, diaree, tulburări endocrine etc, tenul se ridează, iar pielea devine flască.

În toate cazurile legate de afecțiunile pielii și în special ale tenului, recomandarea noastră este de a apela la un consult dermatologic efectuat de medici specialiști, înainte de a apela la numeroasele „saloane de cosmetică și înfrumusețare” care nu au un medic de specialitate.

Nu uitați să folosiți și tratamentul intern, pe lângă cele câteva recomandări sumare pe care le vom face în cele ce urmează.

TENURILE GRASE

Căpșunile

Mască cosmetică din căpșuni zdrobite cu albuș de ou.

Lămăile

Utile pentru combaterea „porilor” dilatați.

Mască cosmetică din suc, la care se adaugă un albuș bătut.

Prunele

Mască astringentă cu 5-6 prune zdrobite, care se lasă 20 minute pe față.

Caisele

Pulpă zdrobită de la 4-5 caise și o lingură mălai cernut fin se lasă la înmuiat o oră.

Se aplică pe față 30 minute.

Castravetele

Loșionări cu suc și apă caldă în părți egale.

Loșionări cu suc în alcool diluat de 40° în părți egale.

Pătrunjelul

Loșionări cu decoct concentrat din 2 linguri de frunze la cană.

Tomatele

Foarte active în combaterea punctelor negre.

Mască de ten cu fructe zdrobite, ținute 20-25 minute pe față.

TENURILE USCATE

Căpșunile

Mască cosmetică din căpșuni zdrobite amestecate cu smântână.

Gutuile

Inclusiv în curățirea tenurilor pătate.

Loșionări sau comprese cu macerat la rece dintr-o linguriță de sâmburi la cană.

Piersicile, Bananele. Pepenele galben

Mască preparată din 2 piersici sau dintr-o banană sau o felie de pepene galben, 2 linguri de lapte și o lingură țărâțe de grâu.

După înmuiere și amestecare, se aplică pe față 30 minute.

Castraveții

Loșionări cu suc de castraveți în amestec de ulei de migdale.

Salata

Loșionări ale tenului cu decoct îndelungat (2 ore) dintr-o salată la 0,5 litri apă.

TENURILE RIDATE

Căpsunile

Loșionări cu suc de căpșuni cu aceeași cantitate de lapte.

Migdalele

Loșionări cu „lapte” de migdal, preparat din 100 g migdale lăsate în apă câteva ore pentru a li se umfla pielea și pentru a putea fi curățate; se zdrobesc cu puțină apă rece, diluându-se apoi până la 2 litri.

Portocalele

Aplicații pe ten cu felii de portocale, 15-20 minute.

Asmățuiul

Cataplasme cu planta proaspătă, zdrobită.

Castraveții

Aplicații cu felii de castravete.

Loșionări cu lapte în care se macerează felii de castravete.

CUPEROZA

Afecțiune a pielii care se caracterizează printr-o colorație roșie-violacee a pomeților obrazului și a nasului.

Salata

Loșionări ale tenului cu decoct îndelungat (2 ore) dintr-o salată la 0,5 litri apă.

PISTRUII

Castraveții

Aplicații cu felii de castravete, în mod repetat, 1-2 săptămâni.

Ceapa

Aplicații repetate cu suc de 3-4 ori pe zi, timp de 5-6 zile.

Pătrunjelul

Aplicații cu suc proaspăt de frunze, de 2—3 ori pe zi, timp de 15-20 zile.

COSMETICA ȘI IGIENA OCULARĂ

Înainte de-a recurge la orice tratament natural sau de altă natură, prima noastră recomandare este de-a face un consult medical de specialitate, la un serviciu sau secție ORL.

S-au semnalat multe cazuri de suprainfecții oculare prin aplicarea unor remedii empirice.

De asemenea, în cele mai multe cazuri, prin astfel de aplicații nu se respectă condițiile de sterilitate pe care le impun preparatele oftalmice.

Nu uitați că printre cele mai mari daruri cu care ne-a înzestrat Natura este „lumina ochilor”.

Lămăile

În blefarite. Aplicații cu suc diluat cu o proporție egală de apă fiartă și răcită (sau cu infuzie de Sulfină, Mușețel).

Asmățuiui

în inflamații ale pleoapelor, blefarite. Aplicații cu suc de plantă proaspătă.

Cartofii

aplicațiile locale dau rezultate în retragerea edemelor palpebrale (edeme ale pleoapelor).

Cataplasme cu tuberculi cruzi, rași.

Pătrunjelul

în inflamații oculare. Aplicații cu suc proaspăt.

Salata verde

în blefarite, conjunctivite, fiind utile semințele.

Aplicații cu infuzie din o linguriță semințe la cană.

Țelina

Picurarea pe pleoape a câtorva picături de suc sau tamponarea ușoară cu un tampon curat, umețat.

COSMETICA MĂINILOR

Lămâile

Frecarea mâinilor cu felii de lămâie, ceea ce întărește totodată unghiile casante.

Tomatele

catifelează mâinile și, mai ales, atenuează sau îndepărtează iritațiile produse de detergenți.

Lapte nutritiv din 50 ml suc de tomate, o linguriță de glicerină și un vârf de cuțit de sare; se lasă cât mai mult să pătrundă în dermă și se masează ușor pielea.

COSMETICA PĂRULUI ȘI TONICELE CAPILARE

Lămâile

Adăugate în ultima apă de spălat pe păr, dau suplețe și strălucire acestuia.

Strugurii

"camuflează" încărunțirea părului.

Se fierb 4 g sulfat de fier în 250 ml vin roșu; se piaptăna părul cu pieptănul umectat în această soluție timp de 15-20 minute pe zi, 15-20 de zile, apoi se continuă de 2 ori pe săptămână.

Ardeii iute

prin acțiunea puternic revulsivă, circulația sangvină în zonă este stimulată, ducând la o troficitate mai bună la nivelul firului de păr, fiind prin aceasta un bun tonic capilar.

Fricțiuni stimulative energice la rădăcina părului cu tinctură din 20 g macerat 7-8 zile în 100 ml alcool. Trebuie feriți ochii!

Năsturelul

energic tonic capilar. Fricțiuni cu suc proaspăt.

Pătrunjelul

frunzele sunt tonice capilare.

Fricțiuni energice la rădăcina părului cu decoct concentrat din 2 linguri de frunze la cană.

Prazul

dă reflexe frumoase pentru parul brun. Clătirea părului brun cu decoct concentrat din 200 g la litru.

Urzicile

bine cunoscute ca tonic capilar, fie singure, fie în amestec cu frunze de Mesteacăn, rădăcini de Brusture și Iarbă mare.

Spălarea părului, o dată pe săptămână, cu un decoct din 250 g frunze și rădăcini la 1 litru apă, lăsându-l să fiarbă la foc mic, în vas bine închis, timp de 1/2 oră.

Se pot adăuga 1-2 linguri de oțet.

Fricționări energice la rădăcina părului cu un decoct cu frunze de Urzică, frunze de Mesteacăn, rădăcini de Brusture și Iarbă mare în părți egale, 3 linguri la 0,5 litri apă.

NU UITAȚI: ÎNTREBUINȚAȚI CÂT MAI PUȚINE ȘAMPOANE, MAJORITATEA CONȚINÂND DETERGENȚI. ÎNLOCUIȚI-LE CU SĂPUN DE CASĂ SAU, MAI BINE, CU GĂLBENUȘ DE OU.

TONIFIEREA GENERALĂ A ȚESUTURILOR

Merele

Masarea ușoară cu suc a obrazilor, sânilor, abdomenului.

BĂTĂTURILE

Prazul

Aplicații cu macerat timp de o zi din frunze în oțet; se țin 6-8 ore pe zi, repetându-se câteva zile la rând.

Usturoiul

Cataplasme cu Usturoi ras, aplicate seara și păstrate până dimineața, timp de cca 15 zile la rând.

ALGELE,

un produs natural cu rol important în cosmetica modernă, un dar al naturii

Algele cuprind un ansamblu de vegetale foarte variaie, atât prin caracterele lor morfologice și citologice, cât și biochimice și numără astfel aproape 25.000 de specii diferite.

În mod generic, sunt considerate ca primele organisme vii care au apărut pe suprafața globului terestru. Plasticitatea lor ecologică le permite să trăiască în condițiile cele mai variate.

În majoritate acvatice, în ape dulci, salmastre sau marine, algele constituie aproape singura populația vegetală a oceanelor unde ele trăiesc, fie fixate pe fund, fie în suspensie (fitoplanctonul) sau plutind la suprafață (Sargasele din Marea Sargaselor).

În oceane, ele formează primul inel din lanțul alimentară, singurul care realizează sinteza substanțelor organice plecând de la elementele minerale.

Dacă în Occident algele își găsesc o largă aplicare în industria de cosmetice, în Extremul Orient ele sunt consumate din abundență.

În Japonia, anumite alge alimentare fac obiectul unor adevărate culturi, folosite fiind ca medicamente-aliment în minuscule perle homeopatice.

NU EXISTĂ ALGE TOXICE, iar extrem de rarele cazuri semnalate au fost determinate de substanțele toxice deversate în mări sau oceane, cu implicațiile toxice cunoscute.

TERAPIA CU ALGE

Algele au fost folosite de către om din timpuri străvechi și aceasta înainte de a putea explica științific multiplele lor acțiuni benefice.

Corpul omenesc este făcut din miliarde de celule, adevărate unități functionale, care sunt sursa de viață și de reproducere a fiecărei ființe umane; deci fiecare ființă vie funcționează ca o imensă uzină, de o complexitate fără egal, a cărei energie provine din elemente indispensabile, precum materii organice, săruri minerale, oligoelemente etc, a căror rezultată este sănătatea perfectă, atât fizică, cât și psihică; majoritatea acestor elemente ne este dată de alimentație, dar respirația și pielea constituie două căi importante în interacția cu mediul exterior.

Viața actuală este sursa a numeroase dezechilibre și talassoterapia (thalasso = mare, terapie = a vindeca) și algoterapia, în special, pot da rezultate în numeroase afecțiuni.

Terapia cu alge este eficientă prin bogăția în conținut mineral, organic și enzimatic a acestora, dar și prin lipsa totală de toxicitate a algelor folosite.

EXTRACTUL USCAT DE ALGE „ALGAVIT DR. IONESCU CĂLINEȘTI”, PATENT 107194/BL-ROMANIA 1992

Urmărind evoluția ciclică bio și tanatocenoza, prezentă în toate lacurile sărate din Câmpia Română sau litoralul Mării Negre, dr. ȘTEFAN IONESCU CĂLINEȘTI a putut compara și izola (după propria afirmație) „tot ce a dăruit natura teritoriului românesc”.

Extractul uscat de alge poartă denumirea comercială și are marca de fabrică „algaVit cu facsimil de semnătură”.

Produsul conține aminoacizi esențiali, săruri minerale din care foarte important pentru cosmetologie este iodul, în concentrații de peste 15 g%, și oligoelemente, din care cuprul, zincul și molibdenul au valențe deosebite în cosmetologie.

De asemenea, prezența vitaminelor B2 (importantă acțiune celulară esențială în metabolismele de hrănire) și B12 (acțiune asupra sistemului nervos hepatic, asupra dermatozelor, asteniei, anemiei).

În concentrații determinate, algaVit are acțiune antioxidantă, iar prezența AMP-ului ciclic îi conferă titlul de factor R+R (regenerare și revitalizare), dar și important antiinflamator, antialergic.

Iodul și microelementele din Extractul uscat de alge „algaVit” au un efect deosebit asupra catifelării epidermei, a scăderii numărului de celule grase, fiind folosit cu deosebite rezultate în preparate cosmetice destinate slăbirii și modelării corpului și feței (spumași de baie, emulsii sau uleiuri de masaj, paste pentru aplicații ocluzive locale etc).

CAP.7 SAPTE ELEMENTE CARE SCURTEAZA VIATA

1. INVIDIA

Este o adevărată boală a vremurilor noastre, căpătând proporțiile unui fenomen social, mai ales pe meleagurile noastre.

De la omul simplu, neinstruit, needucat și până la intelectualul sau „savantul” membru corespondent, plin sau onorific al Academiei de științe, nici unul nu îngăduie să fie întrecut de colegul, colaboratorul sau compatriotul său.

Un filosof antic spunea: „Invidia roade pe invidios precum rugina roade fierul” — maximă care, credem noi, spune totul despre efectul nociv al acestui sentiment, generator de frustrări cronice, care pot încheia prematur și trist o viață.

Numai bucurându-te de binele aproapelui îți poi atrage și binele tău.

2. LUPTA NELOIALĂ PENTRU EXISTENȚĂ

Forma luptei pentru existență este una dintre legile fundamentale ale vieții, valabilă pentru orice organism (de la virus, bacterie sau animal, până la „Homo sapiens”).

Dacă Darwin a descris legea selecției naturale (conform căreia supraviețuiesc speciile animale sau vegetale cel mai bine adaptate), el nu a întrevăzut însă legea „selecției artificiale”, poate și pentru că pe vremea lui lupta neloidală pentru existență nu era atât de acerbă ca în zilele noastre.

Cu alte cuvinte, dacă un individ cu înzestrare intelectuală și morală modestă este mai abil și mai rapid decât un altul, dotat superior sub raport intelectual și etic, primul îl va răpune pe cel cu adevărat bun.

Ca urmare, rezultatul selecției artificiale constă în faptul că urmașii celui rău vor prolifera, lăsând ca moștenire descendenți și mai răi, astfel încât cei buni și înzestrați vor dispărea treptat.

Nu trebuie, totuși, să fim pesimiști.

Este doar punctul decliv (inferior) al sinusoidei evoluției noastre; să sperăm că doar pe termen relativ scurt ne aflăm în prezent la baza sinusoidei, unnând ca mai devreme sau mai târziu să ne ridicăm spre punctul maxim al acesteia.

În orice caz, existența noastră este compusă din aceste coborâșuri și suișuri, amplasate pe o spirală ascendentă, ce va tinde întotdeauna spre bine și spre frumos, prin dorința ancestrală, genetic divină, sădită în noi atunci când am fost creați după chipul și asemănarea Domnului.

3. FUGA DUPĂ BANI ȘI ACUMULĂRI MATERIALE CU ORICE PREȚ ȘI CU ORICE MIJLOACE

Este un punct integrant al selecției artificiale.

Cu ce preț se plătește însă această fugă după bani?

În primul rând, prin ritmul de viață alert, care antrenează alimentația improvizată, la ore întâmplătoare, excesul de stimulente și excitante ale sistemului nervos, uzul și abuzul de medicamente chimice.

În loc de orice comentariu, vă propunem spre meditație următorul verset din Noul Testament: „Vindeți averile voastre și dati-le în milostenii; faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară nesleită în ceruri, unde furul nu se apropie, nici molia nu le strică.” (Luca, 12:33).

4. SCHIMBAREA BRUSCĂ A MODULUI DE VIAȚĂ

Implică un timp insuficient pentru adaptare.

Confortul asigurat de viața modernă, folosirea abuzivă a mijloacelor mecanice de deplasare, lipsa de mișcare și efort fizic, sedentarismul și renunțarea la multe ore de odihnă și de somn absolut necesare refacerii organismului și în special a etajelor superioare ale sistemului nervos central provoacă dereglări cu repercursiuni majore pentru organism.

5. SUPRAPOLUAREA

Într-o lume din ce în ce mai poluată, suprapoluarea individuală cu tutun, alcool, cafea, ceai chinezesc, băuturi și sucuri artificiale sau cu droguri, alimente produse prin mijloace chimice (îngrășăminte artificiale în exces, hormoni de creștere, insecticide, ierbicide, fungicide etc, dintre care unele foarte nocive), medicamente sintetice, hrană chimizată și manipulată genetic reprezintă cauza a numeroase maladii care au ca efect reducerea mediei de vârstă.

6. ÎNDEPĂRTAREA DIN CE ÎN CE MAI ACCENTUATĂ DE NATURĂ

Uitând că noi înșine facem parte din ea, a făcut ca prin această adevărată declarație de război să ne facem rău în primul rând nouă.

Nesocotirea conceptelor de bază ale celor zece porunci sau a altor principii de bază care definesc statutul de OM, indiferent cărei religii aparține fiecare dintre noi, nu este altceva decât îndepărtarea creației de Creator.

Desigur, nu ne putem întoarce la natură în sensul simplist al noțiunii.

Nici nu dorim să ne întoarcem la „epoca de piatră” a dezvoltării tehnologice, însă, deși trăim în ziua de azi sub aspectul civilizației, în era atomică și a cuceririi cosmosului, foarte mulți dintre noi ne aflăm, din păcate, într-o epocă de piatră a evoluției spirituale.

Oare mileniul în care am intrat va fi mai rational sau mai spiritual, sau măcar mai religios, dacă nu mai credincios în Forța Supremă căreia îi datorăm existența?

7. SUB ASPECT MORAL, ETIC ȘI RELIGIOS, FACEM MARI GREȘELI

care se răsfrâng asupra noastră și ne scurtează viața.

Ne urâm aproapele, uitând că și el este creat după chipul și asemănarea Domnului, relațiile inter-umane se pervertesc pe zi ce trece.

Cât de superior și de evoluat spiritual este omul zilelor noastre, care a născocit diabolicele lagăre de exterminare, clinicile, psihiatrice de distrugere a sufletelor, de ucidere de dragul de a ucide pe baza doctrinelor sau convingerilor politice, față de canibalul pe care l-am condamnat în trecut?

Sacrificiul uman și animal separe că a fosi abolit, formele primitive ale ofrandelor aduse zeilor prin uciderea și arderea ființelor pe rug fiind de mult lăsate în urmă (deși se pare că se mai practică în unele comunități și în zilele noastre!).

Dar care este diferența dintre acele sacrificii și cele din epoca modernă a industriei alimentare, bazate în mare parte pe consumarea proteinelor alimentare provenite din animalele sacrificate?

Pe ce se bazează dreptul moral asupra vieții animalelor pe care le consumăm ca hrană?

Pe faptul că asigurăm animalelor domestice condiții mai bune de trai, de dezvoltare și perpetuare, dar numai cu condiția ca acestea să ne aparțină?

Din punct de vedere moral, suntem cu siguranță răspunzători de comportamentul nostru față de aceste ființe vii, subordonate voinței și puterii noastre.

Revenind la obiectul acestei lucrări — pledoaria pentru longevitate — menirea științelor biologice și biochimice, în special a biotehnologiilor actuale și viitoare, constă în necesitatea de a găsi substituenți și echivalenți alimentari pentru a înlocui carnea.

Până atunci, să nu uităm că resursele enorme în proteine vegetale și animale ale Oceanului Planetar nu sunt decât foarte puțin valorificate.

Carnea animalului ucis de noi ascunde, după cum am mai spus, moartea „în sine”, deoarece ne grăbește, prin nenumăratele boli cauzate de proteinele și „grăsimile” animale, spre un sfârșit prematur.

S-a constatat că animalele carnivore sunt mult mai agresive decât ierbivorele, după cum și oamenii consumatori de carne sunt mai violenți decât cei a căror alimentație este bazată pe fructe, legume, cereale și semințe, ouă și produse lactate.

Dar până la asigurarea prin diverse biotehnologii a protidelor superioare celor din carne, să recurgem la ceea ce există în prezent.

După cum se știe, Soia, miraculoasa plantă de cultură, precum și alte leguminoase ne oferă cantități importante de proteine superioare celor existente în carne și chiar în cantități mai mari din punct de vedere procentual.

Acest dar al naturii a salvat de la subnutriție proteică cele mai mari populații ale globului, China și India. Să sperăm că și în țara noastră își va câștiga locul bine-meritat.

Pe lângă proteine, în aceste produse "vii" se găsesc toți aminoacizii esențiali, grăsimile și glucidele, vitaminele, sărurile minerale, oligoelementele și enzimele necesare organismului omenesc.

CAP.8 SAPTE ELEMENTE CARE PRELUNGESC VIAȚA

Deși longevitatea a crescut statistic în ultima jumătate de secol, în special în țările avansate din punct de vedere tehnic și economic, acest indice nu este valabil pentru majoritatea țărilor sărace.

Sunt multe țări în care șansa de supraviețuire se situează între 40-45 ani.

Cauzele principale sunt subalimentația, asistența și educația sanitară precară, bolile cu răspândire în masă, scăderea natalității și creșterea mortalității infantile.

Țara noastră se situează destul de aproape de țările avansate, deși natalitatea a scăzut simțitor în ultimul deceniu.

Se constată o îmbătrânire a populației, din punct de vedere statistic, putându-se vorbi de o șansă de supraviețuire medie cuprinsă între 72-74 ani.

Ceea ce dorim să prezentăm în cele ce urmează se referă la calitatea vieții, factor care depinde de fiecare dintre noi, de modul nostru de viață, de respectarea anumitor reguli până ia adânci bătrâneți, sub aspect fizic, mental și spiritual.

1. ALIMENTAȚIA

În mod obișnuit, mesele sunt împărțite în trei etape.

La unele popoare, masa principală este cea de dimineață, la altele cea de seară, obicei pe care-l considerăm mai puțin indicat.

Sunt unele afecțiuni la care se recomandă cinci mese pe zi în loc de trei, dar aceasta numai cu consultarea medicilor specialiști.

Noi recomandăm un regim preponderent lacto-vegetarian, dar nu exclusiv.

În copilărie și în tinerețe sunt necesare și proteine animale ușoare (pește alb, piept de pui, carne de curcan fără piele).

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, necesarul în proteine animale trebuie redus.

NU SE RECOMANDĂ CARNEA ROȘIE ȘI GRĂSIMILE ANIMALE.

În cazul în care nu puteți renunța la carne, se recomandă să începeți masa cu o salată de legume și s-o încheiați cu fructe.

Un studiu relativ recent a demonstrat că, în cazul în care masa începe cu carne (corp străin introdus în organism), numărul leucocitelor crește la 20.000.

În cazul în care se începe cu salate și se termină cu fructe, numărul de leucocite se păstrează în cadrul valorilor normale de 9.000.

Este recomandabil să vă sculați de la masă cu cinci minute înainte de-a fi sătul, nu cu cinci minute după ce v-ați săturat.

Nu vă grăbiți la masă: mestecați bine alimentele, de zece ori înainte de-a le înghiți și nu beți apă înainte de masă sau între felurile de mâncare.

Alegeți o zi de post pe săptămână pentru dezintoxicarea organismului.

2. MENTALUL

În mod obișnuit nu folosim decât 25-30% din capacitatea creierului nostru.

Prin educație și meditație, putem folosi mai mult din această capacitate.

3. TIMPUL DE ODIHNA

Ideal ar fi să putem respecta cele trei opturi dintr-o zi: 8 ore de activitate, 8 ore de odihnă activă (sport, plimbări, lectură, muzică etc.) și 8 ore de somn.

Nu întotdeauna putem respecta acest ciclu ideal.

Important este însă să respectăm cele 8 ore de somn, în special pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Nu vă culcați mai devreme de 3 ore după ultima masă.

Este bine ca înainte de culcare să faceți o scurtă plimbare.

4. EVITAREA SEDENTARISMULUI

O viață normală este condiționată de mișcare, care asigură o bună oxigenare a organismului. Chiar după pensionare, continuați activitatea care vă place sau alegeți o activitate de care ați fost privat în timpul muncii pentru câștigarea existenței.

Inactivitatea este primul pas spre mormânt.
Continuați să munciți într-un ritm obișnuit și continuu opt ore pe zi.
Nu neglijați nici gimnastica zilnică în aer curat.
Dormiți cu fereastra întredeschisă atâta timp cât sezonul vă permite.

5. CULTIVAREA OPTIMISMULUI

Un factor important care depinde de noi este cultivarea optimismului și a încrederii în cei din jurul nostru.

Să respingem tot ceea ce este negativ în relațiile interumane.
Să ne închipuim că viața este o oglindă în fața căreia suntem și ne privim: dacă zâmbim, zâmbetul se întoarce asupra noastră; dacă ne crispăm și ne schimonosim figura, grimasa se întoarce tot asupra noastră.
Cu alte cuvinte, toate gândurile și acțiunile noastre de fiecare clipă, de fiecare zi trebuie să fie pozitive, senine, optimiste.
Vor beneficia de acestea toți cei din jurul nostru și, în primul rând, noi.

6. PREVENIREA POLUARII

Ne referim, evident, și la poluarea mediului, la faptul că trăim într-o țesătură de iradiații și decibeli, la care contribuie celularele, televizoarele, microundele neprotejate, traficul zgomotos din marile așezări urbane etc.
Acesta este tributul pe care îl plătim confortului și civilizației moderne.
Dar ne referim și mai mult la poluarea pe care noi înșine ne-o provocăm: prin alimentația deficitară, prin consumul de alcool, droguri, tutun, medicamente sintetice, băuturi comerciale, conserve etc. etc.

Pentru sănătatea noastră și pentru prelungirea vieții, e necesar să evităm cât mai mult poluarea de orice fel.

7. SUPREMA PORUNCĂ

Printre cele trei mari virtuți teologice — CREDINȚA, SPERANȚA ȘI IUBIREA — pe primul loc am situa iubirea, ca factor determinant.

Iubirea față de Creator și față de aproapele nostru.
Sub aspect spiritual: armonia din cadrul familiei, armonia relațiilor sociale, armonia relațiilor interumane care se cuvine să fie normale și corecte.

Dacă am încerca să definim, sub aspect științific, tehnic și spiritual, epoca în care trăim, am ajunge la o concluzie pesimistă: este epoca marilor cuceriri științifice, tehnice și utilitare, dar, în același timp, trăim într-o epocă a "pietrei necioplite" a evoluției spirituale.

Atâta timp cât predomină forța, selecția artificială, ura, răzbunarea, atentatele la viața celor fără de apărare, conflictele între popoare în numele religiei sau al convingerilor politice, evoluția noastră spiritală va stagna.

Totuși, sperăm să depășim această situație de o gravitate fără precedent în istoria umanității. Speranța se află în iubire și în bună înțelegere între oameni.

CAP.9 TINERETE FĂRĂ BĂTRÂNETE ȘI VIATĂ FĂRĂ DE MOARTE

La prima vedere, pare, într-adevăr, o utopie această stare excepțională a tinereții veșnice și a eternității.

În realitate, această dorință-nostalgie pe care a avut-o dintotdeauna orice muritor se poate împlini. Cu o singură, dar esențială condiție: să credem că spiritul nostru, din momentul în care a început să existe, va exista pentru totdeauna.

Dacă suntem convingși sau chiar dacă doar credem în acest lucru, viața noastră va fi veșnică: viață fără de moarte.

Dacă acceptăm legile conservării și perenității materiei și energiei, de ce să nu credem și în veșnicia sufletului nostru?

"Nimic nu se pierde, nimic nu se creează, totul se transformă."

De fapt, pe această preschimbare continuă se axează majoritatea religiilor lumii și a sistemelor filosofice fundamentale.

Trebuie să învățăm să folosim din ce în ce mai mult capacitățile nebănuite ale subconștientului.

Joseph Murphy este unul din promotorii acestui sistem de gândire, arătându-ne nu numai puterea extraordinară a subconștientului, ci și cum să valorificăm această resursă nebănuită, care stă la îndemâna oricui.

În subconștient se depozitează reminiscențele tuturor faptelor noastre, fiind posibilă — în anumite cazuri și condiții încă foarte puțin cunoscute nouă — recuperarea vestigiilor alcătuite din întâmplări trecute sau proiecția evenimentelor viitoare.

Cum ne-am putea explica altfel senzația de „deja vu” a unor locuri sau oameni pe care știm cu siguranță că le vedem și îi vedem pentru prima oară?

După asemenea considerații de ordin general, teoretic și filosofic, trebuie totuși să ne întrebăm ce să facem pentru a ne prelungi această viață și a ne îmbunătăți calitatea vieții în primul rând, trebuie să prevenim înainte de a trebui să vindecăm.

Aceasta este, de fapt, medicina viitorului.

Se vorbește, astfel, din ce în ce mai mult, despre îmbătrânirea precoce, aterosclerozei atribuindu-i-se un rol precumpănitor, chiar definitoriu pentru vârsta individului, apreciată conform stării arterelor sale.

Actualmente este unanim recunoscut în lumea medicală că fenomenul de îmbătrânire începe de la vârsta de 40 ani.

După această vârstă, capacitatea funcțională la nivelul diferitelor aparate, sisteme, "tesuturi, celule sau chiar molecule scade în fiecare an continuu, în funcție de individ, cu aproximativ 1%.

Fenomenul de îmbătrânire este lent, dar permanent.

După vârsta de 60-70 de ani, apar profunde modificări morfo-funcționale la nivel tisular, celular, molecular.

Acest fapt nu trebuie însă generalizat, deoarece există din ce în ce mai multe excepții individuale.

Vârsta a III-a, cum denumesc unii bătrânețea, a crescut de la 60-70 de ani la 80 de ani sau chiar mai mult. Este suficient să menționăm populațiile cauziene, tibetane sau pe cele din Ecuador sau Cașmir, care au cei mai mare număr de centenari.

Explicația constă în modul de viață, incluzând aici și alimentația.

În țara noastră, longevitatea a crescut în ultima jumătate de secol cu 15-20 de ani.

Numărul mare de centenari se găsește în Delta Dunării, în județul Vrancea și în unele zone din nordul țării.

O influență importantă o au alimentația, mediul geografic, puritatea aerului, prelungirea activității fizice și intelectuale, dar și factorii de ordin genetic.

După pensionare, este recomandabil — așa cum am mai spus — ca omul să-și continue activitatea cu care a fost obișnuit.

Este și acesta un element care contribuie la prelungirea vieții.

În plus, omul în vârstă dispune de un fond de timp mai mare decât înainte de pensionare.

Depinde însă de individ cum folosește acest timp.

Mai întâi de toate, trebuie evitat sedentarismul.

Apoi, mișcarea și gimnastica zilnică (eventual chiar și numai mersul pe jos), după plăcerea și capacitatea fiecăruia, ceea ce prelungeste mult felul de a fi al tinereții.

Sub aspect spiritual, relațiile familiale contează foarte mult.

În plus, odată ajuns la „vârsta înțelepciunii”, omul trebuie să-și perfecționeze calitățile morale, intelectuale și spirituale.

Spectrul morții fizice trebuie eliminat, gândindu-ne că sfârșitul acestei existențe nu este decât începutul vieții veșnice.

Se cuvine să ne impunem o auto-disciplină fizică, morală și spirituală.

Să cultivăm optimismul și sentimentele nobile care definesc statutul de om.

Să nu fim supărați pe nimeni, niciodată.

Să știm să iertăm și să emitem numai sentimente pozitive care, în ultimă instanță, tot asupra noastră se vor întoarce, la fel ca și sentimentele negative.

Apoi, să încercăm să cunoaștem mai bine legile Naturii: cu cât vom fi mai aproape de ea, vom trăi mai bine și mai mult pe acest pământ.

În zonele temperate, în care trăim și noi, trebuie să ne potrivim „ceasul biologic” în funcție de cele patru anotimpuri, așa cum, de altfel, face orice formă a vieții integrate în natură.

După cum arată Bob Flaws, doctor în medicină tradițională chineză și acupunctur, referindu-se la unul dintre cei mai mari inițiați în acest domeniu (George Oshawa), primăvara și vara sunt anotimpurile de dezvoltare maximă, în timp ce toamna și iarna sunt anotimpurile cele mai favorabile odihnei, reflecției și înmagazinării forțelor de recuperare pentru cele două anotimpuri.

Același autor recomandă ca primăvara să ne trezim devreme și să facem o plimbare ușoară, relaxantă.

În timpul verii, trebuie să ne trezim la fel de devreme și să începem ziua cu o baie de soare.

Toamna, oamenii trebuie să se culce devreme, iar activitatea fizică trebuie să fie axată pe strângerea recoltelor și aprovizionarea pentru iarnă.

Iarna este bine ca oamenii să se culce devreme și să se trezească mai târziu ca de obicei, în acest anotimp trebuind să se instaleze un fel de stare de hibernare, de introspecție și de odihnă.

În zonele cu două anotimpuri — musonică și „post-musonică” — ceasul biologic trebuie adaptat la aceste condiții, la fel ca și alimentația.

Același Bob Flaws arată că arta de a trăi împreună cu anotimpurile are meritele ei, cel puțin în ceea ce privește respectarea unui program ordonat de viață și alimentație.

Dar trebuie să menționăm și faptul că unii longevivi ascultă de propriul lor „ceas biologic”.

De pildă, foarte mulți oameni cu vârste venerabile obișnuiesc să mănânce ponderat ori de câte ori le este foame.

De multe ori, se trezesc noaptea pentru a mânca.

Apoi se culcă și dorm liniștiți.

Secretul stă însă în cumpătare.

Tot în legătură cu relația om-natură, este necesar, chiar obligatoriu, să se respecte orele de muncă, odihnă activă și somn, mai ales într-o viață agitată pentru câștigarea existenței (sau, pentru unii, a averii).

Este vorba despre cele „trei opturi” pe care, dacă le respectăm, ne prelungesc viața și ne scutesc de multe boli.

La fel ca și Domnul, care a creat cerurile și pământul și s-a odihnit în ziua a șaptea, să nu uităm nici noi acest lucru.

Este indicat ca o zi pe săptămână să schimbăm mediul ambiant, în special dacă locuim în aglomerări urbane.

Petrecerea unei zile pe săptămână în mijlocul naturii ne „încarcă bateriile” pentru viitoarea perioadă de timp.

Dacă avem posibilitatea să ne alegem locul unde ne vom construi propria casă, aproape toți cunoaștem soluția cea mai bună.

Dar cum acest lucru nu este posibil decât pentru puțini, măcar să știm cum să ne aranjăm interiorul în care ne petrecem cam o jumătate de viață.

Casa noastră trebuie să fie curată, cât mai aerisită și cât mai puțin încărcată cu lucruri inutile. Chiar și patul în care dormim trebuie să fie orientat (după mulți cercetători) cu capul spre nord și picioarele spre sud, pe axa de rotație a pământului.

Foarte importantă este și reducerea la maximum posibil a surselor de radiații electro-magnetice (televizor, aparataj electric și electronic, celulare, computere, microunde neprotejate) care influențează negativ starea de sănătate fizică și psihică.

Revenind însă la tema de fond a acestei cărți — alimentația — trebuie să subliniem faptul că fenomenul îmbătrânirii poate fi încetinit prin alimentarea celulelor organismului cu acizi nucleici, respectiv cu ADN (acid dezoxiribonucleic) și ARN (acid ribonucleic).

După cum se știe, organismul nostru este o clădire construită din miliarde de cărămizi, celulele noastre, fiecare având o viață limitată.

Studii științifice arată că aceste celule mor și renasc la un interval cuprins între un an și aproximativ doi ani.

Înainte de moarte, celulele se reproduc, însă nu cu aceleași proprietăți și capacități ca în adolescență sau tinerețe.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, capacitățile noilor celule se deteriorează treptat. Acești acizi nucleici pot „întineri” celulele noi apărute la senectute.

Astfel, se consideră că pentru organismul uman necesarul de acizi nucleici este de aproximativ 1.5 g pe zi.

Acești acizi există în germenii de Grâu, pâinea integrală, algele marine, fulgii de Ovăz, ciuperci sau leguminoase (în special din Soia, Fasole, Linte, Mazăre, Spanac, Andive), completate cu sucuri de fructe sau legume, cu miere, produse lactate și ouă, fără a mai avea nevoie de carne.

Este vorba, așadar, de un regim lacto-vegetarian, numit și „regim de viață lungă” sau alimentație macrobiotică, după cum arată și practică în Occident medicul japonez Nyioiti Sakaurzawa, cunoscut și sub numele de George Oshawa (la care am mai făcut referire în acest capitol).

Potrivit acestui specialist, în sistemele de medicină tradițională, hrana ideală pentru persoanele în vârstă ar consta în: cereale nedecorticate, care trebuie să reprezinte 60% din alimente, legume și fructe la care se adaugă și semințe (30%), iar restul de 10% ouă, lapte și carne.

În ceea ce privește sursa de proteine de origine animală (carnea), este preferabil să fie înlocuită cu speciile de pește cu carne albă (de apă dulce).

Totodată, această alimentație constituie și hrana profilactică pentru toți cei care au depășit vârsta de 40 de ani.

În multe religii, inclusiv în cea creștină, se recomandă postul.

Sub aspect spiritual, este un bun exercițiu de abținere, de voință, de autocontrol și de învingere a instinctelor primare.

Sub aspect medical, postul reprezintă principalul factor de dezintoxicare a organismului și de repaos al aparatului digestiv.

La modul general, se recomandă o zi pe săptămână abținerea totală de la mâncare, băuturi alcoolice, fumat și activitate sexuală.

Tot aici, trebuie să includem chiar și renunțarea la logoree... în această zi, vom putea consuma numai apă, dar apă de bună calitate, absolut necesară pentru hidratarea organismului.

În timpul anului, se vor alege două perioade mai lungi, de circa o lună, în care se vor consuma numai fructe, legume și semințe oleaginoase, completate cu pâine integrală, germeni de Grâu, fulgi de Ovăz, de Soia și miere în loc de zahăr.

Necesarul de sare poate fi asigurat în special din legume.

Cu acest scop, vom prezenta la sfârșitul lucrării câteva sinoptice orientative, cu ajutorul cărora fiecare își va putea alcătui, în funcție de sezon și posibilități, meniul cel mai potrivit.

Fiindcă am recomandat postul, bineînțeles, pe perioade limitate, este bine ca în această direcție să fie consultat un bun medic dietetician (nutriționist), în special de către cei care suferă de debilitate fizică, de boli ale aparatului cardio-vascular, renal, de boli infecțioase, cancer etc.

La sfârșit de capitol și de carte, ne exprimăm speranța că am izbutit să transmitem un mesaj celor ce doresc să-și prelungească viața și să-și amelioreze starea de sănătate fizică și psihică, prin schimbarea modului de a trăi cu care au fost obișnuiți o viață întreagă.

E adevărat că nu va fi deloc ușor, dar merită să încercăm!

Vom pleda întotdeauna pentru supremația spiritului asupra materiei.

Oricât de mult vom reuși să ne prelungim zilele bune, să asigurăm trupului nostru o viață îndelungată și sănătoasă, va veni în cele din urmă momentul despărțirii.

Trupul nostru va intra, în mod firesc, în cadrul circuitului biologic natural.

Să privim acest fenomen normal, cu zâmbetul pe buze: cine a trăit demn, știe să moară tot demn.

Convinși fiind că sufletul nostru, prin însăși originea lui, este veșnic, nu vom muri niciodată.

Abia atunci vom înțelege sensul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte...

TIMPUL OPTIM DE ADMINISTRARE A PREPARATELOR FITOTERAPEUTICE

Dimineața pe nemâncate = infuziile sau decocturile în afecțiunile hepato-biliare sau în alte afecțiuni, indicate la fiecare formulă sau plantă descrisă în lucrare

Înainte meselor principale = substanțele tonic-amare sau cele folosite ca pansamente gastrice

După mesele principale = carminativele și altele cu indicații speciale de administrare
Seara la culcare = sedativele, laxativele, antialergicele.

ANEXA